

## سوالات فصل اول ریاضی ۳ تجربی

## درس اول

## توابع چند جمله‌ای – توابع صعودی و نزولی

## سوالات تشریحی و تستی درس اول

**مثال ۱** ۱- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) هر تابع ثابت به صورت ..... است، که نمودار آن موازی ..... است، شیب آن برابر ..... است.

ب) هر تابع به فرم  $f(x) = ax + b$  با شرط  $a \neq 0$  یک تابع ..... است.

پ) تابع  $f(x) = \sqrt{2x} - x^3$  یک تابع درجه ..... است. که به نمودار آن ..... نیز می‌گویند.

ت) تابعی که فقط صعودی یا فقط نزولی باشد را تابع ..... می‌گویند. (یکنوا - غیریکنوا)

ث) تابع  $f(x) = x^3$  یک تابع همواره ..... است. (صعودی - نزولی)

ج) تابعی که اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی باشد تابع ..... است. (اکیدا یکنوا - غیر یکنوا)

چ) تابع  $y = \log_2 x$  همواره تابعی ..... و تابع  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  همواره تابعی ..... است. (صعودی - نزولی)

ح) دامنه تابع چند جمله‌ای، برابر با ..... است.

خ) اگر تابع  $f$  در بازه  $[a, b]$  صعودی اکید (نزولی اکید) باشد. نمودار  $f$  محور  $x$  ها را حداکثر در ..... نقطه قطع می‌کند.

د) تابع  $f$  را ثابت گوییم هر گاه برای هر  $x_1, x_2$  از دامنه داشته باشیم:

ذ) تابع  $f$  را ..... گوییم هر گاه داشته باشیم :

ر) تابع  $f$  را ..... گوییم هر گاه داشته باشیم :

۲- نوع هر یک از توابع زیر را در چند جمله‌ای‌ها مشخص کنید، سپس نمودار هر کدام رارسم کنید.

الف)  $f(x) = \sqrt{3}$

ب)  $f(x) = x^3 - 4x + 5$

پ)  $f(x) = -1 - 2x$

**مثال ۳** ۳- فرم کلی یک تابع درجه ۳، به چه صورتی است؟ یک مثال بزنید.

**مثال ۴** ۴- نمودار تابع  $f(x) = x^3$  رارسم کنید.

## درس اول || توابع چند جمله‌ای- توابع صعودی و نزولی

**مثال ۵**- ابتدا نمودار تابع  $f(x) = x^3$  و  $g(x) = x^3$  را رسم کنید. حال بخش‌های زیر را پاسخ دهید.

(الف) مجموعه جواب نامعادله  $g(x) \geq f(x)$  را به صورت بازه بنویسید. (نمودار  $g(x)$  بالاتر یا برابر نمودار  $f(x)$  است).

(ب) معادله  $g(x) = f(x)$  را حل کنید. ( محل برخورد دو تابع  $f$  و  $g$  را مشخص کنید).

(پ) به ازای چه  $x$  هایی نمودار تابع  $x^3$  بالاتر از نمودار تابع  $x^3$  قرار دارد؟

(ت) آیا نمودارهای این دو تابع، یک به یک هستند؟

**مثال ۶**- نمودار توابع زیر را به روش انتقال رسم کنید، سپس دامنه و برد آن‌ها را بنویسید.

(الف)  $f(x) = -(x-1)^3$

(ب)  $f(x) = -x^3 - 1$

(پ)  $f(x) = (x+1)^3 + 2$

(ت)  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 10$

(ث)  $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

(ج)  $f(x) = -(x-1)^3 - 1$

**مثال ۷**- معادله  $x^3 = 1-x$  چند جواب دارد؟ (به کمک رسم، معادله را حل کنید، تنها تعداد نقاط برخورد مد نظر است).

**مثال ۸**- جواب‌های دقیق معادله  $= 0 = x^3 + 3x^2 + 3x + 9$  را بیابید. (به روش جبری و به کمک تجزیه معادله را حل کنید).

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذربایجان

**مثال ۹** - تعداد جواب‌های معادله  $x^3 - 3x^2 + 5x - 1 = 0$  را بیابید.

**مثال ۱۰** - نمودارهای دو تابع  $y = x^3 - 1$  و  $y = -x^3 - 1$  رارسم کنید و نقطه برخورد آنها را به صورت دقیق بیابید.

**مثال ۱۱** - نمودار توابع زیر رارسم کنید. مشخص کنید در چه بازه‌هایی صعودی و درجه بازه‌هایی نزولی هستند؟

(الف)  $f(x) = x - |x|$

(ب)  $g(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ,  $D_g = [-\pi, \pi]$

(پ)  $h(x) = -x^2 - 2x + 1$

(ت)  $k(x) = x^2 |x|$

(ث)  $r(x) = -x^3 - 2$

(ج)  $m(x) = x |x|$

(ج)  $n(x) = 2x - |x|$

(ج)  $p(x) = |x| - x$


(ج)  $q(x) = |x| + x$

(ج)  $t(x) = \sqrt[3]{x}$

## درس اول || توابع چند جمله‌ای-توابع صعودی و نزولی

۱۲- یکنواختی هر کدام از نمودارهای زیر را در کل دامنه آن بررسی کنید.

مثال



۱۳- نشان دهید تابعی وجود ندارد که اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی باشد، ولی یک به یک نباشد.

مثال

۱۴- نمودار تابع زیر را رسم کنید، سپس مشخص کنید در چه بازه‌هایی صعودی، نزولی و یا ثابت است؟

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & x > -2 \\ -1 & -2 < x < 1 \\ 2x - 3 & x \geq 1 \end{cases}$$

۱۵- برای تابع نمایی  $f(x) = a^x$  مشخص کنید به ازای چه مقداری از  $a$  تابع، صعودی یا نزولی است؟ (رسم کنید).

مثال

۱۶- برای تابع  $f(x) = \log_a^x$  مشخص کنید به ازای چه مقداری از  $a$  اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی است؟ (رسم کنید).

مثال

۱۷- اگر تابع  $y = (x-1)^{|x-1|}$  در بازه  $[-\infty, a]$  نزولی باشد، کمترین مقدار  $a$  را بیابید.

مثال


# مرکز مشاوره تحصیلی

۱۸- آیا هر تابعی که صعودی و یا نزولی باشد، آنگاه یک به یک است؟ چرا؟ مثالی بیاورید.

(ب) در قسمت الف چه شرطی لازم هست که تابع یک به یک شود؟

۱۹- نمودار زیر در چه فاصله‌هایی صعودی و در چه بازه‌هایی اکیداً نزولی است؟

مثال



**مثال ۲۰** - حدود  $a$  را طوری بیابید که تابع  $f(x) = ax^r + 4x - 1$  در بازه  $[2, +\infty)$  نزولی باشد.

**مثال ۲۱** - با رسم شکل تابع زیر، بازه هایی که تابع در آن ها صعودی، نزولی یا ثابت است را مشخص کنید.

$$f(x) = \begin{cases} -x + 5 & x \leq -1 \\ 1 - x^r & x > -1 \end{cases}$$

**مثال ۲۲** - نموداری رسم کنید که تمام ویژگی های زیر را با هم داشته باشد.

الف)  $f(2) = 1$

ب) روی اعداد نامنفی ثابت باشد.

پ) روی بازه  $[0, 3]$  صعودی اکید باشد.

ت) روی بازه  $(-\infty, -3]$  نزولی اکید باشد.

**مثال ۲۳** - ثابت کنید هر تابع اکیداً یکنوا، یک به یک است.

**مثال ۲۴** - هرگاه تابع  $f = \{(2, -3), (-1, 5), (0, k), (1, 2)\}$  نزولی باشد، حدود  $k$  را به دست آورید.

**مثال ۲۵** - اگر تابع  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+1} & x \geq 3 \\ \frac{1}{2}x + a & x < 2 \end{cases}$  اکیداً صعودی باشد، بیش ترین مقدار  $a$  را به دست آورید.

الف)  $f(x) = -x^r$

ب)  $f(x) = 2x^r - 1$

پ)  $f(x) = \log_r x + 1$

ت)  $f(x) = \sqrt{3 - 2x}$

## درس اول || توابع چند جمله‌ای-توابع صعودی و نزولی

ث)  $f(x) = \begin{cases} x+1 & x < 0 \\ 2-x & x > 0 \end{cases}$

ج)  $f(x) = |x-1| + 2$

مثال ۲۷- تابع زیر را رسم کنید و به کمک نمودار تعیین کنید در چه بازه‌هایی صعودی، نزولی یا ثابت هستند؟

الف)  $f(x) = -\sqrt{x-2}$

ب)  $f(x) = |x+2|-3$

پ)  $f(x) = \begin{cases} x^r & x \leq -2 \\ 4 & -2 \leq x \leq 1 \\ -x^r - 2 & x > 1 \end{cases}$

ت)  $f(x) = x^r - 6x + 1$

ث)  $f(x) = 1 - \log_r^{(x-1)}$

ج)  $f(x) = \sqrt{|x|}$

مثال ۲۸- صعودی یا نزولی بودن تابع زیر را مشخص کنید.

الف)  $f(x) = \sqrt{x-2}$

ب)  $f(x) = \frac{1}{x}$

پ)  $f(x) = -|x-2| + 5$

ت)  $f(x) = \sqrt{x-|x|}$

ث)  $f(x) = -\frac{1}{x}$

ج)  $f(x) = \left| \frac{1}{x} \right|$

دستورات ریاضی عالی آنکاره

۲۹- نمودار تابعی چون  $f$  رسم کنید که تمام ویژگی های زیر را داشته باشد:

$$f(2) = 3$$

ب) روی اعداد نامنفی ثابت باشد.

پ) روی بازه  $[1, 0]$  نزولی اکید باشد.

ت) روی بازه  $[-3, -1]$  صعودی اکید باشد.

۳۰- نمودار تابعی مانند  $f$  رسم کنید که تمام ویژگی های زیر را داشته باشد:

الف) روی اعداد نامثبت صعودی باشد و بخشی از یک سهمی باشد.

ب) برای اعداد مثبت کمتر از ۳، تابع ثابت باشد.

$$f(2) = -1$$

ت) در فاصله  $(3, +\infty)$  نزولی اکید باشد.

۳۱- با رسم تابع  $y = |x+2| + |x-1|$  مشخص کنید در چه بازه ای صعودی و در چه بازه ای نزولی و یا ثابت است؟

۳۲- با رسم شکل توابع زیر، صعودی، نزولی یا ثابت بودن آن ها را در بازه های مشخص، تعیین کنید.

الف)  $f(x) = -|x-2|$

ب)  $f(x) = \frac{x}{|x|}$

پ)  $f(x) = x|x-1|$

ت)  $y = |x+1| - |x-2|$

ث)  $f(x) = \sqrt{x-1} + 2$

ج)  $f(x) = \frac{-1}{x} + 1$

ز)  $f(x) = 4x + 3|x|$

## درس اول | توابع چند جمله‌ای- توابع صعودی و نزولی

**مثال ۳۳**- یکنواهی تابع  $f(x) = [x] + [-x]$  را بررسی کنید.

**مثال ۳۴**- ابتدا نمودار تابع زیر رارسم کنید، سپس بازه هایی را که در آن تابع، صعودی اکید، نزولی اکید یا ثابت است را مشخص کنید.

$$(الف) f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ x - 1 & x > 1 \end{cases}$$

$$(ب) f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & x < -4 \\ 3 & -4 \leq x < 2 \\ 3x - 2 & x \geq 2 \end{cases}$$

$$(پ) f(x) = \begin{cases} -2x - 1 & x < -2 \\ 3 & -2 \leq x < 1 \\ 2x + 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

**مثال ۳۵**- یکنواهی تابع زیر را مشخص کنید.

$$(الف) f(x) = \log_{\frac{1}{2}}^{(x-2)}$$

$$(ب) f(x) = 2 - 5x^2$$

$$(پ) f(x) = -2 \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(ت) f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 2$$

**مثال ۳۶**- اگر تابع  $f$  صعودی باشد، در مورد یکنواهی تابع چه می‌توان گفت؟

**مثال ۳۷**- اگر تابع  $f$  اکیداً نزولی باشد، در مورد یکنواهی تابع  $f$  - چه می‌توان گفت؟

**مثال ۳۸**- حدود  $k$  را چنان بیابید که تابع  $y = (k^x - 2k)^x$  اکیداً نزولی باشد.

ب) اکیداً صعودی باشد.

## فصل ۱ تابع

**تست ۳۹** -۳۹- اگر  $f = \{(1, a-1), (-1, 2+3a), (2, 2a+2)\}$  تابعی اکیداً صعودی باشد. مقادیر  $a$  در کدام بازه است؟

- (۱)  $(-2, 1)$  (۲)  $(-\frac{2}{3}, 1)$  (۳)  $(-3, \frac{-3}{2})$  (۴)  $(\frac{-2}{3}, 2)$

**تست ۴۰** -اشتراک برد های توابع  $f(x) = x^3 - 2$  و  $g(x) = -(x-2)^3$  کدام است؟

- (۱)  $(-2, +\infty)$  (۲)  $(-2, 2)$  (۳)  $(-\infty, -2)$  (۴)  $\mathbb{R}$

**تست ۴۱** -بازه ای با بزرگترین طول که تابع  $f(x) = x^3$  بالاتر از تابع  $g(x) = x^3$  قرار ندارد، کدام است؟

- (۱)  $[0, 1]$  (۲)  $[-1, 1]$  (۳)  $(-\infty, 0]$  (۴)  $(-\infty, -1]$

**تست ۴۲** -۴۲- اگر نمودار تابع  $f(x) = (x+a)(x^3 + bx + c)$  که به کمک انتقال رسم شده است، به صورت زیر باشد، مقدار عبارت  $ab + c$  کدام است؟



**تست ۴۳** -کدامیک از توابع زیر اکیداً صعودی است؟

- (۱)  $f(x) = |x|$  (۲)  $f(x) = x^3$  (۳)  $f(x) = x + |x|$  (۴)  $f(x) = x|x|$

**تست ۴۴** -۴۴- تابع  $f(x) = \begin{cases} x^3 & x \geq 1 \\ 1-x^3 & x \leq 0 \end{cases}$  چگونه است؟

- (۱) صعودی (۲) نزولی (۳) غیر یکنوا (۴) هم صعودی و هم نزولی

**تست ۴۵** -تابع  $f$  صعودی بوده و از مبدأ می گذرد. دامنه تابع  $g(x) = \sqrt{xf(x)}$  با ضابطه کدام مجموعه است؟

- (۱)  $x \geq 0$  (۲)  $x > 0$  (۳)  $\mathbb{R}$  (۴)  $D_f$

**تست ۴۶** - حدود  $a$  برای آنکه تابع  $f(x) = \begin{cases} -x+a & x \leq -1 \\ 1-x^3 & x > 0 \end{cases}$  نزولی اکید باشد، کدام است؟

- (۱)  $a \geq 0$  (۲)  $a > 0$  (۳)  $a \geq -1$  (۴)  $a > -1$

درس اول || توابع چند جمله‌ای-توابع صعودی و نزولی

تست

- ۴۷- به ازای کدام مقادیر  $x$ ، نمودار تابع  $y = 4 - x^2$  صعودی است؟
- $-4 < x < 4$  (۴)       $-2 < x < 2$  (۳)       $x < 0$  (۲)       $x > 0$  (۱)

تست

- ۴۸- چند تا از عبارات زیر درست است؟
- الف) اگر  $f$  صعودی و  $g$  نزولی باشد،  $f + g$  یک تابع ثابت است.
- ب) اگر  $f$  اکیداً صعودی و  $g$  صعودی باشد،  $f + g$  اکیداً صعودی است.
- پ) اگر  $f$  اکیداً صعودی و  $g$  نزولی باشد،  $g - f$  اکیداً صعودی است.
- ت) اگر  $f$  اکیداً صعودی و  $g$  ثابت باشد،  $f \times g$  اکیداً صعودی است.
- ۴ (۴)      ۳ (۳)      ۲ (۲)      ۱ (۱)

تست

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & x \leq 0 \\ x^2 - 1 & x > 1 \end{cases} \quad (۴) \quad f(x) = 2x - |x - 1| \quad (۳) \quad f(x) = 2 - |x - 1| \quad (۲) \quad f(x) = \frac{|x|}{x} + x \quad (۱)$$

آنکه این مجموعه از توابع زیر در دامنه خود اکیداً صعودی نیست؟

- ۴۹- کدامیک از توابع زیر در دامنه خود اکیداً صعودی شود؟
- $f(x) = \begin{cases} x - 1 & x < 0 \\ a & x = 0 \\ x^2 + 1 & x > 0 \end{cases}$       ۵۰- اگر ضابطه  $x$  باشد، بزرگترین حدود  $a$  کدام باشد تا تابع  $f(x) = x|x - a|$  اکیداً صعودی شود؟
- $(-\infty, -1]$  (۴)       $[1, +\infty]$  (۳)       $[-1, 1]$  (۲)       $(-1, 1)$  (۱)

تست

- ۵۱- تابع  $f(x) = x|x - 2|$  در بازه  $[a, b]$  نزولی است. بیشترین مقدار  $a - b$  کدام است؟

$\frac{5}{2}$  (۴)      ۲ (۳)       $\frac{3}{2}$  (۲)      ۱ (۱)

تست

- ۵۲- اگر  $f(x)$  تابعی همواره مثبت و اکیداً صعودی باشد، کدام گزینه همواره اکیداً صعودی است؟

$-f'(x)$  (۴)       $\sqrt{f(x)}$  (۳)       $\frac{1}{f(x)}$  (۲)       $-f(x)$  (۱)

تست

- ۵۳- اگر  $f(x) = \frac{1}{x}$  باشد، تابع در کدام بازه در شرایط  $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$  صدق نمی‌کند؟
- $[-3, -1]$  (۴)       $[-3, -2]$  (۳)       $[-2, 3]$  (۲)       $[1, 2]$  (۱)

تست

تست ۵۴- نمودار تابع  $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x + 2$  از کدام ربع محورهای مختصات عبور نمی‌کند؟

(۴) چهارم

(۳) سوم

(۲) دوم

(۱) اول

تست ۵۵- عرض نقاط محل برخورد نمودارهای توابع  $y_1 = x^3 - 1$  و  $y_2 = (x-1)^3$  کدام است؟

(۴)  $-1, 1, 0$ (۳)  $-1, 1$ (۲)  $-1, 0$ (۱)  $1, 0$ 

تست ۵۶- تابع  $y = \sin x$  در بازه های  $[-\pi, -\frac{\pi}{2}]$  و  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$  به ترتیب کدام وضعیت را دارد؟

(۴) نزولی - نزولی

(۳) صعودی - صعودی

(۲) نزولی - صعودی

(۱) صعودی - نزولی

تست ۵۷- در بازه ای که تابع با ضابطه  $f(x) = |x-2| + |x-3|$  اکیداً نزولی است. نمودار آن با تابع  $g(x) = 2x^3 - x - 10$  در چند نقطه مشترک هستند؟ (تجربی خ ۹۷)

(۴) فاقد نقطه مشترک

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

تست ۵۸- حدود  $a$  برای آنکه تابع  $y = (a-2)x^3 - x$  در بازه  $(1, +\infty)$  صعودی باشد، کدام است؟

 $a > 2$  (۴) $a < \frac{5}{2}$  (۳) $2 < a \leq \frac{5}{2}$  (۲) $a \geq \frac{5}{2}$  (۱) $-2 \leq m \leq 1$  (۴) $-2 < m < 1$  (۳) $0 \leq m \leq 1$  (۲) $0 < m < 1$  (۱)

تست ۶۰- اگر  $y = (\frac{m+2}{3})^x$  تابعی نزولی باشد، حدود  $m$  کدام است؟

 $a \in \mathbb{R}$  (۴) $a \geq -2$  (۳) $a \leq -2$  (۲) $a \geq 2$  (۱)

تست ۶۱- حدود  $a$  برای آنکه تابع  $y = x^2 - ax + a$  در فاصله  $(1, +\infty)$  صعودی باشد کدام است؟

## درس اول || توابع چند جمله‌ای-توابع صعودی و نزولی

QUEST ٦٢- به ازای  $f = \{(1, 2x+7), (-2, 10-x), (0, x^2+4)\}$  یک تابع صعودی است. 

بیشترین مقدار  $b - a$  کدام است؟

(٤) ۲

(٣)

(٢) ٤

(١) ٣

QUEST ٦٣- اگر تابع  $f$  نزولی اکید و دامنه آن  $\mathbb{R}$  باشد، دامنه تابع  $y = \sqrt{f(2) - f(|x-1|)}$  کدام است؟ 

(٢)  $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ (١)  $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$ (٤)  $(-1, 3)$ (٣)  $\mathbb{R}$ 

QUEST ٦٤- تابع با ضابطه  $f(x) = |x+2| + |x-1|$  در کدام بازه اکیداً نزولی است؟ (ت خ ٩٨) 

(٤)  $(1, +\infty)$ (٣)  $(-2, 1)$ (٢)  $(-\infty, 1)$ (١)  $(-\infty, -2)$ 

QUEST ٦٥- تابع با ضابطه  $f(x) = |x+1| - |x-2|$  در کدام بازه اکیداً صعودی است؟ (ت خ ٩٨) 

(٤)  $(2, +\infty)$ (٣)  $(-1, 2)$ (٢)  $(-1, +\infty)$ (١)  $(-\infty, 2)$ 

# مرکز مشاوره تحصیلی

## علیرضا افشار

QUEST ٦٦- اگر تابع  $f$  اکیداً صعودی و  $f(0) = 0$  باشد، آنگاه دامنه  $\sqrt{(x^3 - x)f(x)}$  برابر  $(a, b)$  است. حاصل  $a + b$  کدام است؟ 

(٤) ۲

(٣) -۱

(٢) صفر

(١) ۱

QUEST ٦٧- اگر  $f$  و  $g$  توابعی صعودی در  $\mathbb{R}$  باشند، کدام تابع زیر نیز حتماً در  $\mathbb{R}$  صعودی است؟ 

(٤)  $-g$ (٣)  $-f$ (٢)  $g$ (١)  $f$


تست ۶۸- در چه بازه‌ای نمودار تابع  $g(x) = x \mid x \mid$ ، پایین تر از نمودار تابع  $f(x) = x^3$  قرار می‌گیرد؟

- (۱)  $(0, 1)$  (۲)  $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$  (۳)  $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$  (۴)  $(-1, 0) \cup (0, 1)$

تست ۶۹- نمودار تابع  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 9$  از کدام ناحیه دستگاه مختصات عبور نمی‌کند؟

- (۱) اول (۲) دوم (۳) سوم (۴) چهارم

تست ۷۰- ضابطه تابع مربوط به نمودار مقابل کدام است؟



$$y = (x + 3)^3 + 1 \quad (۱)$$

$$y = (3 - x)^3 - 1 \quad (۲)$$

$$y = (x - 3)^3 + 1 \quad (۳)$$

$$y = (3 - x)^3 + 1 \quad (۴)$$

# مرکز مشاوره تحصیلی

# علیرضا افشار

## سوالات فصل اول ریاضی ۳ تجربی

## درس دوم

## ترکیب توابع

## سوالات تشریحی و تستی درس دوم

**مثال ۱** درستی یا نادرستی هر قسمت را مشخص کنید.

الف) اگر  $fog(x) = -x^4$ ,  $fog(5) = -25$  باشند، در این صورت  $g(x) = \sqrt{x^2 - 4}$  و  $f(x) = x^4 - 4$  است.

ب) اگر  $f(4) = 5$  و  $g(4) = 7$  باشد آن گاه  $f(g(4)) = 35$  است.

پ) اگر  $1 - x$  باشد، آن گاه  $f(g(x)) = g(f(x)) = \sqrt{x}$  است.

ت) برای هر دو تابع  $f$  و  $g$  داریم:  $fog(x) = gof(x)$ .

ث) اگر نمودار تابع  $f(x)$  را در راستای محور  $x$  ها با ضریب  $k$  منبسط یا منقبض کنیم نمودار  $f(kx)$  به دست می آید.

ج) اگر  $f(x) = \cos(x)$  باشد، آنگاه نمودار تابع  $y = f(-x)$  و  $y = f(x)$  بر هم منطبق اند.

چ) نمودارهای دو تابع  $f(x) = \sqrt{-x}$  و  $g(x) = \sqrt{x}$  یکسان هستند.

**مثال ۲** تابع  $f(c - 32) = \frac{5}{9}(c - 273)$  درجه سانتی گراد را به درجه فارنهایت و  $c = k - 273$  درجه کلوین را به سانتی گراد تبدیل می کند.

الف) تابع  $f \circ c$  را بدست آورید و تعبیر آن را بیان کنید.

ب)  $313$  درجه کلوین معادل چند درجه فارنهایت است؟

**مثال ۳** اگر  $g(x) = x^2 + 1$  و  $f(x) = x - 2$  باشند، آنگاه ضابطه  $fog$  را بیابید.

**مثال ۴** در هر کدام از حالت های زیر ضابطه تابع  $fog$  را بیابید.

الف)  $f(x) = x - 1$ ,  $g(x) = x^4 - 1$

ب)  $f(x) = x^4 + x + 6$ ,  $g(x) = x - 2$

پ)  $f(x) = \sqrt{x-1}$ ,  $g(x) = x^4 - 2$

ت)  $f(x) = \frac{2}{x-1}$ ,  $g(x) = \frac{3}{x}$

ث)  $f(x) = x + 1$ ,  $g(x) = \cos x$

ج)  $f(x) = x^4 + 2x^4 - x$ ,  $g(x) = \sqrt{x} - x$

**مثال ۵-۵** اگر  $f(x) = \sqrt{x}$  و  $g(x) = 2x - 1$  باشد، آنگاه  $(f \circ g)(x)$  را بیابید.

**مثال ۵-۶** اگر  $f(x) = x^3 - 2$  و  $g(x) = x^3 - 1$  باشد، آنگاه ضابطه  $(g \circ f)(x)$  و مقادیر  $(g \circ f)(-3)$  و  $(g \circ f)(0)$  را بیابید.

**مثال ۷** در هر کدام از حالت های زیر ضابطه و مقدار خواسته شده را بیابید.

الف)  $f(x) = \sqrt{x+4}$  ،  $g(x) = x^2 \rightarrow (f \circ g)(x) = ?$  ،  $(g \circ f)(x) = ?$

ب)  $f(x) = x^2 - 5$  ،  $g(x) = \sqrt{x+4} \rightarrow (g \circ f)(x) = ?$  ،  $(f \circ g)(5) = ?$

پ)  $f(x) = \sqrt{x+4}$  ،  $g(x) = \sqrt{x^2 - 1} \rightarrow (f \circ g)(x) = ?$  ،  $(g \circ f)(0) = ?$

ت)  $f(x) = \frac{2x-1}{3}$  ،  $g(x) = \frac{6x-1}{3x+1} \rightarrow (g \circ f)(x) = ?$  ،  $(f \circ g)(-1) = ?$

ث)  $f(x) = \log_{10}(x^2 - x + 1)$  ،  $g(x) = \sin x \rightarrow (f \circ g)(x) = ?$  ،  $(g \circ f)(\frac{\pi}{2}) = ?$

ج)  $f(x) = \sin x$  ،  $g(x) = |\sqrt{x} - 1| \rightarrow (g \circ f)(x) = ?$  ،  $(f \circ g)(0) = ?$

**مثال ۵-۸** اگر  $f(x) = x^3 + 2$  و  $g(x) = x - 1$  باشند، نمودار تابع  $(f \circ g)(x)$  رارسم کنید.

**مثال ۵-۹** اگر  $f = \{(1,3), (2,5), (5,7), (7,9)\}$  و  $g = \{(1,2), (3,4), (5,4), (7,11), (9,1)\}$  دو تابع باشند، در این صورت حاصل  $(f \circ g)$  و  $(g \circ f)$  را بیابید (از نمودار ون بهره بگیرید).

**مثال ۵-۱۰** حاصل ترکیب توابع  $f$  و  $g$  را با توجه به توابع داده شده زیر بیابید.

$$f = \{(12, 8), (-1, 5), (4, -3), (3, -4)\} \quad , \quad g = \{(3, 12), (5, -1), (7, 4), (4, 3)\}$$

**مثال ۵-۱۱** هرگاه  $f(f(x))$  و  $g(f(x))$  توابع  $g = \{(4, 2), (2, -1), (5, 6)\}$  و  $f = \{(1, 2), (3, 4), (2, 3)\}$  را بیابید؟

**مثال ۱۲-اگر**  $f = \{(2,1), (1,2), (3,2), (4,5)\}$  و  $g = \{(1,2), (3,1), (a,3), (b,1)\}$  در این صورت دو تابی  $(a,b) \in gof$  چقدر است؟

**مثال ۱۳-با توجه به جدول زیر موارد خواسته شده را بیابید.**

x	-1	0	1	2	3
f(x)	0	-1	2	-5	2
g(x)	2	3	4	-2	3

- ۱)  $f \circ f(-1)$       ۲)  $g \circ g(0)$       ۳)  $f \circ g(0)$   
 ۴)  $g \circ f(0)$       ۵)  $f \circ (f+g)(0)$       ۶)  $(g+f \circ g)(3)$

**مثال ۱۴-اگر**  $f(x) = x\sqrt[3]{x+1} - 2x$  باشد، مقدار  $f \circ f(7)$  را بیابید.

**مثال ۱۵-اگر**  $\left(\frac{f}{gof}\right)(x) = \frac{3}{x+1}$  و  $f(x) = \sqrt{x+1}$  حاصل  $g(x) = ?$  را بیابید.

**مثال ۱۶-اگر**  $f(x) = 3x + 2$  و  $g(x) = x^2 + 1$  معادله  $(gof)(x) = 5$  را حل کنید.

**مثال ۱۷-با توجه به ضابطه های  $f(x)$  و  $g(x)$  معادلات زیر را تشکیل دهید و آنها را حل کنید.**

الف)  $f(x) = 2x - 5$ ,  $g(x) = x^2 - 3x + 8$ ,  $f \circ g(x) = 7$

ب)  $f(x) = 3x^2 + x - 1$ ,  $g(x) = 1 - 2x$ ,  $g \circ f(x) = 5$

**مثال ۱۸-اگر**  $f(x) = x + 2$  و  $g(x) = 3x - 1$  معادلات زیر را بیابید.

الف)  $f \circ g(x) + g \circ f(x) = f(g(x))$       ب)  $f \circ g(x) = g \circ f(x)$

**مثال ۱۹-اگر**  $f(x) = 2x + 3$  و  $g(f(x)) = 8x^2 + 12x + 20$  باشد، ضابطه  $f(x)$  را بیابید.

**مثال ۲۰** - اگر  $f(x) = \frac{x}{x-3}$  و  $g(x) = 2x - 1$  را بیابید.

**مثال ۲۱** - اگر  $f(x) = x^2 + 5x + 4$  و  $g(x) = 3x^2 + x - 2$  در این صورت مجموع جواب معادله  $f(g(x)) = 0$  چقدر است؟

**مثال ۲۲** - اگر  $f(\sqrt{x} + 1) = x + 2\sqrt{x} + 2$  باشد، مقدار  $f(\sqrt{2})$  کدام است؟

**مثال ۲۳** - اگر  $f(x) = x + a$  و  $g(x) = ax^2 + bx + c$  باشد، مقادیر  $a$  و  $b$  و  $c$  را طوری بیابید که:

$$(fog)(x) = x^2 - 3x + 4$$

**مثال ۲۴** - اگر خروجی ماشین مقابل  $\frac{4}{3}$  باشد مقدار ورودی چقدر است؟

$$\text{خروجی} \rightarrow 2x - 2 \rightarrow \frac{x}{\sqrt{x+1}} \rightarrow \text{ورودی}$$

**مثال ۲۵** - اگر  $f(x) = 1 - \frac{x}{2}$  و  $g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)$  را بیابید.

# مرکز مشاوره تحصیلی

**مثال ۲۶** - اگر خروجی ماشین مقابل برای ورودی ۲، برابر ۵ باشد. مقدار  $A$  چقدر است؟

$$\text{خروجی} \rightarrow 2x + A \rightarrow \sqrt{x} - 2x - 4 \rightarrow \text{ورودی}$$

**مثال ۲۷** - اگر  $f(x) = x^2 - 2x$  و  $g(x) = x^2 - 2x - 4$  باشد صفر های تابع  $f(g(x))$  را بیابید.

**مثال ۲۸** - اگر  $f$  یک تابع خطی باشد، ضابطه  $f$  را در هر یک از حالات زیر بیابید.

(الف)  $f(f(x)) = 4x + 3$

(ب)  $f(1-x) = 5x + 1$

**مثال ۲۹**- دو تابع مانند  $f$  و  $g$  مثال بزنید که  $fog(x) = gof(x)$  باشد.

**مثال ۳۰**- اگر  $g(x) = 2x + 1$  و  $h(x) = 4x^2 + 4x + 5$  تابعی مانند  $f$  بباید به قسمی که  $fog = h$  باشند، تابع  $fog$  را با نوشتن اعضا مشخص کنید.

**مثال ۳۱**- اگر  $f(x, x+1) | x \in A$  و  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  باشند، تابع  $fog$  را با نوشتن اعضا مشخص کنید.

**مثال ۳۲**- اگر  $f(g(x)) = 4x$  در این صورت  $f(g(x)) = 2x - 1$  و  $g(x) = 2x + 1$  در این صورت  $f(x)$  را بباید.

**مثال ۳۳**- در هر مورد ضابطه  $f(x)$  را بباید.

$$\begin{aligned} \text{(الف)} \quad f\left(\frac{1}{x}\right) &= x - 3 \\ \text{(ب)} \quad f\left(\frac{x}{x+2}\right) &= x + 2 \\ \text{(پ)} \quad f(3-x) &= x + 5 \\ \text{(ث)} \quad f(x - \frac{1}{x}) &= x^2 + \frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

**مثال ۳۴**- اگر  $f(2x) = \frac{2}{x}$  و  $g(x) = -3x + 1$  باشد، حاصل  $fog(x)$  را بباید.

**مثال ۳۵**- اگر  $g(2x) = 4x + 3$  و  $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$  باشد، حاصل  $gof$  را بباید.


**مثال ۳۶**- اگر  $f(x) = \frac{2x}{x+1}$  و  $g(x) = 3x$  باشد، حاصل  $fog(x)$  را بباید.

**مثال ۳۷**- اگر  $f(x) = \sqrt{x}$  و  $g(x) = \frac{x}{x+1}$  باشد، مقدار  $f(g(x))$  را بباید.

**مثال ۳۸**- اگر  $f(x) = \frac{x}{x+1}$  و  $g(x) = fog(x)$  باشد، تابع  $g(x)$  را بباید.

دانش آموزی اینجا شروع می‌شود

**مثال ۳۹** - اگر نمودار های  $f$  و  $g$  به صورت مقابل باشند، مقادیر خواسته شده را بیابید.



**مثال ۴۰** - اگر  $f(x) = \sqrt{x+1}$  و  $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$  باشند، آن گاه  $f(g(x))$  را بیابید.

**مثال ۴۱** - اگر  $f(x) = \frac{2x+1}{x-5}$  و  $fog(x) = 2x-1$  باشند،  $g(x)$  را بیابید.

**مثال ۴۲** - اگر  $f(x) + f(5) = 4x+2$  باشد،  $f(x)$  را بیابید.

**مثال ۴۳** - اگر  $af(x) + bf(-x) = 4x+2$  باشد،  $f(x)$  را بیابید.

**مثال ۴۴** - اگر  $f(x) + xf(-x) = x^3 + x$  باشد،  $f(x)$  را بیابید.

**مثال ۴۵** - اگر  $f(x)$  باشد،  $f\left(\frac{x}{x^2+1}\right) = \frac{x^2}{x^4+1}$  را بیابید.

**مثال ۴۶** - اگر  $f(2x-1) = \begin{cases} x^2+1 & x \geq 1 \\ \frac{x}{2} & x < 1 \end{cases}$  باشد،  $f(x)$  را بیابید.

**مثال ۴۷** - فرض کنید  $f(x)$  و  $g(x)$  دو تابع دلخواه باشند. برای یافتن  $D_{fog}$  دو راه زیر را پیشنهاد می کنیم:

راه اول: برد  $(x)g$  را محاسبه کنیم و آن را با دامنه  $x$  اشتراک بگیریم و  $x$  های سازنده ای این برد را بیابیم.

راه دوم: ضابطه  $fog$  را می یابیم و پس از ساده کردن تابع به دست آمده را تعیین دامنه می کنیم.

آیا این دو راه به جواب یکسان می رساند؟ اگر آری ثابت کنید و اگر خیر یک مثال بیاورید. کدام راه صحیح است؟

**مثال ۴۸** اگر  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$  و  $g(x) = 4x^2 - 1$  باشند، مطلوب است تعیین دامنه تابع  $fog$ .

**مثال ۴۹** اگر  $f(x) = \frac{2}{x+3}$  و  $g(x) = \frac{3}{x-1}$  باشند، مطلوب است تعیین دامنه تابع  $fog$ .

**مثال ۵۰** اگر  $f(x) = \frac{x^2-1}{x+2}$  و  $g(x) = \frac{3}{x-1}$  باشند، مطلوب است:

الف) ضابطه  $fog(x)$   
ب)  $D_{fog}$

**مثال ۵۱** اگر  $f(x) = \sqrt{x-1}$  و  $g(x) = \sqrt{x-5}$  باشند، مطلوب است محاسبه دامنه تابع  $fog$ .

**مثال ۵۲** اگر  $f(x) = \sqrt{5-x}$  و  $g(x) = x^2 + 4x$  باشند، مطلوب است محاسبه دامنه تابع  $fog$ .

**مثال ۵۳** اگر  $f(x) = x-2$  و  $g(x) = x^2 - 1$  باشند، آنگاه دامنه  $fog$  را بیابید.

**مثال ۵۴** اگر  $f(x) = \sqrt{x-1}$  و  $g(x) = 2x^2 + 3x - 1$  باشند، آنگاه دامنه  $gof$  را بیابید.

**مثال ۵۵** اگر  $f(x) = \frac{2}{x-1}$  و  $g(x) = \frac{3}{x}$  باشند، آنگاه دامنه  $gof$  و  $fog$  را بیابید.

**مثال ۵۶** اگر  $f(x) = \sqrt{x}$  و  $g(x) = \frac{1}{x^2-4}$  باشند، مطلوب است:

الف) دامنه توابع  $f$  و  $g$  و  $fog$   
ب) ضابطه  $gof$

همه رسانه های ما

**مثال ۵۷** - برای دو تابع  $f(x) = \frac{x}{x-3}$  و  $g(x) = \sqrt{x+2}$  مقدار  $(f \circ g)(x)$  را محاسبه کنید.

الف) مقدار  $(g \circ f)(x)$  را محاسبه کنید.

ب) دامنه  $gof$  را با استفاده از تعریف به دست آورید.

پ) ضابطه  $(gof)(x)$  را بیابید.

**مثال ۵۸** - برای دو تابع  $f(x) = \log(x-1)$  و  $g(x) = x+1$  مقدار  $(f \circ g)(x)$  را محاسبه کنید.

الف) مقدار  $(g \circ f)(x)$  را بیابید.

ب) دامنه  $gof$  و  $fog$  را با استفاده از تعریف به دست آورید.

پ) ضابطه های  $(f \circ f)(x)$  و  $(g \circ g)(x)$  را بیابید.

**مثال ۵۹** - اگر  $f(x) = x^3$  و  $g(x) = x^2 + 1$  ،  $x \leq 0$  مقدار  $(f \circ g)(x)$  را باشند، مطلوب است محاسبه دامنه تابع  $fog$ .

**مثال ۶۰** - اگر داشته باشیم  $f = \{(1,2), (3,4), (2,3)\}$  و  $g = \{(4,3), (2,-1), (5,6)\}$  ، تابع  $gof$  و  $fog$  را بیابید.

بیابید.

**مثال ۶۱** - اگر داشته باشیم  $f = \{(-1,8), (4,6), (2,4), (4,3), (3,2)\}$  ، تابع  $f \circ f \circ f$  را بیابید.

**مثال ۶۲** - اگر  $f(x) = (x^2, 3x-1)$  باشند، مقدار عددی  $A = \{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 4, 5\}$  را بیابید.

**مثال ۶۳** - در تابع  $f = \{(1,3), (5,-1), (3, a^2 - a)\}$  مقدار  $a$  را طوری بیابید که  $f(f(1)) = 2$  گردد.

**مثال ۶۴** - اگر  $f(x) = x^2 - 2x$  و  $g(x) = \sqrt[3]{x-7}$  باشند، مقدار عبارت  $f(g(f(1)))$  را بیابید.

**مثال ۶۵** - اگر  $f(x) = 2x - 2$  و  $g(x) = x^2 - 1$  باشند، جواب معادله  $(fog)(x) = 0$  را بیابید.

**مثال ۶۶-** اگر داشته باشیم  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  و  $g(x) = x^3$  نشان دهید که :  $(fog)(x) = gof(x)$

**مثال ۶۷-** اگر  $f(x) = 3x + 2$  و  $g(x) = 2x^2 - x + 1$  باشند، مقدار  $a$  را طوری بیابید که  $(fog)(a) = gof(a)$

**مثال ۶۸-** اگر  $f(x) = 2x + 5$  و  $g(x) = 9x + 7$  باشند، حاصل  $(fog)(x) - gof(x)$  را بیابید.

**مثال ۶۹-** ضابطه‌ی تابع خطی  $f$  را چنان بیابید که  $f(f(f(x))) = 4x + 21$  باشد سپس حاصل  $f(f(f(x)))$  را بیابید.

**مثال ۷۰-** اگر  $f(x+2) = x^2 + x$  باشد، حاصل  $f(5), f(-2)$  را بیابید.

**مثال ۷۱-** اگر داشته باشیم  $g(x) = x + 1$  و  $f(x) = x^2 - 5x + 1$  آن‌گاه ضابطه‌ی  $(fog)(x)$  را بیابید.

**مثال ۷۲-** اگر داشته باشیم  $f(x) = (x+1)^2$  و  $g(x) = x^4$  ضابطه‌ی  $(fog)(x)$  را محاسبه کنید.

**مثال ۷۳-** اگر  $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$  باشد، حاصل  $f\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$  را بیابید.

**مثال ۷۴-** اگر داشته باشیم  $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2} - 3x$  آن‌گاه ضابطه‌ی  $(fog)(x)$  را بیابید.

**مثال ۷۵-** اگر  $f(x) = 5x - 1$  و  $g(x) = x^2 - 2\sqrt{x} + 7$  باشند، ضابطه‌ی  $(fog)(x)$  را بیابید.

**مثال ۷۶-** اگر  $f(x) = |x|$  و  $g(x) = x^2 + 2x + 1$  باشد، حاصل  $fog(1-\sqrt{2}) - gof(1-\sqrt{2})$  را بیابید.

دانش آموزی اینجا شروع می‌شود

**مثال ۷۷-۱** اگر  $f(x) = \frac{1-x}{x^2}$  باشد، مقدار  $f(g(x)) = \cos(x)$  را به ساده ترین صورت ممکن به دست آورید.

**مثال ۷۸-۲** اگر  $f(x) = 2x$  و  $g(x) = 2x + 2$  باشند، ضابطه  $g(g(x))$  را بیابید.

**مثال ۷۹-۳** اگر  $f(x) = 2x - 5$  و  $g(x) = 5x + 4$  باشد، تابع  $f(g(x))$  را محاسبه نمایید.

**مثال ۸۰-۴** اگر  $f(x) = x^2 - 2x - 3$  و  $g(x) = x^2 - 4x - 8$  باشند،  $f(g(x))$  را طوری بیابید که:

**مثال ۸۱-۵** اگر  $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$  و  $g(x) = \frac{x+7}{2x-5}$  باشند، ضابطه تابع  $f(g(x))$  را بدست آورید.

**مثال ۸۲-۶** اگر  $f(x) = \sqrt{1-x}$  و  $g(x) = \frac{1}{x^2-4}$  دو تابع باشند.

الف) نمودار تابع  $f$  را با استفاده از انتقال رسم کنید.

ب) تابع  $(gof)(x)$  را بسازید.

پ) دامنه  $(D_{fog})$  را بسازید.

**مثال ۸۳-۷** اگر  $f(x+3) + f(5) = 3x - 4$  مقدار  $f(6)$  را به دست آورید.

**مثال ۸۴-۸** دو تابع  $f(x) = x - 1$  و  $g(x) = \sqrt{x+2}$  را در نظر بگیرید:

الف) دامنه  $(gof)(x)$  را بدون محاسبه به دست آورید.

ب) ضابطه  $(gof)$  را به دست آورید.

پ) مقدار  $\left(\frac{f}{g}\right)(2)$  را محاسبه کنید.

**مثال ۸۵** - اگر  $f(x) = \sqrt{9-x^2}$  و  $g(x) = \frac{1}{x-2}$  ضابطه و دامنه توابع  $gof$  ،  $gog$  و  $fof$  را بیابید.

**مثال ۸۶** - اگر  $f(x) = \frac{x-1}{2x+1}$  و  $g(x) = \frac{2x-1}{2x+1}$  ضابطه و دامنه توابع  $fog$  ،  $gof$  و  $fog$  را بیابید.

**مثال ۸۷** - اگر  $f(x) = \begin{cases} (1, 2), (3, a), (4, -1), (a, a+1) \end{cases}$  مقدار  $a$  را بیابید.

**مثال ۸۸** - اگر  $f(x) = x^3$  و  $g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)$  ضابطه  $g(1-t^2)$  را بیابید.

**مثال ۸۹** - اگر  $g(x) = \frac{2x}{x+1}$  و  $fog(x) = \sqrt{x+1}$  ضابطه  $f$  را بیابید.

**مثال ۹۰** - اگر  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$  و  $fog(x) = -f(x)$  ضابطه  $f$  را بیابید.

**مثال ۹۱** - اگر  $f(x) = x^2 + x + 1$  و  $g(x) = x^2$  و برد تابع  $g$  شامل هیچ عدد مثبتی نباشد ضابطه تابع  $fog$  را بیابید.

**مثال ۹۲** - اگر  $f(x) = x^2 + 2x + 2$  باشد، تابع  $(fog)(x) = x^2 - 4x + 5$  را به گونه‌ای مشخص کنید که  $g$  را به گونه‌ای مشخص کنید که

آنکه عامل آن را بتوانیم عبارتی از  $x$  درست نماییم

## درس دوم || ترکیب توابع

**مثال ۹۳** - اگر  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$  و  $g(x) = \sqrt{x+1}$  ، ضابطهٔ توابع  $fog$  و  $fog$  را بیابید و سپس به کمک تعریف، دامنه هر یک را بیابید.

**مثال ۹۴** - اگر  $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$  و  $g(x) = 2\sqrt{x}$  ، ضابطهٔ توابع  $fog$  را بیابید و سپس به کمک تعریف دامنه را بیابید.


**مثال ۹۵** - اگر  $D_g = [-2, 4]$  و  $f(x) = \sqrt{2x+6}$  دامنهٔ تابع  $gof$  را بیابید.

**مثال ۹۶** - اگر  $\begin{cases} g: [-2, 4] \rightarrow \mathbb{R} \\ g(x) = 1 - 2x \end{cases}$  و  $\begin{cases} f: [1, 4] \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = 2x - 3 \end{cases}$  دامنهٔ تابع  $gof$  را بیابید.

**مثال ۹۷** - اگر  $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$  و  $f = \{(1, 2), (3, -1), (4, -1), (-1, 0)\}$  توابع  $fog$  و  $fog$  را بیابید و دامنه و برد هر یک را مشخص کنید.

**مثال ۹۸** - دامنهٔ تابع  $y = f(x)$  به صورت  $[-4, 1]$  است. دامنهٔ تابع  $y = 3 - f\left(x + \frac{1}{2}\right)$  را بیابید.


**مثال ۹۹** - در شکل زیر نمودار تابع  $f$  داده شده است. به کمک آن نمودار توابع  $(f(x))^2$  و  $f(-x)$  را رسم کنید.



**مثال ۱۰۰** - با توجه به ضابطه  $f(x) = \sqrt{x}$  نمودار تابع زیر را رسم کنید و دامنه و برد آن‌ها را بیابید.

- ۱)  $y = f(-x)$       ۲)  $y = -f(x)$       ۳)  $y = -f(-x)$       ۴)  $y = -f(-x) - 2$

**مثال ۱۰۱** - در شکل زیر نمودار تابع  $f$  با دامنه  $[-4, 4]$  داده شده است. به کمک آن نمودار توابع  $(x) - f$  و  $(2x) f$  را رسم کنید.





**مثال ۱۰۲** - با استفاده از نمودار  $y = \cos x$ ، نمودار توابع زیر رسم شده است، ضابطه هر نمودار را مشخص کنید.

(الف)  $y = -\frac{1}{2} \cos(-\frac{1}{2}x)$


(ب)  $y = 2 \cos 2x$

(پ)  $y = \cos(\frac{1}{2}x)$

(ت)  $y = -\cos 2x$



**مثال ۱۰۳** - با استفاده از نمودار تابع  $f$  نمودار توابع زیر را رسم کنید.



(الف)  $y = \frac{1}{2} f(2x) - 1$

(ب)  $y = -f(-x) + 2$

(پ)  $y = 2f(x-1) - 3$

(ت)  $y = 2f(\frac{1}{2}x)$

**مثال ۱۰۴** - اگر  $f(x) = x^2$  با روش رسم نمودار، تعداد نقاط تلاقی دو نمودار  $y = f(x+2)$  و  $y = f(x-2)$  را بیابید.

**مثال ۱۰۵** - اگر دامنه و برد تابع  $y = f(x)$  به ترتیب برابر  $[-3, 2]$  و  $[2, 6]$  باشد. دامنه و برد توابع زیر را بیابید.

۱)  $y = f(x) + 2$

۲)  $y = f(x+2)$

۳)  $y = f(2x)$

۴)  $y = f\left(\frac{x}{2}\right)$

۵)  $y = 2f(x) - 3$

۶)  $2 - f(x-2)$

**مثال ۱۰۶** - نقطه  $A(-2, -1)$  روی تابع  $y = 2 + f(x - 2)$  قرار دارد. مختصات نقطه  $A$  روی نمودار  $y = \frac{1}{2}f(x)$  را بدست آورید.

**مثال ۱۰۷** - با توجه به ضابطه  $f(x) = \sqrt{x}$  نمودار تابع زیر را رسم کنید و دامنه و برد آن ها را بیابید.

$$\text{۱) } y = f(2x) \quad \text{۲) } y = f\left(\frac{1}{2}x\right) \quad \text{۳) } y = -f(x) + 1 \quad \text{۴) } y = -f(-x) - 2$$

**مثال ۱۰۸** - نمودار تابع  $y = -2x^2 + 1$  را دو واحد به سمت پایین سپس یک واحد به سمت چپ و در آخر نسبت به محور

$x$  ها قرینه می کنیم . ضابطه نمودار جدید را بیابید.

**مثال ۱۰۹** - نمودار  $y = \sqrt{x}$  را نسبت به محور  $y$  ها انعکاس داده ایم. سپس آن را چهار واحد در جهت راست و بعد ۳ واحد به پایین حرکت داده ایم. ضابطه  $y$  تابع به دست آمده را بنویسید.

**مثال ۱۱۰** - تابع  $f(x) = 1 - |x|$  را با دامنه  $[-2, 2]$  در نظر بگیرید. نمودار آن را رسم کنید.

الف) دامنه  $y$  تابع  $f(2x)$  را بدست آورید و نمودار آن را رسم کنید.

ب) دامنه  $y$  تابع  $y = f\left(\frac{1}{3}x\right)$  و  $y = f(3x)$  را بدست آورید و نمودار آن را رسم کنید.

**مثال ۱۱۱** - اگر  $f(x) = \sin(x)$  مطلوب است رسم نمودار تابع زیر :

$$\text{۱) } y = f(2x) \quad \text{۲) } y = f\left(\frac{1}{2}x\right) \quad \text{۳) } y = -f(-x) \quad \text{۴) } y = -f(-x)$$

**مثال ۱۱۲** - در هر مورد توضیح دهید که نمودار  $g$  چگونه از نمودار  $f$  به دست می آید؟

$$g(x) = -\frac{1}{2}\sqrt{-x+1} + 3 \leftarrow f(x) = \sqrt{x}$$

$$g(x) = 2(x+4)^2 - 3 \leftarrow f(x) = x^2$$

$$g(x) = -2\left|x - \frac{1}{3}\right| + 1 \leftarrow f(x) = |x|$$

**مثال ۱۱۳** - نقطه‌ی  $(-6, 4)$  روی نمودار  $y = f(x)$  قرار دارد. در توابع زیر این نقطه با چه نقطه‌ای متناظر می‌شود؟

- ۱)  $g(x) = \frac{1}{2}f(x)$       ۲)  $g(x) = f(x) - 2$       ۳)  $g(x) = f(-x)$       ۴)  $g(x) = 3f\left(\frac{x}{2} + 2\right)$

**مثال ۱۱۴** - الف) نمودار تابع زیر رارسم کنید.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x < -1 \\ |x| & -1 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{x-1} & x > 1 \end{cases}$$

ب) به کمک نمودار تابع  $f$  نمودار تابع  $y = f(2x)$ ,  $y = f(-2x)$ ,  $y = -f(2x)$  رارسم کنید.

**مثال ۱۱۵** - اگر در تابع  $f$  مقدار  $(2, 8)$ ، دامنه و برد تابع  $y = 2f\left(\frac{x-1}{2}\right) - 1$  را بیابید.

**مثال ۱۱۶** - اگر برد تابع  $y = f(x)$  در بازه  $[c, d]$  باشد، دامنه و برد تابع  $y = kf(x)$  را بیابید.


**مثال ۱۱۷** - اگر  $\{(1, 2), (2, 5), (3, -4)\}$  مطلوب است تعیین تابع  $y = 3f\left(\frac{x}{2} - 1\right)$ .

**مثال ۱۱۸** - اگر دامنه و برد تابع  $y = 3f\left(\frac{x}{2}\right)$  به ترتیب بازه‌های  $[-4, 1]$  و  $(-1, 2)$  باشند دامنه و برد تابع زیر را بیابید.


$$\text{ب) } y = -f(1 - 3x) \quad \text{الف) } y = f(x)$$

**مثال ۱۱۹** - برد تابع  $y = -2f(3x - 1) + 3$  بازه  $(-3, 1)$  است. برد تابع  $f$  را بیابید.


**مثال ۱۲۰** - در زیر نمودار  $y = f(x)$  رسم شده است. با استفاده از انتقال، ابتدا نمودار  $y = -2f(x - 3)$  رارسم کنید و سپس نمودار تابع  $y = -2f(x - 3)$  رارسم کنید.




- مثال ۱۲۱** - نمودار تابع  $f$  به صورت زیر رسم شده است. به کمک آن نمودار تابع های  $-f(-x)$  و  $f\left(\frac{1}{2}x\right)$  و  $f(x-1)+2$  را رسم کنید. (هر نمودار را در دستگاه مجزا بکشید).



- مثال ۱۲۲** - در شکل زیر نمودار تابع  $y = f(x) - \frac{x}{3}$  رسم شده است. نمودار تابع  $y = 3f(1-x)$  را رسم کنید.



- مثال ۱۲۳** - اگر نمودار تابع  $(x)f$  به صورت زیر باشد، نمودار تابع زیر را رسم کنید و دامنه و برد آن را بنویسید.



- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ب) $y = 2f(x)$                         | الف) $y = f(x-1)+2$         |
| ت) $y = f(2x)$                         | پ) $y = -2f(x)$             |
| ج) $y = f(-2x)$                        | ث) $y = -f(-x)$             |
| ح) $y = f\left(-\frac{1}{2}x\right)+1$ | چ) $y = -\frac{1}{2}f(x)+1$ |
| د) $y = -f(-x-1)$                      | خ) $y = f(2x-1)$            |

# مرکز مشاوره تحصیلی

- مثال ۱۲۴** - نقطه  $A(3, 4)$  روی منحنی نمایش تابع  $y = f(x) + 3$  قرار دارد. این نقطه روی نمودار  $y = -f(x)$  متناظر با نقطه  $B = (....., .....$  ) است.

- مسئلہ ۱۲۵** - در تابع با ضابطه  $y = f(x) = \begin{cases} x - \sqrt{x+4} & x > 3 \\ 2x+3 & x \leq 3 \end{cases}$  کدام است؟
- ۹ (۴)      ۸ (۳)      ۷ (۲)      ۶ (۱)

- مسئلہ ۱۲۶** - اگر  $f(x+3) = x^2 - 4x + 5$  کدام است؟

- ۱)  $x^2 + 1$       ۲)  $x^2 + 3$       ۳)  $x^2 + 4x + 5$       ۴)  $x^2 - 4x + 5$

۱۲۷-اگر  $fog(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$  و  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{-x^2 + x + 2}}$  کدام است؟

$$\left(-\frac{1}{2}, \infty\right) \quad (4)$$

$$\left(\frac{1}{2}, +\infty\right) \quad (3)$$

$$(-2, \cdot) \quad (2)$$

$$\left(-1, \frac{1}{2}\right) \quad (1)$$

۱۲۸-اگر  $g(x) = \sqrt{4x+1}$  و  $f(x) = x^2 + x$  باشند، مساحت ناحیه محدود به نمودار تابع  $gof$  و خط به معادله  $y = 3$  کدام است؟

$$4/5 \quad (4)$$

$$6 \quad (3)$$

$$4 \quad (2)$$

$$3 \quad (1)$$

۱۲۹-دو تابع  $f^{-1}(g(2a)) = 6$  و  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  مفروض اند. اگر  $g(x) = \{(2,5), (6,3), (3,7), (4,1), (1,9)\}$  باشد مقدار  $a$  کدام است؟

$$\frac{1}{2} \quad (4)$$

$$\frac{3}{4} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\frac{5}{2} \quad (1)$$

۱۳۰-اگر  $g(x) = \frac{2x+2}{2-x}$  و  $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$  باشند، ضابطه‌ی تابع  $(f \circ g)(x)$  کدام است؟

$$2x \quad (4)$$

$$x \quad (3)$$

$$x+1 \quad (2)$$

$$x-1 \quad (1)$$

۱۳۱-دو تابع  $g(x) = \sqrt{5x+9}$  و  $f = \{(5,2), (7,3), (1,4), (3,6), (9,1)\}$  مفروض اند. اگر  $(g^{-1} \circ f^{-1})(a) = 8$  باشد مقدار  $a$  کدام است؟

$$6 \quad (4)$$

$$7 \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۱۳۲-اگر  $g(x) = \frac{1-3x}{2+x}$  و  $f(x) = \frac{2x+3}{2-x}$  باشند، ضابطه‌ی تابع  $(f \circ g)(x)$  کدام است؟

$$-x \quad (4)$$

$$x \quad (3)$$

$$x+1 \quad (2)$$

$$-x-1 \quad (1)$$

۱۳۳-اگر  $g(x) = \frac{2x+2}{2-x}$  و  $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$  باشند، ضابطه‌ی تابع  $(f \circ g)(x)$  کدام است؟ (ت ۹۶)

$$2x \quad (4)$$

$$x \quad (3)$$

$$x+1 \quad (2)$$

$$x-1 \quad (1)$$

۱۳۴-اگر  $f(x) = 8x^2 + 6x + 5$  و  $g(x) = 2x + 1$  باشد، تابع  $fog(x)$  کدام است؟

$$2x^2 - 2x + 3 \quad (4)$$

$$2x^2 - x + 4 \quad (3)$$

$$2x^2 + x + 3 \quad (2)$$

$$2x^2 + 3x + 1 \quad (1)$$

## درس دوم || ترکیب توابع

تست ۱۳۵ - اگر  $f(x) = \sqrt{3-x}$  باشد، دامنهٔ تابع  $fog$  کدام است؟

- [−۴, −۲] ∪ (−۲, ۲) (۴)    [−۴, −۱] ∪ (۱, ۲) (۳)    [−۲, ۰] (۲)    [−۴, ۲] (۱)

تست ۱۳۶ - اگر  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 5 & x \geq 0 \\ 3x + 5 & x < 0 \end{cases}$  آنگاه حاصل  $f(-f(x))$  کدام است؟

- $3x + 5$  (۴)     $3$  (۳)     $f(3)$  (۲)     $f(x)$  (۱)

تست ۱۳۷ - اگر  $fog(x) = 2x - 1$  و  $f(x) = x^2 - 3x$  کدام است؟

- ۵ (۴)     $\frac{5}{2}$  (۳)     $\frac{3}{2}$  (۲)    ۳ (۱)

تست ۱۳۸ - اگر  $g(x) = \frac{x+1}{3x-1}$  و  $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$  دارای چند نقطه مشترک هستند؟

- ۴ هیچ (۴)    ۳ (۳)    ۲ (۲)    ۱ (۱)

تست ۱۳۹ - اگر  $f(x) = x^2 + x + b$  و  $g(x) = 2x + 1$  فقط یک ریشه داشته باشد  $b$  کدام است؟

- ۷/۲۵ (۴)    ۱۰/۲۵ (۳)    ۸/۲۵ (۲)    ۹/۲۵ (۱)

تست ۱۴۰ - اگر  $f(x) = 2x - 1$  و  $g(x) = 2x^2 - 6x + 5$  آنگاه ضابطه  $fog$  کدام است؟

- $x^2 - 3x + 6$  (۴)     $x^2 - 3x + 3$  (۳)     $x^2 - 3x + 1$  (۲)     $x^2 - 3x + 2$  (۱)

تست ۱۴۱ - اگر  $f(x) = 4x^2 - 6x + 5$  و  $g(x) = 2x - 1$  آنگاه ضابطه  $fog$  کدام است؟

- $x^2 - x + 3$  (۴)     $x^2 - x$  (۳)     $x^2 - x + 2$  (۲)     $x^2 - x + 1$  (۱)

تست ۱۴۲ - اگر  $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$  آنگاه ضابطه  $fog(x) = 2x - 1$  کدام است؟

- $\frac{x-4}{x+2}$  (۴)     $\frac{x-1}{x+5}$  (۳)     $\frac{x+1}{x-5}$  (۲)     $\frac{2x-2}{2x+1}$  (۱)

تست ۱۴۳ - اگر  $f(g(x)) = x^2 - 5x$  و  $f(x) = x^2 - x - 6$  آنگاه ضابطه  $g(x)$  کدام می‌تواند باشد؟

- $4 - x$  (۴)     $3 - x$  (۳)     $2 - x$  (۲)     $1 - x$  (۱)

## فصل ۱ تابع

تست ۱۴۴-اگر  $f(x) = \sqrt{2-x-x^2}$  باشد، مقدار  $f(f(-1))$  کدام است؟ (تجربی خارج ۸۸)

 $\sqrt{2}$  (۴)

۱ (۳)

۲ (صفر)

۱) تعریف نشده

تست ۱۴۵-اگر  $f(x) = \sqrt{x+2|x|}$  باشد، مقدار  $f(f(-144))$  کدام است؟ (تجربی ۸۸)

۶ (۴)

۸ (۳)

۱۲ (۲)

۱) تعریف نشده

تست ۱۴۶-در تابع با ضابطه  $x > 3$   
در تابع با ضابطه  $x \leq 3$  کدام است؟ (تجربی داخل ۹۰)

$$f(f(5))+f(f(1)) = f(x) = \begin{cases} x - \sqrt{x+4} \\ 4x + 3 \end{cases}$$

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۶ (۱)

تست ۱۴۷-اگر  $fog(1-\sqrt{2}) - gof(1-\sqrt{2})$  باشد حاصل  $g(x) = x^4 + 2x + 1$  و  $f(x) = |x|$  کدام است؟ (تجربی داخل ۸۹)

 $4\sqrt{2}$  (۴)

۴ (۳)

 $4(\sqrt{2}-1)$  (۲) $4(1-\sqrt{2})$  (۱)

تست ۱۴۸-اگر  $f(x) = |x| - x$  ضابطه تابع  $(f \circ f)(x)$  برابر کدام است؟ (تجربی داخل ۸۳)

۴) صفر

 $x + |x|$  (۳) $|x|$  (۲)

x (۱)

تست ۱۴۹-اگر  $f(x) = x + \sqrt{x}$  باشد، عدد  $a$  کدام است؟ (تجربی داخل ۹۰)

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

تست ۱۵۰-اگر  $f(x) = (2x-3)^2$  و  $g(x) = x+2$  باشد، نمودارهای دو تابع  $f, fog$  با کدام طول متقاطع اند؟ (تجربی ۹۲)

 $\frac{1}{2}$  (۴) $\frac{3}{2}$  (۳)

۱ (۲)

-۱ (۱)

تست ۱۵۱-تابع با ضابطه  $y = g(x) = x - \sqrt{x}$  مفروض است، اگر نمودار تابع  $f$ ، محور  $x$  ها را در دو نقطه به طول های

$\frac{-1}{4}$ ،  $\frac{5}{4}$  قطع کند، آنگاه نمودار تابع  $fog$  محور  $x$  را با کدام طول قطع می کند؟ (ریاضی خارج ۹۴)

۴, ۹ (۴)

 $4, \frac{1}{4}$  (۳) $9, \frac{1}{4}$  (۲) $4, \frac{1}{9}$  (۱)

آنکه در آنگاه عامل آنکه



۱۶۰-اگر  $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۷)

تست

۱،۷ (۴)	-۱،۷ (۳)	۱،-۷ (۲)	-۱،-۷ (۱)
---------	----------	----------	-----------

۱۶۱-اگر توابع  $f$  و  $g$  به عنوان ماشین به صورت  $x \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow 2x$  باشند و  $f(g(x)) = 3x + 4$  ، مقدار  $f(x)$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۱)

تست

۴ (۴)	۳ (۳)	(۲)	۱ (۱)
-------	-------	-----	-------

۱۶۲-اگر  $f(x) = 2x + 3$  و  $g(f(x)) = 8x^2 + 22x + 20$  باشد، ضابطه تابع  $(fog)(x)$  کدام است؟ (ریاضی ۹۲)

تست

$4x^2 - 4x + 11$ (۴)	$4x^2 - 2x + 13$ (۳)	$2x^2 - 3x + 7$ (۲)	$2x^2 - 7x + 3$ (۱)
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

۱۶۳-اگر  $f(x) = 4(x^2 - 4x + 5)$  و  $g(x) = 2x - 3$  باشد، ضابطه تابع  $(fog)(x)$  کدام است؟ (ریاضی ۹۳)

تست

$x^2 - 2x + 3$ (۴)	$x^2 - 2x + 5$ (۳)	$x^2 - 4x + 5$ (۲)	$x^2 - 4x + 3$ (۱)
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

۱۶۴-اگر  $f(g(x)) = 8x^2 + 6x + 5$  و  $g(x) = 2x + 1$  باشد، ضابطه تابع  $f(x)$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۵)

تست

$2x^2 + x + 3$ (۴)	$2x^2 - x + 4$ (۳)	$2x^2 - 2x + 3$ (۲)	$2x^2 + 3x + 1$ (۱)
--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

۱۶۵-اگر  $f(x) = x^2 - x - 2$  و  $f(g(x)) = x^2 + x - 2$  ، آنگاه  $f(g(x))$  کدام گزینه می تواند باشد؟ (خارج ۹۰)

تست

$x^2 + 2x$ (۴)	$x^2 - 2x$ (۳)	$x^2 + 1$ (۲)	$x^2 - 1$ (۱)
----------------	----------------	---------------	---------------

۱۶۶-اگر  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$  ، آنگاه ضابطه  $f(f(x))$  کدام است؟

تست

$(x^2 + 1)^2 + 1$ (۴)	$x^2 + 1$ (۳)	$x + 1$ (۲)	۱ (۱)
-----------------------	---------------	-------------	-------

۱۶۷-اگر  $g(x) = 4x + 2$  و  $fog(x) = x^2$  ، باشد، آنگاه  $f(g(x))$  کدام است؟

تست

۲ (۴)	۱۰ (۳)	۱۰۰ (۲)	۴ (۱)
-------	--------	---------	-------

۱۶۸-در ماشین  $g(x) = \frac{x}{2-x}$  ضابطه  $f(x) = \frac{1}{2}x$  کدام است؟ (ریاضی خارج ۸۴)

تست

$\frac{x+1}{x}$ (۴)	$\frac{x}{x-1}$ (۳)	$\frac{x-1}{x}$ (۲)	$\frac{x}{x+1}$ (۱)
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## درس دوم || ترکیب توابع

۱۶۹- اگر خروجی ماشین مقابله باشد ، مقدار ورودی کدام است ؟ (ریاضی ۸۶)

$$\text{خروجی} \rightarrow 2x - 2 \rightarrow \frac{x}{\sqrt{x+1}} \rightarrow \text{ورودی}$$

۴ (۴)

۳ (۳)

۷ (۲)

۱۱ (۱)

۱۷۰- اگر  $f(g(x)) = \frac{x}{x-3}$  و  $g(x) = 2x - 1$  باشد، مقدار  $f(g(x))$  کدام است ؟ (ریاضی داخل ۹۱)

-۴ (۴)

۴ (۳)

-۲ (۲)

۲ (۱)

۱۷۱- اگر  $f(g(x)) = \frac{x^2+2}{x^2+1}$  و  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$  باشد، مقدار  $g(x)$  کدام است ؟ (سراسری تجربی ۸۴)

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۱۷۲- اگر  $f(g(x)) = 4x^2 + 6x$  و  $f(x) = 2x^2 + 4$  باشد، مقدار  $g(-2)$  کدام است ؟ (تجربی خارج کشور ۸۴)

۴ (۰) صفر

۱ (۳)

-۱ (۲)

۲ (۱)

۱۷۳- نمودارهای تابع خطی  $f$  و تابع درجه ی دوم  $g$  محور  $y$  را به ترتیب با عرض های ۲ و ۳ قطع می کنند، اگر  $(f-g)(x)$  آنکاه  $f(g(x)) = 2x^2 + x - 1$  کدام است ؟

۲x<sup>2</sup>-1 (۴)x<sup>2</sup>+x-1 (۳)x<sup>2</sup>-2 (۲)-2x<sup>2</sup>-2x+1 (۱)

۱۷۴- اگر  $x$  در این صورت  $f(\tan x) = \cos 2x$  کدام است ؟

- $\frac{1}{3}$  (۴) $\frac{1}{4}$  (۳)- $\frac{1}{5}$  (۲) $\frac{1}{2}$  (۱)

۱۷۵- اگر  $(4,2) \in fog$  و  $g = \{(1,2), (3,1), (a,3), (b,1)\}$  و  $f = \{(2,1), (3,2), (4,5), (1,7)\}$  باشند ، دو تایی مرتب  $(a,b) \in gof$  کدام است ؟ (ریاضی داخل ۹۰)

(4,5) (۴)

(5,4) (۳)

(3,4) (۲)

(4,3) (۱)

تست ۱۷۶-اگر  $f(f(x))$  چند عضو دوتایی دارد؟ (تجربی ۸۳)

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

تست ۱۷۷- فرض کنید داشته باشیم  $f = \{(x, 2x-1), x \in A\}$  و  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  اگر  $g = \{(6, 0), (-2, 1)\}$  و  $f$  چند تا از موارد زیر صحیح است

۱)  $f \circ g = \{(-2, 2)\}$ ۲)  $g \circ f = \{ \}$ ۳)  $f \times g = \{ \}$ 

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۱) صفر

تست ۱۷۸- با فرض  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-1+x}}$  و  $g(x) = \log_{\sqrt{2}}(x-3)$  دامنه تابع  $f \circ g$  بازه  $(a, b)$  می باشد. مقدار  $b-a$  کدام است؟

۰ / ۴ (۴)

۰ / ۳ (۳)

۰ / ۲ (۲)

۰ / ۱ (۱)


تست ۱۷۹- اگر  $f(x) = \sqrt{4x-x^2}$  و  $g(x) = \frac{1}{x}$  دامنه تابع  $f \circ g$  کدام است؟

 $\frac{1}{4} < x < 1$  (۴) $0 < x < 4$  (۳) $x < \frac{1}{4}$  (۲) $x \geq \frac{1}{4}$  (۱)

تست ۱۸۰- اگر  $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x - 16}$  و  $g(x) = x^2 + 2x$  باشد، دامنه تابع  $f \circ g$  کدام است؟

 $x \leq -2, x \geq 8$  (۴) $x \leq -4, x \geq 2$  (۳) $-2 < x < 8$  (۲) $-4 < x < 2$  (۱)

تست ۱۸۱- اگر تابع  $y = f(x) = x \sqrt{\frac{1}{-f(x)}}$  به صورت روبرو باشد، دامنه ای تابع  $y$  کدام است؟

 $(-\infty, \cdot)$  (۴)  $(-\infty, -2) \cup (\cdot, +\infty)$  (۳) $(\cdot, +\infty)$  (۲) $(-\infty, \cdot)$  (۱)

تست ۱۸۲- اگر  $g(x) = \frac{x+1}{x}$  و  $f(x) = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^x - 1}$  باشند، دامنه تابع  $g \circ f$  کدام است؟

 $(\cdot, +\infty)$  (۴) $(-\infty, \cdot)$  (۳) $(\cdot, 1)$  (۲) $(-1, \cdot)$  (۱)

تست ۱۸۳- اگر  $(g \circ f)(\frac{\pi}{4})$  باشد، مقدار  $g(x) = x \sqrt{1-x^2}$  و  $f(x) = \sin x$  کدام است؟

 $\sqrt{2}$  (۴)

۱ (۳)

 $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (۲) $\frac{1}{2}$  (۱)

۳۶

۱۸۴- اگر  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  باشد، ضابطه تابع  $f(x) - 2f(x) + 1$  کدام است؟  تست

$$\frac{2x-1}{x^2-1} \quad (4)$$

$$\frac{2x+1}{1-x^2} \quad (3)$$

$$\frac{2x}{x^2-1} \quad (2)$$

$$\frac{1}{1-x^2} \quad (1)$$

۱۸۵- اگر  $f(x) = 4x + 15$  باشد، حاصل جمع مقادیر ممکن برای  $(f \circ f)(x)$  کدام است؟  تست

$$-27 \quad (4)$$

$$27 \quad (3)$$

$$10 \quad (2)$$

$$-10 \quad (1)$$

۱۸۶- اگر  $D_{fog} \cap D_{gof}$  ، دامنه  $g(x) = 2x^2 - 1$  و  $f(x) = \sqrt{x-1}$  کدام است؟  تست

$$(1, +\infty) \quad (4)$$

$$[1, +\infty) \quad (3)$$

$$(0, +\infty) \quad (2)$$

$$[0, +\infty) \quad (1)$$

۱۸۷- اگر  $g(x) = \sqrt{x}$  و  $f(x) = \sin x$  در تمام نقاط کدام بازه زیر تعریف شده است؟  تست

$$(-2\pi, -\pi) \quad (4)$$

$$\left(\frac{\pi}{2}, 2\pi\right) \quad (3)$$

$$\left(0, \frac{3\pi}{2}\right) \quad (2)$$

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \quad (1)$$

۱۸۸- اگر  $g(x) = \sqrt{x}$  و  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$  ، دامنه تابع  $(f+g) \circ f$  کدام است؟  تست

$$[-1, 1] - \{0\} \quad (4)$$

$$[-1, 0] \quad (3)$$

$$[0, 1] \quad (2)$$

$$[-1, 1] \quad (1)$$

۱۸۹- اگر  $g(x) = \sqrt{4-x^2}$  و  $f(x) = 4-x^2$  باشد، برد تابع  $(f \circ g)(x)$  کدام است؟  تست


$$[0, 4] \quad (4)$$

$$(-\infty, 4] \quad (3)$$

$$(-\infty, 0] \quad (2)$$

$$[4, +\infty) \quad (1)$$

۱۹۰- شکل زیر نمودار توابع  $f$  و  $g$  است. طول بازه دامنه  $g \circ f$  کدام است؟  تست





$$\frac{10}{3} \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$\frac{8}{3} \quad (2)$$

$$\frac{7}{3} \quad (1)$$

تست ۱۹۱- شکل زیر نمودار توابع  $f$  و  $g$  است. دامنه  $gof$  کدام است؟تست ۱۹۲- اگر دامنه  $f(x)$  برابر  $[-2, 6]$  باشد. دامنه  $D_f = [2x+1]$  شامل چند عدد صحیح است؟

۲۵ (۴)

۱۷ (۳)

۹ (۲)

۴ (۱)

تست ۱۹۳- اگر  $g(x) = \log(x^2 - 15x)$  و  $f(x) = \sqrt{2-x}$  باشد دامنه  $fog$  کدام است؟

[−۵, ۰) (۴)

(۱۵, ۲۰] (۳)

(-۵, ۰]  $\cup$  (۱۵, ۲۰] (۲)(۰, ۵]  $\cup$  [۲۰, ۲۵) (۱)تست ۱۹۴- اگر ضابطه تابع  $g(x) = \log_2(x^2 + 2x)$  و  $f(x) = \sqrt{3-x}$  باشد دامنه  $fog$  کدام است؟ (تجربی ۹۴)[-۴, -۲)  $\cup$  (۰, ۲] (۴)[-۴, -۱]  $\cup$  (۱, ۲] (۳)

[-۲, ۰] (۲)

[-۴, ۲] (۱)

تست ۱۹۵- اگر  $g(x) = \sqrt{x - x^2}$  و  $f(x) = \frac{1+x^2}{1-x}$  باشد دامنه تابع  $gof$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۹۶) $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$  (۴)

(-۱, ۱) (۳)

[۰, ۱) (۲)

{۰} (۱)

تست ۱۹۶- اگر  $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$  و  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{-x^2 + x + 2}}$  باشد دامنه تابع  $fog$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۴)(-۱, + $\frac{1}{2}$ ) (۴)

(-۲, ۰) (۳)

(+ $\frac{1}{2}$ , + $\infty$ ) (۲)(- $\frac{1}{2}$ , + $\infty$ ) (۱)تست ۱۹۷- اگر دامنه تابع  $y = \frac{x}{x^2 + ax + 1}$  باشد، حدود  $a$  کدام است؟

۰ &lt; a &lt; ۱ (۴)

۰ &lt; a &lt; ۲ (۳)

-۲ &lt; a &lt; ۲ (۲)

-۱ &lt; a &lt; ۱ (۱)

۱۹۸-اگر  تست 

$$g(x) = \frac{1}{x^2 - 4x} \text{ و } f(x) = \sqrt{x + |x|}$$

$$(\cdot, +\infty) \quad (4) \quad \mathbb{R} - \{\cdot\} \quad (3) \quad \mathbb{R} - \{\cdot, \lambda\} \quad (2) \quad (\circ, \lambda) \cup (\lambda, +\infty) \quad (1)$$

۱۹۹-اگر  تست 

$$g(x) = \tan x, |x| < \frac{\pi}{2} \text{ و } f(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$$

$$[-1, \cdot) \cup (\cdot, 1] \quad (4) \quad \left[ -\frac{\pi}{4}, \cdot \right) \cup \left( \cdot, \frac{\pi}{4} \right] \quad (3) \quad \left[ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right) \quad (2) \quad \left[ -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right] \quad (1)$$

۲۰۰-دامنه تابع  $y = \sqrt{\frac{x-1}{x-3}} + \sqrt{\frac{2-x}{x}}$  کدام فاصله است؟  تست 

$$(2, 3) \quad (4) \quad [1, 2] \quad (3) \quad (0, 3) \quad (2) \quad (0, 1] \quad (1)$$

۲۰۱-اگر  تست 

$$fog(x) = 1, g(x) = 2x - 1 \text{ و } f(x) = x^2 - 3x$$

$$5 \quad (4) \quad \frac{5}{2} \quad (3) \quad \frac{3}{2} \quad (2) \quad 3 \quad (1)$$

۲۰۲-اگر  تست 

$$g(x) = \frac{x+1}{3x-1} \text{ و } f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$$

$$4) \text{ هیچ} \quad 3) \quad 2) \quad 1) \quad 2) \quad 3) \quad 4)$$

۲۰۳-اگر  تست 

$$fog(x) = 7 \text{ و } g(x) = 2x + 1 \text{ و } f(x) = x^2 + x + b$$

است؟

$$7 / 25 \quad (4) \quad 10 / 25 \quad (3) \quad 8 / 25 \quad (2) \quad 9 / 25 \quad (1)$$

## سوالات فصل اول ریاضی ۳ تجربی

درس سوم

## وارون تابع

## سوالات تشریحی و تستی درس سوم

**مثال ۱** - اگر  $f = \{(3, 4), (b, 5), (a^2 - 1, 4), (7b - 3, 5)\}$  یک به یک باشد، مقدار  $a$  و  $b$  کدام است؟

**مثال ۲** - اگر  $f = \{(3, 2), (a, 5), (3, a^2 - a), (b, 2), (-1, 4)\}$  تابعی یک به یک باشد،  $f^{-1}(a)$  را بیابید.

**مثال ۳** - ابتدا نمودار تابع  $f(x) = 2x + |x - 1|$  را رسم کرده و با استفاده از شکل، وارون پذیری آن را بررسی کنید.

**مثال ۴** - وارون پذیری تابع  $f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & x \geq 0 \\ x^2 - 1 & x < 0 \end{cases}$  را بررسی کنید.

**مثال ۵** - اگر  $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & x \leq 0 \\ 2x + m & x > 0 \end{cases}$  تابعی یک به یک باشد، حدود  $m$  را بیابید.

**مثال ۶** - نشان دهید دو تابع  $g(x) = \sqrt[3]{\frac{x-3}{4}}$  و  $f(x) = 4x^3 + 3$  وارون یکدیگرند.

**مثال ۷** - در تابع  $f(x) = -x + \sqrt{-2x}$  مقدار  $f^{-1}(4)$  را بیابید.

**مثال ۸** - اگر  $f \circ g^{-1}(x) = x - 1$  باشند، ضابطه  $g(x)$  و  $f$  را بیابید.

**مثال ۹** - بررسی کنید تابع زیر صعودی یا نزولی است و سپس ضابطه  $y$  تابع معکوس را بیابید و نمودار تابع  $f$  و  $f^{-1}$  را در یک دستگاه رسم کنید.

$$f(x) = x^2 - 3x, x \geq \frac{3}{2}$$

**مثال ۱۰** - اگر  $f^{-1}(f + f) = \{(x, \sqrt{x}) | x \in A\}$  و  $A = \{0, 1, 4, 9\}$  باشد، مجموعه ای اعضای برد  $f^{-1}(f + f)$  را بیابید.

**مثال ۱۱** - اگر  $f^{-1}(x) = x + \sqrt{x+1}$  تابع  $f$  محور طول ها را در چه نقطه ای قطع می کند؟

**مثال ۱۲** - اگر  $g^{-1}(x) = 4x + 7$  باشد تابع وارون  $f \circ g$  را بیابید.

**مثال ۱۳** - اگر  $g(x) = 2f^{-1}(x) - 1$  و  $f(x) = x + \sqrt{x}$  باشد مقدار  $g(7)$  را بیابید.

**مثال ۱۴** - می دانیم تابع  $f(x) = \frac{x-1}{2x+3}$  وارون پذیر است. وارون آن را بیابید و سپس برد آن را بیابید.

**مثال ۱۵** - وارون پذیری تابع زیر را بررسی کنید و در صورت وجود وارون پذیری تابع، ضابطه ای وارون آن را به دست آورید.  
 $f(x) = \sqrt{x+3} - 5$

**مثال ۱۶** - نشان دهید خط  $x = y = \sqrt[3]{x+1}$  محور تقارن دو تابع  $y = x^3 - 1$  است.

**مثال ۱۷** - اگر  $f : A \rightarrow B$  معکوس پذیر باشد می دانیم  $x = f \circ f^{-1}(x)$  و  $x = f^{-1} \circ f(x)$  ، آیا دو تابع

$f^{-1} \circ f(x) = x$  و  $f \circ f^{-1}(x) = x$  مساوی هستند؟ چرا؟

**مثال ۱۸** - نشان دهید تابع  $f(x) = \sqrt{4x-5}$  یک به یک است و ضابطه تابع معکوس آن را بیابید.

**مثال ۱۹** - ثابت کنید  $f(x) = (x-2)^2$  ،  $x \geq 2$  وارون پذیر است سپس ضابطه ای وارون آن را بنویسید

**مثال ۲۰** - ابتدا یک به یک بودن تابع با ضابطه ای  $f(x) = \begin{cases} x+1 & x < 0 \\ x^2+1 & x \geq 0 \end{cases}$  را بررسی کنید، سپس در صورت وجود معکوس تابع  $f$  را تعیین کنید.

**مثال ۲۱** - اگر  $f: [-2, 2] \rightarrow [1, 4]$  باشد، نمودار های  $f^{-1} \circ f(x) = x$  و  $f \circ f^{-1}(x) = x$  را رسم کنید.

**مثال ۲۲** - فرض کنید  $g(x) = 2 - x$  و  $f(x) = 7x - 5$  باشندو آن گاه:

الف)  $g^{-1}(x)$  و  $f^{-1}(x)$  را محاسبه کنید.

ب)  $g^{-1} \circ f^{-1}(x)$  را محاسبه کنید.

پ) معکوس  $f \circ g(x)$  را محاسبه کنید.

ت) دو تابع قسمت های ب و پ را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

**مثال ۲۳** - ثابت کنید تابع  $f(x) = x^2 + 1$  در بازه  $(-\infty, 0)$  یک به یک است. سپس ضابطه معکوس تابع  $f$  را تعیین کنید.

**مثال ۲۴** - تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} 4x - x^2 - 3 & x < 2 \\ x - 2 & x \geq 2 \end{cases}$  یک به یک مفروض است. اولاً ثابت کنید این تابع در  $(-\infty, 2)$  یک به یک است.

ثانیاً ضابطه تابع معکوس  $f$  را در بازه  $(-\infty, 2)$  بنویسید.

**مثال ۲۵** - نشان دهید تابع با ضابطه  $f(x) = (1-x)^3$  یک به یک است. وارون آن را بیابید.

**مثال ۲۶** - اگر  $g(x) = 2+x$  و  $f(x) = 3x-2$  باشد ضابطه معکوس  $f \circ g$  را بدست آورید.

**مثال ۲۷** - اگر  $f(x) = 2x+1$  باشد، ضابطه  $g(x) = x-1$  و  $f \circ g^{-1}(x) = x$  را بدست آورید.

**مثال ۲۸** - معکوس تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 1 \\ 2x-1 & x < 1 \end{cases}$  را به دست آورید.

**مثال ۲۹** - نقطه برخورد تابع  $f(x) = x^3 + 2x$  را با وارونش، در صورت وجود به دست آورید.

**مثال ۳۰** - نمودار تابع  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  با وارونش چند نقطه تلاقی دارد؟ مختصات آن ها را به دست آورید.

**مثال ۳۱** - توابع  $f$  و  $g$  یک به یک هستند و می دانیم  $g^{-1}(x) = \frac{x}{3} + 1$  ضابطهٔ تابع  $f$  و  $(f \circ g)^{-1}(x) = x + 2$  را به دست آورید.

$$\text{مثال ۳۲} - \text{اگر } f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x - 11 & x \geq 2 \\ -4x + 1 & x < 2 \end{cases} \text{ را به دست آورید.}$$

**مثال ۳۳** - به کمک رسم نمودار، ثابت کنید تابع زیر وارون پذیر نیست.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x - 1 & x < 0 \end{cases}$$

**مثال ۳۴** - فاصلهٔ نقطهٔ برخورد تابع نمایی با محور  $y$  ها و نقطهٔ برخورد وارون ایت تابع نمایی با محور  $x$  ها چقدر است؟

**مثال ۳۵** - تابع  $f(x) = \frac{1-3x}{4}$  ،  $2 \leq x < 4$  را به دست آورید.

**مثال ۳۶** - مقدار  $k$  را طوری بیابید تا تابع  $f(x) = \begin{cases} 3x + 2k & k > 1 \\ 2x - k & x \leq 1 \end{cases}$  یک به یک شود.

**مثال ۳۷** - مقدار  $a$  و  $b$  را طوری بیابید تا تابع  $f(x) = \begin{cases} ax + 1 & x < -1 \\ x + 2 & -1 \leq x < 2 \\ 2x + b & x \geq 2 \end{cases}$  یک به یک شود.

**مثال ۳۸** - دامنهٔ تابع وارون  $f(x) = x^3 - 4x + 2$  ،  $x \geq 3$  را بیابید.

**مثال ۳۹** - ضابطهٔ وارون تابع  $f(x) = x^3 - 4x + 2$  را در فاصله  $(2, +\infty]$  بیابید. (به کمک رسم نمودار و ضابطهٔ تابع)

**مثال ۴۰** - اگر  $f(x) = (x-1)^3$  و  $g(x) = \sqrt[3]{x+1}$  باشند، آیا  $f$  و  $g$  وارون یکدیگرند؟

**مثال ۴۱** - معکوس تابع  $y = \sqrt{x+2} + 1$  را بدست آورید. دامنه و برد تابع وارون را بیابید.

**مثال ۴۲** - ضابطه‌ی معکوس تابع  $f(x) = (1-2x)^3$  را بیابید.

**مثال ۴۳** - نمودار تابع  $f(x) = (x-2)^3 + 3$  و معکوس آن را در یک دستگاه رسم کنید و ضابطه‌ی معکوس را بنویسید.

**مثال ۴۴** - مقدار  $m$  چقدر باشد تا نمودار معکوس تابع  $f(x) = x^3 + x + m$  از نقطه‌ی  $(4, 1)$  بگذرد؟

**مثال ۴۵** - منحنی معکوس تابع  $y = -(x+2)^3$  نمودار تابع را در چند نقطه قطع می‌کند؟

**مثال ۴۶** - منحنی معکوس تابع  $y = -(x+2)^3 - 2$  نمودار تابع را در چند نقطه قطع می‌کند؟

**مثال ۴۷** - اگر  $f^{-1}(x) = x^2$ ,  $x \geq 0$  و  $g^{-1}(x) = x + \sqrt{x}$  آن‌گاه ضابطه‌ی  $f \circ g$  را بیابید.

**مثال ۴۸** - اگر  $g(x) = f(3x-4)$  و  $f^{-1}(x) = x + \sqrt{x}$  حاصل  $(16)$  چقدر است؟

**مثال ۴۹** - درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را مشخص کنید.

الف) اگر نقطه‌ای نحل تلاقی نمودار های  $f$  و  $f^{-1}$  باشد، آن‌گاه قرینه‌ی آن نسبت به خط  $x = y$  نیز نقطه‌ی تلاقی نمودار های  $f$  و  $f^{-1}$  خواهد بود.

ب) اگر تابع  $f$  نزولی اکید باشد آن‌گاه تمام نقاط تلاقی نمودار های  $f$  و  $f^{-1}$  روی خط  $x = y$  قراردارند.

**مثال ۵۰** - توابع  $\{f(1), f(2), f(0)\}$  و  $g = \{(-2, 1), (3, 0), (0, -1), (2, -2)\}$  مفروضند:

الف) تابع  $f^{-1}$  را تعیین کنید. ب) تابع  $g \circ f^{-1}$  را تعیین کنید. پ) نشان دهید:

**مثال ۵۱** - اگر تابع  $f$  با ضابطه  $y = x^2 + 2ax$  در بازه  $[a, +\infty)$  تعریف شده است و معکوس پذیر است و

مقدار  $a$  را به دست آورید.

**مثال ۵۲** - دامنهٔ زیر را طوری محدود کنید که تابع حاصل یک به یک شود. (با بزرگترین دامنهٔ ممکن)

$$1) y = |x+1| - 3$$

$$2) y = x^2 - 4x$$

$$3) y = \cos x$$

$$4) y = x^2 - 2x + 3$$

$$5) \sqrt{x^2 - 4x + 4}$$

**مثال ۵۳** - تابع با ضابطه  $y = 3 + |x-2|$  روی بازه  $[a, +\infty)$  یک به یک است. حداقل مقدار  $a$  کدام است؟

**مثال ۵۴** - نمودار تابع  $f$  را طوری رسم کنید که تمام شرایط زیر را داشته باشد:

الف) روی اعداد منفی خطی باشد.

پ) از مبدا عبور نکند.

**مثال ۵۵** - وارون تابع  $y = 3 + \sqrt[3]{x-2}$  از کدام نقطه زیر می‌گذرد؟

الف)  $(3, 4)$       ب)  $(5, 10)$

**مثال ۵۶** - اگر  $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$  باشد: الف) مقدار  $f(3)$  را بیابید. ب)  $f^{-1}(7)$  را بیابید.

**مثال ۵۷** - دامنهٔ وارون تابع  $f(x) = 2 - \sqrt{x-3}$  را بیابید.

**مثال ۵۸** - اگر  $f(x) = \sqrt{2-6x}$  باشد، برد تابع  $f^{-1}$  را بیابید.

**مثال ۵۹** - آیا محل برخورد دو تابع  $f$  و  $f^{-1}$  همواره روی خط  $x = y$  است؟ چه حالاتی ممکن است رخدهد؟ (مثال بزنید).

**مثال ۶۰** - تابع  $f$  باید چه شرطی داشته باشد تا محل برخورد دو نمودار  $f$  و  $f^{-1}$  روی خط  $x = y$  قرار بگیرد؟

**مثال ۶۱** - اگر  $x \geq 2$  باشد، محل برخورد نمودار وارون آن را بیابید.

**مثال ۶۲**- اگر تابع  $f$  روی بازه  $[a, b]$  صعودی اکید باشد ،  $f^{-1}$  خواهد بود.(صعودی اکید- نزولی اکید)

**مثال ۶۳**- اگر تابع  $f$  روی بازه  $[a, b]$  نزولی اکید باشد ،  $f^{-1}$  خواهد بود.(صعودی اکید- نزولی اکید)

**مثال ۶۴**- ضابطه  $y$  وارون توابع زیر را بیابید.

(الف)  $f(x) = \frac{3x - 4}{5}$

(ب)  $f(x) = x^3 - 2x$ ,  $x \geq 1$

(پ)  $f(x) = |x + 2|$ ,  $x \geq 2$

(ت)  $f(x) = \sqrt{3x - 2} + 5$

(ث)  $f(x) = (1-x)^3$

(ج)  $f(x) = -x^3 + 4$

**مثال ۶۵**- تابع خطی  $f(x) = ax + b$  چه موقع یک به یک است. در این صورت ضابطه  $y$  وارون آن را بیابید.

**مثال ۶۶**- تحت چه شرایطی وارون تابع  $f(x) = ax + b$  با خودش برابر است؟

**مثال ۶۷**- اگر  $\{ (1, -2), (3, 0), (0, 4), (-2, 2) \}$  باشد مطلوب است:  $g = \{ (1, 2), (-1, 0), (3, 1), (4, -1) \}$

۱)  $f^{-1} \circ g(-2)$

۲)  $g^{-1} \circ f^{-1}(4)$

۳)  $g^{-1} \circ f^{-1}$

۴)  $(f \circ g)^{-1}$

**مثال ۶۸**- اگر  $f(x) = \sqrt{x-2}$  و  $g(x) = 4x - 2$  در این صورت حاصل  $(g \circ f)^{-1}(0)$  و ضابطه  $y$  را بیابید.

$x \rightarrow f(x) \rightarrow g(x) \rightarrow x$

**مثال ۶۹**- طبق ماشین اگر  $f(x) = \frac{3x - 4}{2}$  باشد مقدار  $(g \circ f)^{-1}(2)$  را بیابید.

**مثال ۷۰**- نشان دهید توابع  $f(x) = 2 + \sqrt[3]{x}$  و  $g(x) = (x-2)^3$  وارون هم هستند.

**مثال ۷۱**- دامنه  $y$  وارون تابع  $f(x) = -\sqrt{1-x}$  را بیابید.

**مثال** ۷۲- اگر  $f(x) = 1 + \sqrt{x+2}$  باشد:

الف)  $f^{-1} \circ f(x)$  و  $f \circ f^{-1}(x)$  را بیابید.

ب) دامنه‌ی آن‌ها را بیابید.

پ) نمودار  $f^{-1} \circ f(x)$  و  $f \circ f^{-1}(x)$  رارسم کنید.

ت) آیا  $f \circ f^{-1}(x) = f^{-1} \circ f(x)$  است؟ چرا؟

**مثال** ۷۳- آیا دو تابع  $g(x) = \frac{\sqrt{2}}{x}$  و  $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$  وارون یکدیگرند؟ چرا.

**مثال** ۷۴- تابع  $f(x) = x^3 - 4x + 2$  یک به یک نیست. بزرگترین بازه‌ای که در آن تابع یک به یک است را مشخص کنید. سپس وارون آن را بیابید.

**مثال** ۷۵- اگر  $f(x) = x|x|$  ابتدا آن را به صورت یک تابع دو ضابطه‌ای بنویسید. تابع و وارونش رارسم کنید. ضابطه‌ی وارون آن را بدست آورید.

**مثال** ۷۶- اگر  $f(x) = x+3$  و  $g(x) = 3x-7$  تابع  $f^{-1} \circ g(x)$  را بیابید.

**مثال** ۷۷- اگر  $g = \{(0, 3), (2, -2), (-2, 2)\}$  و  $f = \{(1, 2), (2, 3), (-1, 1)\}$  باشد، حاصل عبارت‌های زیر را بیابید.  
 ۱)  $(f^{-1} \circ g)(0)$       ۲)  $(f^{-1} \circ g)(2)$       ۳)  $g^{-1} \circ f^{-1}$       ۴)  $\frac{1}{f^{-1} \circ f^{-1}}$

**مثال** ۷۸- در تابع  $y = \sqrt{x-1}$  با دامنه  $[2, 5]$  نمودار تابع  $f \circ f^{-1}$  چگونه است؟

**مثال** ۷۹- نمودار تابع  $f(x) = 1 + \sqrt{2-x}$  وارون آن را در یک دستگاه مختصات رسم کنید.

**مسئلہ** ۸۰- نمودار تابع  $f(x) = \frac{x+4}{x-2}$  با دامنه‌ی  $R - \{-2\}$ ، نمودار وارون خود را با کدام طول قطع می‌کند؟

## فصل ۱ || تابع

۸۱ - اگر  $f(x) = x^3 - 8x$  با کدام طول متقاطع است؟  تست

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

۸۲ - در بزرگ ترین بازه‌ای که تابع  $f(x) = x + |x+2|$  وارون پذیر است. ضابطه وارون آن کدام است؟  تست

$$y = \frac{x+2}{2}, x \geq 0 \quad (۴) \quad y = \frac{x-2}{2}, x \geq 0 \quad (۳) \quad y = \frac{x+2}{2}, x \geq -2 \quad (۲) \quad y = \frac{x-2}{2}, x \geq -2 \quad (۱)$$

۸۳ - اگر  $f(x) = x + |x|$  باشد، حاصل  $(f \circ f^{-1})(x)$  کدام است؟  تست

(۴) موجود نیست.

(۳)

(۲)

(۱)

۸۴ - نمودار  $y = -(x+1)^3 + 1$  ، معکوس خود را در چند نقطه قطع می‌کند؟  تست


(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

۸۵ - نمودار وارون تابع  $f(x) = -x^3 + 1$  کدام است؟  تست



۸۶ - معکوس تابع  $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$  کدام است؟  تست

$$y = -1 - \sqrt[3]{x+1} \quad (۴)$$

$$y = -1 + \sqrt[3]{x-1} \quad (۳)$$

$$y = 1 - \sqrt[3]{x+1} \quad (۲)$$

$$y = 1 - \sqrt[3]{x-1} \quad (۱)$$

۸۷ - ضابطه وارون تابع  $y = 3x - |x|$  کدام است؟  تست

$$y = \frac{2x - |x|}{4} \quad (۴)$$

$$y = \frac{x + |x|}{4} \quad (۳)$$

$$y = \frac{3x + |x|}{8} \quad (۲)$$

$$y = \frac{3x + |x|}{4} \quad (۱)$$

۸۸- ضابطه وارون تابع  $g(x) = -5 - \sqrt{3x+1}$  کدام است؟  تست

$$g^{-1}(x) = \frac{x^3 + 10x + 24}{3} , \quad x \geq -\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$g^{-1}(x) = \frac{x^3 + 10x + 24}{3} , \quad x \leq -5 \quad (4)$$

$$g^{-1}(x) = 3x^3 + 30x + 75 , \quad x \geq -\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$g^{-1}(x) = 3x^3 + 30x + 75 , \quad x \leq -5 \quad (3)$$

۸۹- ضابطه تابع معکوس تابع  $f(x) = x^3 - 2x + 2, x \geq 1$  کدام است؟  تست

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x+1} - 1 , \quad x \geq -1 \quad (2)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x+1} - 1 , \quad x \geq 1 \quad (4)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} + 1 , \quad x \geq 1 \quad (1)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} - 1 , \quad x \geq 2 \quad (3)$$

۹۰- اگر  $f(x) = \begin{cases} 4x+3 & x \geq 3 \\ x+1 & x < 3 \end{cases}$  کدام است؟  تست

۴ (۴)

-۶ (۳)

-۲ (۲)

-۴ (۱)

۹۱- تابع  $f(x) = x^3 - 4x + 3$  با کدام دامنه، معکوس پذیر است؟  تست

[۱, ۵] (۴)

[۰, ۱]  $\cup$  [۲, ۴] (۳)[۰, ۲]  $\cup$  [۵, ۶] (۲)

[-۲, ۳] (۱)

۹۲- چندتا از توابع زیر در بازه  $(-1, +\infty)$  وارون پذیرند؟  تست

$$h(x) = x^3 + 4x + 3 \quad (پ)$$

۳ (۴)

$$g(x) = -x^2 \quad (ب)$$

۲ (۳)

$$f(x) = |x| \quad (\text{الف})$$

۱ (۲)

(ا) صفر

۹۳- اگر  $g(x) = x^3$  و  $f(x) = \frac{1}{x}x - 3$  باشند، حاصل  $(fog)^{-1}(5) + (f^{-1}og^{-1})(1)$  کدام است؟  تست

۶۸ (۴)

۶۵ (۳)

۳۶ (۲)

۳۳ (۱)

۹۴- اگر  $f(x) = x + 4$  و  $g(x) = 2x - 5$  ، ضابطه تابع  $f^{-1}og^{-1}$  کدام است؟  تست

$$y = x + 2 \quad (۴)$$

$$y = \frac{x+1}{2} \quad (۳)$$

$$y = \frac{x-3}{2} \quad (۲)$$

$$y = \frac{x-2}{3} \quad (۱)$$

۹۵- اگر  $\{f, g\}^{-1}$  کدام است؟  تست

$$\{f, g\}^{-1} = \{(2, 4), (3, 5)\} \quad (2)$$

$$\{f, g\}^{-1} = \{(0, 0), (1, 3)\} \quad (1)$$

$$\{f, g\}^{-1} = \{(5, 3), (-1, 1)\} \quad (4)$$

$$\{f, g\}^{-1} = \{(2, 0), (-1, 4)\} \quad (3)$$

۹۶- اگر  $f(x) = x + 2$  و  $g(x) = 2x^2 - 8x + 1$  باشند، آن گاه حاصل جمع ریشه های معادله  $(fog)^{-1}(x) = 0$  کدام است؟  تست

$$-8 \quad (4)$$

$$8 \quad (3)$$

$$-10 \quad (2)$$

$$10 \quad (1)$$

۹۷- نمودار تابع  $f(x) = -x^3 + ax + b$  در نقطه  $(-1, \frac{1}{3})$  نمودار تابع وارونش را قطع می کند.  $a + b$  کدام است؟  تست

$$-\frac{13}{9} \quad (4)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (3)$$

$$-\frac{10}{9} \quad (2)$$

$$-\frac{1}{9} \quad (1)$$

۹۸- قزینه خط به معادله  $4y - 2x = 4$  را نسبت به خط  $y = mx + b$  عرض از مبدا خط  $d$  کدام است؟  تست

(تجربی ۹۷)

$$2 \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$-2 \quad (1)$$

۹۹- در بازه ای که تابع با ضابطه  $f(x) = |x - 2| + |x - 3|$  اکیداً نزولی است. نمودار آن با نمودار تابع  $f(x) = 2x^2 - x - 1$  در چند نقطه مشترک هستند؟  تست

(تجربی ۹۷)

۴) فاقد نقطه مشترک

$$1 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$3 \quad (1)$$

۱۰۰- قرینه نمودار تابع  $f(x) = \sqrt{x}$  را نسبت به محور  $y$  ها تعیین کرده، سپس ۲ واحد به طرف  $x$  های مثبت انتقال می دهیم. نمودار حاصل نیمساز ناحیه اول و سوم را با کدام طول قطع می کند؟  تست

(تجربی خارج ۹۷)

$$1/5 \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

$$0/5 \quad (2)$$

$$-2 \quad (1)$$

۱۰۱- اگر رابطه  $f = \{(3, 2), (a, 5), (3, a^2 - a), (b, 2), (-1, 4)\}$  کدام است؟  تست

(ریاضی خارج کشور ۸۶)

$$(2, 3) \quad (4)$$

$$(2, 1) \quad (3)$$

$$(-1, 3) \quad (2)$$

$$(-1, 1) \quad (1)$$

۵۰

۱۰۲ - اگر تابع  $\{(4,4), (k,1), (2,1), (2,m)\}$  معکوس پذیر باشد، مقدار  $m$  کدام است؟

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

۱۰۳ - کدام تابع یک به یک است؟

$y = x^3 \quad (4)$

$y = x - |x| \quad (3)$

$y = x + |x| \quad (2)$

$y = x + |2x| \quad (1)$

۱۰۴ - اگر  $f(x) = 2x + \sqrt{x}$  باشد، مقدار  $(gof)(3)$  وارون پذیر باشد، مقدار  $(m+1, 4), (-m+2, 4), (3, m)$  کدام است؟

۳) ۴

۲) ۳

۱) ۲

۰) ۰

۱۰۵ - تابع معکوس تابع  $y = x^3 + x + 1$  از کدام نقطه زیر می‌گذرد؟

$(11, -2) \quad (4)$

$(3, 0) \quad (3)$

$(1, 3) \quad (2)$

$(-9, -2) \quad (1)$

۱۰۶ - در تابع با ضابطه  $y = f^{-1}(x) = -x + \sqrt{-2x}$  کدام است؟ (ریاضی داخل ۸۸)  
۴) موجود نیست.

۰) ۰

۱) ۱

۲) ۲

۱۰۷ - اگر  $f(x) = 3 + \sqrt[3]{x-1}$  باشد، مقدار  $f^{-1}(4)$  کدام است؟

۳) ۴

۰) ۳

۱) ۲

۰) ۰

۱۰۸ - فاصله نقطه برخورد تابع نمایی  $y = 2^x$  با محور  $y$  ها و نقطه برخورد معکوس این تابع نمایی با محور  $x$  ها کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۲)

۰) ۰

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۱۰۹ - تابع  $f(x) = x^3 + 2x + 1$  با دامنه  $(-1, +\infty)$  مفروض است. نمودارهای دو تابع  $f$  و  $f^{-1}$  در چند نقطه متقطع اند (ریاضی داخل ۹۲)

۰) غیر متقطع

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

**تست ۱۱۰** - دو تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x \geq 0 \\ -\sqrt{-x} & x < 0 \end{cases}$  و  $g = \{(2, -1), (-1, 4), (3, -2), (-4, -3)\}$  مفروضند. اگر  $g^{-1}(f(a)) = 3$  باشد،  $a$  کدام است؟ (ریاضی خارج ۹۳)

۴ (۴)

۲ (۳)

-۱ (۲)

-۴ (۱)

**تست ۱۱۱** - دو تابع با ضابطه  $f(x) = 2x - 5$  و  $g = \{(2, 5), (3, 4), (1, 6), (4, 7), (8, 1)\}$  مفروضند. اگر  $(f^{-1} \circ g)(a) = 6$  باشد،  $a$  کدام است؟

۴ (۴)

۲ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

**تست ۱۱۲** - دو تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  و  $g = \{(2, 5), (6, 3), (3, 7), (4, 1), (1, 9)\}$  مفروضند. اگر  $g^{-1}(f(2a)) = 6$  باشد،  $a$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۹۶)

 $\frac{5}{2}$  (۴) $\frac{3}{2}$  (۳) $\frac{3}{4}$  (۲) $\frac{1}{2}$  (۱)

**تست ۱۱۳** - دو تابع با ضابطه  $g(x) = \sqrt{5x+9}$  و  $f = \{(5, 2), (7, 3), (1, 4), (3, 6), (9, 1)\}$  مفروضند. اگر  $g^{-1}(f^{-1}(a)) = 8$  باشد،  $a$  کدام است؟ (سراسری تجربی خارج کشور ۹۶)

۷ (۴)

۶ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

**تست ۱۱۴** - اگر  $f(x) = f^{-1}(5) + x - 3$  باشد، آنگاه  $f(5)$  کدام است؟

۷ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

**تست ۱۱۵** - اگر دو خط به معادلات  $2x - 3y = b$  و  $ax + by = 8$  نسبت به نیمساز ربع اول، متقارن باشند  $a + b$  کدام است؟ (ریاضی خارج ۹۳)

-۲, ۳ (۴)

-۳, ۲ (۳)

 $\pm 2$  (۲) $\pm 3$  (۱)

**تست ۱۱۶** - ضابطه معکوس تابع  $y = 2 - \sqrt{x-1}$  به کدام صورت است؟ (تجربی داخل ۹۲)


$$y = -x^2 - 4x - 5 ; x \leq 2 \quad (۲)$$

$$y = x^2 - 4x + 5 ; x \leq 2 \quad (۱)$$


$$y = x^2 - 4x + 5 ; x \geq 1 \quad (۴)$$

$$y = -x^2 + 4x - 5 ; x \geq 1 \quad (۳)$$

**تست ۱۱۷ - اگر**  $f(x) = x|x|$  **نمودار تابع**  $y = f^{-1}(x)$  **به کدام صورت است؟** (تجربی داخل ۹۵)



**تست ۱۱۸ - شکل رو به رو نمودار تابع**  $y = f(x)$  **و نیمساز ناحیه اول و سوم است.** دامنه‌ی تابع با ضابطه‌ی  $\sqrt{x-f^{-1}(x)}$  **کدام است؟** (تجربی داخل ۹۴)



[۲, ۳] (۲)

(۰, ۲] (۱)

[۳, ۸] (۴)

[۲, ۸] (۳)

**تست ۱۱۹ - تابع با ضابطه**  $y = x|x-2|$  **در یک بازه نزولی است.** ضابطه معکوس این تابع در این بازه کدام است؟ (تجربی داخل ۹۴)

$x < 1, 1 - \sqrt{1-x}$  (۲)

$x < +, 1 - \sqrt{1+x}$  (۱)

$+ < x < 1, 1 - \sqrt{1-x}$  (۴)

$+ < x < 1, 1 + \sqrt{1-x}$  (۳)

**تست ۱۲۰ - تابع**  $f(x) = |x^3|$  **با دامنه**  $\mathbb{R}$  **چگونه است؟** (تجربی خارج ۹۵)

۴) یک به یک

۳) وارون ناپذیر

۲) نزولی

۱) صعودی

**تست ۱۲۱ - تابع با ضابطه**  $f(x) = 2x - |4 - 2x|$  **در بازه‌ای وارون پذیر است.** ضابطه‌ی  $f^{-1}(x)$  **کدام عدد میتواند باشد؟**

(ریاضی خارج ۹۲)

$\frac{1}{4}x - 1 \quad x \leq 4$  (۲)

$\frac{1}{4}x + 1 \quad x \geq 4$  (۱)

$\frac{1}{4}x + 1 \quad x \leq 4$  (۴)

$\frac{1}{4}x - 1 \quad x \geq 4$  (۳)

**تست ۱۲۲ - تابع با ضابطه**  $y = |2x - 6| - |x + 1|$  **در یک بازه صعودی است.** ضابطه معکوس در این بازه به کدام صورت است؟ (تجربی خارج ۹۴)

$x + 7 ; x > -4$  (۲)

$-x + 7 ; x > 8$  (۱)

$\frac{1}{2}x - 1 ; -4 < x < 8$  (۴)

$\frac{1}{3}x + 2 ; x > 3$  (۳)

**تست ۱۲۲** - تابع با ضابطه  $y = 2x - 6 - |x + 4| + x$  آن در این بازه به کدام صورت است؟ (ریاضی داخل ۹۴)

$$-x + 5 ; x > 2 \quad (2)$$

$$-x + 6 ; x < -4 \quad (1)$$

$$-\frac{1}{2}x + 1 ; -4 < x < 10 \quad (4)$$

$$-\frac{1}{2}x + 1 ; -4 < x < 3 \quad (3)$$

**تست ۱۲۳** - در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{|x|}{x} \sqrt{1-x^2}$ ،  $x^2 \neq 1$  کدام است؟ (ریاضی خارج ۹۱)

$$-xf(x) \quad (4)$$

$$xf(x) \quad (3)$$

$$-f(x) \quad (2)$$

$$f(x) \quad (1)$$

**تست ۱۲۵** - در تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} \sqrt{|x|}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۲)

$$y = x\sqrt{|x|}, x \in \mathbb{R} - \{0\} \quad (2)$$

$$y = x\sqrt{|x|}, x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

$$y = x|x|, x \in \mathbb{R} - \{0\} \quad (4)$$

$$y = x|x|, x \in \mathbb{R} \quad (3)$$

**تست ۱۲۶** - ضابطه وارون تابع  $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$  کدام است؟ (تجربی داخل ۹۱)

$$y = \frac{x}{|x|-1}, |x| > 1 \quad (2)$$

$$y = \frac{x}{1-|x|}, |x| < 1 \quad (1)$$

$$y = \frac{|x|-1}{x}, |x| < 1 \quad (4)$$

$$y = \frac{1-|x|}{|x|}, |x| > 1 \quad (3)$$

**تست ۱۲۷** - ضابطه وارون تابع  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ -\sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۱ و تجربی ۹۶)

$$y = \pm x|x|, x \in \mathbb{R} \quad (4)$$

$$y = \pm x^2, x \in \mathbb{R} \quad (3)$$

$$y = -x^2, x < 0 \quad (2)$$

$$y = x|x|, x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

**تست ۱۲۸** - اگر  $f(x) = 1 + \sqrt{x}$  و  $g(x) = x^2$  آنگاه ضابطه  $g^{-1} \circ f^{-1}$  کدام است؟

$$(4)$$

$$x^2 - 1 \quad (3)$$

$$x + 1 \quad (2)$$

$$x - 1 \quad (1)$$

۱۲۹- اگر  $\{f^{-1}(g(x))\}$  مفروض اند. تابع  $f^{-1} \circ g$  کدام است؟

$\{(5,5), (4,3), (3,3)\}$  (۲)

$\{(4,4), (1,1), (3,4)\}$  (۱)

$\{(2,2), (3,3), (5,5)\}$  (۴)

$\{(2,2), (1,1), (4,4)\}$  (۳)

۱۳۰- اگر  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{2x}$  و  $g(x) = f(x) + \sqrt{f(x)}$  کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۳۱- منحنی معکوس تابع  $y = -(x+2)^3 - 2$  را در چند نقطه قطع می کند؟

۳ (۴)

قطع نمی کند

۵ (۲)

۱ (۱)

۱۳۲- اگر  $y = ax^5 + b + 1$  معکوس خود را در  $(1,0)$  قطع کند مقدار  $a^2 + b^2$  کدام است؟


۱ (۴)

۳) صفر

۴ (۲)

۵ (۱)

۱۳۳- نمودار تابع  $y = f^{-1}(x)$  به صورت مقابل است. نمودار تابع  $y = f(x)$  کدام است؟



۱۳۴- اگر  $g(x) = f(3x-4)$  ،  $f^{-1}(x) = x + \sqrt{x}$  ، حاصل  $(f \circ g)^{-1}(16)$  کدام است؟

۸ (۴)

۶ (۳)

۷ (۲)

۵ (۱)

۱۳۵- اگر  $x = -2$  باید  $f(g^{-1}(3)) = -1$  و  $f^{-1}(-2) = 3$  باشد،  $(f \circ g)^{-1}(3)$  به ازای  $x = -2$  کدام است؟

$\frac{1}{2}$  (۴)

-۲ (۳)

-۱ (۲)

$\frac{1}{3}$  (۱)

۱۳۶- تابع  $f$  با ضابطه  $y = x^3 + x + 1$  مفروض است. مقدار عددی  $f^{-1}(1)$  چقدر است؟

$\frac{1}{3}$  (۴)

-۱ (۳)



-۱ (۲)

۱) صفر



$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x \geq 0 \\ -x^2 & x < 0 \end{cases}$$

۱۳۷- نمایش هندسی تابع معکوس

۱۳۸- نمودار تابع وارون، تابع  $f(x) = 2x + |x|$  کدام است؟۱۳۹- تابع معکوس تابع  $y = x^3 - 4x$  با شرط  $x < 2$  کدام است؟

$$f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+4} \quad (2)$$

$$f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x+4} \quad (1)$$

$$f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-4} \quad (4)$$

$$f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x-4} \quad (3)$$

۱۴۰- اگر  $f(x) = x + |x|$  باشد، حاصل  $(fof^{-1})(4/5)$  کدام است؟

(4) موجود نیست.

۶ (۳)

۶ / ۵ (۲)

۴ / ۵ (۱)

**مرکز مشاوره تحصیلی**

۱۴۱- اگر  $g(x) = x^3 + x$  و  $f(x) = \frac{2}{5}x - 4$  کدام است؟ (ت خ ۹۸)

۳ (۴)

۲ / ۵ (۳)

۲ (۲)

۱ / ۵ (۱)

**علیرضا افشار**

۱۴۲- اگر  $g(x) = x^3$  و  $f(x) = \frac{1}{8}x - 3$  کدام است؟

۶۸ (۴)

۶۵ (۳)

۳۶ (۲)

۳۳ (۱)

پیش‌نیازی‌هایی عامل آنکه در

**تست ۱۴۳** - اگر  $g(x) = 2x^3 - 8x + 1$  و  $f(x) = x + 2$  باشند، آن گاه حاصل جمع ریشه های معادله  $(fog^{-1})^{-1}(x) = 0$  کدام است؟

-۸ (۴)

۸ (۳)

-۱۰ (۲)

۱۰ (۱)

**تست ۱۴۴** - اگر  $\{f(x)\}$  و  $\{g(x)\}$  باشند تابع  $g = \{(2, 3), (4, 2), (5, 6), (3, 1)\}$  و  $f = \{(1, 2), (2, 5), (3, 4), (4, 6)\}$  کدام است؟ (۹۸)


{(4, 2), (3, 5)} (۲)

{(4, 2), (5, 2)} (۱)

{(3, 5), (2, 4)} (۴)

{(5, 2), (2, 4)} (۳)

**تست ۱۴۵** - منحنی تابع وارون تابع  $f(x) = x^3 - 2x$ ,  $x \geq 1$  کدام است؟



**تست ۱۴۶** - گر  $f(x) = x^3 - 2x - 3$ ,  $x \geq 1$  باشد. نمودارهای دو تابع  $f^{-1}$  و  $g(x) = \frac{x-9}{2}$  با کدام طول متقاطع هستند؟ (ت ۹۸)

۲۱ (۴)

۱۸ (۳)

۱۵ (۲)

۱۲ (۱)

**تست ۱۴۷** - تابع وارون تابع  $y = \sqrt{1-x}$  کدام است؟

$$y = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \quad (۲)$$

$$y = 1 - x^2, x \geq 0 \quad (۱)$$

$$y = 1 + x^2 \quad (۴)$$

$$y = \sqrt{1+x} \quad (۳)$$

**تست ۱۴۸** - در بزرگ ترین بازه ای که تابع  $f(x) = x + |x+2|$  وارون پذیر است. ضابطه وارون آن کدام است؟

$$y = \frac{x+2}{2}, x \geq -2 \quad (۲)$$

$$y = \frac{x-2}{2}, x \geq -2 \quad (۱)$$

$$y = \frac{x+2}{2}, x \geq 0 \quad (۴)$$

$$y = \frac{x-2}{2}, x \geq 0 \quad (۳)$$

**تست ۱۴۹** - معکوس تابع  $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$  کدام است؟

$$y = -1 - \sqrt[3]{x+1} \quad (۴) \quad y = -1 + \sqrt[3]{x-1} \quad (۳) \quad y = 1 - \sqrt[3]{x+1} \quad (۲) \quad y = 1 - \sqrt[3]{x-1} \quad (۱)$$

QUEST ۱۵۰ - ضابطه وارون تابع  $y = 3x - |x|$  کدام است؟

$$y = \frac{2x - |x|}{4} \quad (۱) \quad y = \frac{x + |x|}{4} \quad (۲) \quad y = \frac{3x + |x|}{4} \quad (۳) \quad y = \frac{3x - |x|}{4} \quad (۴)$$

QUEST ۱۵۱ - ضابطه وارون تابع  $g(x) = -5 - \sqrt{3x + 1}$  کدام است؟

$$g^{-1}(x) = \frac{x^2 + 10x + 24}{3}, \quad x \geq -\frac{1}{3} \quad (۱)$$

$$g^{-1}(x) = \frac{x^2 + 10x + 24}{3}, \quad x \leq -5 \quad (۲)$$

$$g^{-1}(x) = 3x^2 + 30x + 75, \quad x \geq -\frac{1}{3} \quad (۳)$$

$$g^{-1}(x) = 3x^2 + 30x + 75, \quad x \leq -5 \quad (۴)$$

QUEST ۱۵۲ - ضابطه تابع معکوس تابع  $f(x) = x^2 - 2x + 2, x \geq 1$  کدام است؟

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x+1} - 1, \quad x \geq -1 \quad (۱)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} + 1, \quad x \geq 1 \quad (۲)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x+1} - 1, \quad x \geq 1 \quad (۳)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} - 1, \quad x \geq 2 \quad (۴)$$

QUEST ۱۵۳ - اگر  $f^{-1}og^{-1}$  ، ضابطه تابع  $g(x) = 2x - 5$  و  $f(x) = x + 4$  کدام است؟

$$y = x + 4 \quad (۱) \quad y = \frac{x+1}{2} \quad (۲) \quad y = \frac{x-3}{2} \quad (۳) \quad y = \frac{x-2}{3} \quad (۴)$$

QUEST ۱۵۴ - اگر  $gof^{-1}$  ، تابع  $g = \{(2, 3), (-1, 4), (4, 1), (3, 0)\}$  و  $f = \{(1, 2), (2, 5), (0, 3), (4, -1)\}$  کدام است؟

$$gof^{-1} = \{(2, 4), (3, 5)\} \quad (۱) \quad gof^{-1} = \{(0, 0), (1, 3)\} \quad (۲)$$

$$gof^{-1} = \{(5, 3), (-1, 1)\} \quad (۳) \quad gof^{-1} = \{(2, 0), (-1, 4)\} \quad (۴)$$

نمونه سوالات تشریحی و تستی فصل دوم - درس اول، از کتاب ریاضی دوازدهم رشته تجربی

### درس اول

#### تناوب و تانژانت

## سوالات تشریحی و تستی درس اول

**مثال ۱** - دوره تناوب، مقادیر ماکزیمم و مینیمم هریک از توابع مثلثاتی زیر را بیابید.

(الف)  $y = 2 \sin(4x) - 1$

(ب)  $y = \frac{-1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

(پ)  $y = \frac{\pi}{4} \cos(-2x) + 2$

(ت)  $y = 6 \sin\left(\frac{x}{3}\right)$

(ث)  $y = \frac{-3}{2} \sin\left(\frac{x}{4}\right) - 2$

**مثال ۲** - در هر مورد ضابطه تابعی مثلثاتی با دوره تناوب، مقادیر ماکزیمم و مینیمم داده شده را بنویسید.

(الف)  $T = 4\pi$ ,  $\max = 8$ ,  $\min = 5$

(ب)  $T = 3$ ,  $\max = 2$ ,  $\min = -4$

(پ)  $T = \frac{\pi}{4}$ ,  $\max = 4$ ,  $\min = -1$

(ت)  $T = 3\pi$ ,  $\max = 6$ ,  $\min = -3$

**مثال ۳** - چرا توابع متناوب هیچ گاه یک به یک نیستند؟

**مثال ۴** - با افزایش مقادیر زاویه  $\alpha$  در ربع دوم و نزدیک شدن آن به  $\pi$  مقادیر تانژانت تا چه حد افزایش یا کاهش می یابد؟

(با رسم شکل)

**مثال ۵** - توضیح دهید اگر  $a$  عدد حقیقی و منفی باشد، چگونه می توان زاویه ای مانند  $\alpha$  یافت طوری که  $\tan \alpha = a$

**مثال ۶** - دامنه توابع زیر را بیابید.

(الف)  $y = \tan 2x$

(ب)  $y = \frac{1}{4} \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$


(پ)  $y = 3 \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$

(ت)  $y = 2 \tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

**مثال ۷**- نمودار  $y = \tan x$  را در بازه  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  رسم کنید. یکنواختی آن را مشخص کنید.

**مثال ۸**- در ربع اول مقدار  $\sin \alpha$  را با مقدار  $\tan \alpha$  مقایسه کنید.


**مثال ۹**- شکل رو به رو قسمتی از نمودار تابع  $y = a + \sin(b\pi x)$  کدام است؟




**مثال ۱۰**- دوره تناوب دو تابع زیر با هم برابرند. مقادیر ممکن  $b$  را بیابید.

$$y = 3 \sin\left(\frac{\pi x}{b-1}\right) , \quad y = -\cos((b+1)\pi x)$$


**مثال ۱۱**- معادله منحنی رو به رو را به صورت  $y = a \cos(bx)$  بیان کنید.




**مثال ۱۲**- معادله منحنی رو به رو را به صورت  $y = a \sin(bx)$  بیان کنید.




**مثال ۱۳**- معادله منحنی رو به رو را به صورت  $y = a \cos(bx)$  بیان کنید.




**مثال ۱۴**- معادله نمودار زیر را بنویسید.




**مثال ۱۵** - معادله یک تابع سینوسی  $y = a \sin(bx)$  را بنویسید که برد آن  $[-4, 4]$  و دوره تناوب آن  $2\pi$  باشد.



**مثال ۱۶** - معادله نمودار های زیر را بنویسید.




**مثال ۱۷** - نمودار تابع  $f(x) = 1 - a \sin(bx)$  به صورت زیر است،  $a$  و  $b$  را بدست آورید.





**مثال ۱۸** - معادله یک تابع سینوسی  $y = a \sin(bx) + c$  را بنویسید که ماکزیمم آن ۵ و مینیمم آن -۱ و دوره تناوب آن  $8\pi$  است.

**مثال ۱۹** - معادله یک تابع کسینوسی  $y = a \cos(bx) + c$  را بنویسید که ماکزیمم آن  $\frac{1}{3}$  و مینیمم آن -۱ و دوره تناوب آن ۶ است.



**مثال ۲۰** - معادله نمودار های زیر را بنویسید.



**مثال ۲۱** - معادله منحنی های زیر را به ترتیب به صورت  $y = a \sin(bx)$  و  $y = a \cos(bx)$  بیان کنید.

## مثال ۲۲- درستی یا نادرستی هر کدام را مشخص کنید.

الف) تابع تانژانت در ربع چهارم از  $\frac{3\pi}{2}$  تا رسیدن به زاویه  $2\pi$  مقدار کاهشی دارد.

ب) بازه ای وجود دارد که تانژانت در آن بازه صعودی است.

پ) تابع تانژانت تابعی غیر متناوب است.

ت) دوره تناوب تابع  $y = -2\cos\left(\frac{\pi}{8}x\right) + 1$  برابر ۱۶ است.

ث) دامنه تابع تانژانت برابر  $D = R - \left\{x = k\pi + \frac{\pi}{2}\right\}$  است.

ج) دوره تناوب تانژانت برابر  $\frac{\pi}{2}$  است.

چ) در نمودار تابع  $y = a\cos(bx) + c$  مقدار بیشینه نمودار ۵ و کمینه ای نمودار ۲ است. در این صورت مقدار  $a$  برابر  $\frac{3}{5}$  و مقدار  $c$  برابر  $\frac{1}{5}$  است.

 تست ۲۳- دوره تناوب چندتا از توابع زیر  $\pi$  است؟

$$y = \sin 2x, \quad y = \cos 2x, \quad y = 2\sin x, \quad y = \cos \frac{x}{2}, \quad y = 4\sin \frac{x}{2}$$

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)




۱ (۱)

 تست ۲۴- دوره تناوب تابع  $f(x) = \cos(\sqrt{2}\pi x) + 4$  کدام است؟

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\pi \quad \sqrt{2}\pi \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \sqrt{2}$$


 تست ۲۵- در تابع  $y = \pi \sin(-x) + 1$  مجموع مقادیر ماکزیمم، مینیمم و دوره تناوب تابع کدام است؟

$$2(\pi+1) \quad 2(2\pi+1) \quad 2\pi \quad 2(\pi+2)$$

 تست ۲۶- نمودار تابع  $y = 2 \cos(-2x)$  در یک دوره تناوبش کدام است؟ تست ۲۷- تابع  $y = \sin bx$  در یک دوره تناوبش به صورت مقابل است،  $b$  کدام است؟

## فصل ۲ مثلثات

۲۸- نمودار  $y = a \sin bx$  به صورت مقابله داده شده است،  $a + 2b$  کدام است؟ 




۳ (۴)

۴ (۳)

۵ (۲)

۶ (۱)

۲۹- اگر نمودار تابع  $y = a \cos bx$  به صورت روبه رو باشد، کدام مقدار برای  $a + b$  ممکن است؟ 




۵ (۴)

-۳ (۳)


۲ (۲)

-۱ (۱)

۳۰- نمودار تابع به معادله  $f(x) = a \cos bx$  به صورت مقابله است، آنگاه  $\frac{1}{b}$  کدام است؟ 

- $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$  (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$  (۳)- $\sqrt{2}\pi$  (۲) $\sqrt{2}\pi$  (۱)

۳۱- شکل روبه رو قسمتی از نمودار تابع  $y = 1 - \sin mx$  است. مقدار تابع در نقطه  $x = \frac{7\pi}{6}$  کدام است؟ 




۲ (۴)

۱ (۳)

 $\frac{1}{2}$  (۲)


۱) صفر

۳۲- تابع  $f(x) = a \cos(bx) + c$  به صورت مقابله است. دورهٔ تناب این تابع کدام است؟ 


 $\frac{\pi}{3}$  (۴) $\frac{2\pi}{3}$  (۳) $\frac{1}{3}$  (۲) $\frac{2}{3}$  (۱)

## درس اول | تناوب و تانژانت


۳۳- شکل روبرو، قسمتی از نمودار تابع  $y = a \sin(b\pi x)$  است. کدام است؟ (سراسری ریاضی خارج کشور ۹۲)



۳۴- اگر نمودار تابع  $y = a \sin(b\pi x) + b$  به صورت مقابل باشد، کدام میتواند باشد؟



۳۵- شکل روبرو، قسمتی از نمودار تابع  $y = a \sin(\frac{1}{2}\pi x + bx)$  است. کدام است؟ (ر. ۹۲)



۳۶- مختصات نقطه ماکزیمم تابع  $y = \sin 2x$  در اولین دوره تناوب سمت راست مبدا کدام است؟

- (۱)  $(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2})$       (۲)  $(\frac{\pi}{6}, 1)$       (۳)  $(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2})$       (۴)  $(\frac{\pi}{4}, 1)$

۳۷- اگر دوره تناوب تابع  $y = 3 \cos ax$  برابر ۲ باشد، اولین نقطه مینیمم این تابع با طول مثبت کدام است؟


- (۱)  $\frac{1}{2}$       (۲)  $\frac{3}{2}$       (۳)  $\frac{2}{3}$       (۴) ۲

۳۸- تابع  $y = \tan x$  در ربع های اول و دوم به ترتیب چگونه است؟

- (۱) صعودی- صعودی      (۲) صعودی- نزولی      (۳) نزولی- صعودی      (۴) نزولی- نزولی

پیش ریاضی عالی آنلاین

## فصل ۲ مثلثات




$$\frac{\sqrt{5}}{10} \quad (4)$$

کدام است؟

$$\frac{4\sqrt{5}}{5} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{5}}{5} \quad (2)$$

$$\frac{2\sqrt{5}}{5} \quad (1)$$




نمودار مقابل مربوط به کدام تابع است؟

$$y = \tan x - 1 \quad (1)$$

$$y = \tan x + 1 \quad (2)$$

$$y = \tan(x - 1) \quad (3)$$

$$y = \tan(x + 1) \quad (4)$$

نمودار  $y = \tan 2x - 1$  در یک دوره تنابش چگونه است؟برد تابع  $f(x) = -4 \tan\left(\frac{x}{3}\right) + 1$  کدام بازه است؟

$$\mathbb{R} \quad (4)$$

$$(-\infty, 1) \quad (3)$$

$$\left[-1, \frac{5}{3}\right] \quad (2)$$

$$[-3, 5] \quad (1)$$

تابع  $y = \tan\left(\frac{x}{3}\right)$  در تمامی نقاط کدام بازه صعودی است؟

$$(0, 2\pi) \quad (4)$$

$$(0, 3\pi) \quad (3)$$

$$(-\pi, \pi) \quad (2)$$

$$(\pi, 2\pi) \quad (1)$$

اگر دوره تناب تابع  $f(2x)$  برابر باشد، دوره تناب تابع  $f(5x)$  کدام است؟

$$\frac{T}{2} \quad (4)$$

$$5T \quad (3)$$

$$\frac{2}{5}T \quad (2)$$

$$\frac{5}{2}T \quad (1)$$

دوره تناب اصلی تابع  $f(x) = 7 \sin\frac{x}{3} + 5$  کدام است؟

$$8\pi \quad (4)$$

$$6\pi \quad (3)$$

$$4\pi \quad (2)$$

$$— \quad (1)$$

دوره تناب اصلی تابع  $f(x) = 8 \cos 3x + 7$  کدام است؟

$$\frac{3\pi}{2} \quad (4)$$

$$6\pi \quad (3)$$

$$\frac{2\pi}{3} \quad (2)$$

$$2\pi \quad (1)$$

دوره تناب اصلی تابع  $y = |\cos x|$  برابر است با :

$$2\pi \quad (4)$$

$$\frac{3\pi}{2} \quad (3)$$

$$\pi \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (1)$$



## درس اول | تناوب و تانژانت

**تست ۴۸**- دوره تناوب تابع  $f(x) = \tan \frac{x}{4} \cdot \cot \frac{x}{4}$  کدام است؟

- $\frac{\pi}{2}$  (۴)       $\pi$  (۳)       $2\pi$  (۲)       $4\pi$  (۱)

**تست ۴۹**- کدام ضابطه زیر دارای نموداری به صورت مقابل است؟

- $y = 2 - \cos x$  (۴)       $y = \sin x - 2$  (۳)       $y = 2 \cos x + 1$  (۲)       $y = 2 \sin x - 1$  (۱)




**تست ۵۰**- ضابطه متناظر با نمودار مقابل کدام است؟


- $y = 2 - \cos x$  (۴)       $y = 2 \sin x - 1$  (۳)       $y = \sin x - 2$  (۲)       $y = 2 \cos x + 1$  (۱)

پیش‌نیاز ریاضی عالی آنکه در

**تست ۵۱**- کدام یک از موارد زیر، بخشی از تابع  $y = -2 \sin 3x$  را نشان میدهد؟



**تست ۵۲**- شکل مقابل نمودار کدام تابع در بازه  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  است؟




- $y = 1 + \sin(2x + \frac{\pi}{6})$  (۱)  
 $y = 1 + \cos(x + \frac{\pi}{3})$  (۲)  
 $y = 1 - \sin(2x + \frac{\pi}{6})$  (۳)  
 $y = 1 - \cos(x + \frac{\pi}{3})$  (۴)



## فصل ۲ مثلثات

تست

۵۳- نمودار مقابل مربوط به ضابطه کدام یک از توابع زیر می‌تواند باشد؟




$$f(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 1 \quad (1)$$

$$f(x) = \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 1 \quad (2)$$

$$f(x) = \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1 \quad (3)$$

$$f(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 1 \quad (4)$$





۵۴- ضابطه تابع مقابل کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟

$$y = \tan\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (1)$$

$$y = 3 \tan t \quad (2)$$

$$y = -\tan t + 1 \quad (3)$$

$$y = -2 \tan 2t \quad (4)$$

۵۵- کدام یک از نمودارهای زیر، نمودار تابع  $y = 2 + \tan 2x$  است؟۵۶- نمودار تابع  $f(x) = a \tan(ax - b)$  در یک دوره تنابش به کدام شکل‌ها می‌تواند باشد؟ با شرط  $b > 0$ 

(۱) الف و ب

(۲) پ و ت

(۳) الف و پ

(۴) ب و ت

(۱) دو نقطه

(۲) سه نقطه

(۳) یک نقطه

(۴) چهار نقطه

۵۷- نمودار تابع  $y = \tan x$  و  $y = \frac{1}{2}x$  در بازه  $[-2\pi, 2\pi]$  در چند نقطه یکدیگر را قطع می‌کنند؟

## درس اول | تناوب و تانژانت

۵۸- مساحت مثلثی که از برخورد نمودار تابع تانژانت با محور  $x$  ها در بازه  $y$  با محور  $x$  و خط  $y = x + \frac{\pi}{2}$  و  $y = -x - \frac{\pi}{2}$  است.


ها حاصل می شود، کدام است؟

$$\frac{3\pi}{2} (4)$$

$$\frac{5\pi}{2} (3)$$

$$\pi (2)$$

$$\frac{\pi}{2} (1)$$




۵۹- قسمتی از نمودار تابع  $f(x) = \tan ax$  به صورت مقابل است. a کدام است؟

$$-\pi (4)$$

$$\pi (3)$$

$$-\frac{\pi}{2} (2)$$

$$\frac{\pi}{2} (1)$$




۶۰- نمودار تابع  $f(x) = \tan(ax + b)$  به شکل مقابل است. a  $\times$  b کدام می تواند باشد؟

$$\frac{3\pi^2}{52} (4)$$

$$-\frac{3\pi^2}{52} (3)$$

$$\frac{\pi^2}{52} (2)$$


$$-\frac{\pi^2}{52} (1)$$



۶۱- نمودار تابع  $y = a \tan(bx + \frac{1}{3}\pi)$  مطابق شکل روبرو است. a و b کدام می توانند باشند؟

- |   |     |
|---|-----|
| $\left(-\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right)$  | (1) |
| $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{3}{4}\right)$ | (2) |
| $\left(\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right)$   | (3) |
| $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$             | (4) |

۶۲- اگر خط d مطابق شکل از مرکز تقارن تابع  $f(x) = a + b \tan(x - c)$  در یک دوره تناوب آن بگذرد. حاصل




abc کدام است؟

$$-\frac{\pi}{2} (3)$$

$$\pi (2)$$


$$\frac{\pi}{2} (1)$$

۹۵)  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$  کدام است؟ ( $\mathbf{r} - \mathbf{y} = \mathbf{a} - 2\cos\left(\mathbf{b}\mathbf{x} + \frac{\pi}{4}\right)$ )




- $$\frac{3}{2} (3) \quad 1 (2) \quad \frac{1}{2} (1)$$

(٩٥) کدام است  $\mathbf{a} + \mathbf{b}$  ؟ است.  $y = 1 + a \sin\left(bx - \frac{\pi}{6}\right)$  (رخ)




- $$\frac{3}{2} (3) \quad 1 (2) \quad \frac{1}{2} (1)$$

$y = a + \sin(b\pi x)$  کدام است؟ (تجربی ۹۳)  $x = \frac{25}{3}$  در نقطه  $y$  مقدار است.



- ۲ / ۵ (۳)

$y = a \sin(b\pi x)$  است. مقدار  $a + b$  کدام است؟ (سراسری تجربی خارج کشور ۹۳)



- $$\frac{V}{3} (3) \quad \frac{W}{3} (2) \quad \frac{F}{3} (1)$$

$$\frac{\sqrt{x}}{\cos x} \text{ در بازه } (0, 3\pi) \text{ چند ریشه دارد؟}$$



۶۸- معادله  $\sin x - 1 = 0$  در بازه  $[\pi, \pi]$  چند ریشه حقیقی دارد؟

- ፭ (፲፻፲፷) የዚህ ሰነድ በ፳፻፲፷ ዓ.ም. የኢትዮጵያ አገልግሎት ማስታወሻ ስርዓት የሚሰጠውን የሚከተሉት የሚመለከት ስም ስም የሚከተሉት የሚመለከት ስም ስም የሚከተሉት የሚመለከት ስም ስም

۶۹- نمودار تابع به معادله  $y = -4 \cos\left(\frac{\pi}{4}x - 3\pi\right)$  در چند نقطه بیشترین مقدار را دارد؟ (ت ۹۱)

۷۰- اختلاف بیشترین و کمترین مقدار تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = 1 - 3 \cos 2x$  کدام است؟  تست

۶ (۴)


۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۷۱- شکل رو به رو قسمتی از نمودار تابع  $y = \frac{1}{2} + 2 \cos(mx)$  کدام است؟  تست

(سراسری ریاضی ۹۶)




۱ (۳)

- $\frac{1}{2}$  (۲) $\frac{1}{2}$  (۱)


۷۲- شکل رو به رو قسمتی از نمودار تابع  $y = 1 - \sin(mx)$  کدام است. مقدار تابع در نقطه  $x = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}$  است.  تست

ریاضی خارج کشور ۹۶



۱ (۳)

۲ (۲)

 $\frac{1}{2}$  (۱)

۱ (۳)

۲ (۲)

-۲ (۱)

# مرکز مشاوره تحصیلی

# علیرضا افشار

دانشجویی عالی آنلاین



# مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار

نمونه سوالات تشریحی و تستی فصل دوم - درس دوم، از کتاب ریاضی دوازدهم رشته تجربی

## درس دوم

## معادلات مثلثاتی

۱- درستی رابطه های زیر را اثبات کنید. 

(الف)  $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$

(ب)  $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$

(پ)  $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$

(ت)  $\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$

۲- اگر  $\alpha$  حاده است ، روابط زیر را اثبات کنید. ( فرمول های طلایی مثلثات ) 

(الف)  $\sin \alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}}$

(ب)  $\cos \alpha = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}}$

۳- صفر های توابع  $y = \cos x$  و  $y = \sin x$  را بیابید. 

۴- حاصل  $\cos 22^\circ / \sin 22^\circ$  را بیابید. (راهنمایی: از فرمول های طلایی بهره بگیرید). 

۵- اگر  $\sin \alpha = -\frac{2}{5}$  باشد. حاصل  $\sin 2\alpha$  و  $\cos 2\alpha$  را بیابید. 

۶- مثلثی با مساحت  $8\sqrt{2}$  سانتی متر مربع است اگر اندازه هی هر ضلع آن  $4$  و  $8$  سانتی متر باشد ، آن گاه چند مثلث با 

این خاصیت وجود دارد؟

۷- اگر  $\alpha$  در ربع سوم و  $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$  باشد مطلوب است محاسبه هی 

۸- اگر  $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$  باشد.  $\cos 2x$  را محاسبه کنید. 

۹- از تساوی  $\sin 15^\circ \times \cos 15^\circ = \frac{1}{4}$   نسبت های مثلثاتی زاویه های  $15^\circ$  را حساب کنید.


۱۰- اگر  $\alpha$  حاده و  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$  باشد مطلوب است محاسبه هی   $\cos 2\alpha$  ،  $\sin 2\alpha$

۱۱- مقدار عددی  $\sin 15^\circ$  را بیابید. 

## درس دوم | معادلات مثلثاتی

۱۲- با استفاده از مثلث متساوی الساقین زیر که طول ساق های آن واحد است و زاویه راس آن  $\alpha$  است. با محاسبه مساحت آن از دو طریق نتیجه بگیرید:

$$\sin \alpha = 2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \times \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$



$$\frac{1}{\tan \alpha + \cot \alpha} = \sin 2\alpha$$

۱۴- فرض کنید  $\tan \alpha = \frac{3}{4}$  و  $\alpha$  زاویه حاده باشد، حاصل  $\sin 2\alpha$  را بیابید.

$$\frac{\sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} = \tan \alpha$$

۱۵- درستی تساوی مقابله را ثابت کنید.

۱۶- معادلات مثلثاتی زیر را حل کنید و جواب کلی آن ها را بنویسید.

(الف)  $\cos 2x - 3 \cos x + 2 = 0$

(ب)  $\sin 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

(پ)  $\cos x - \cos^3 x = 0$

(ت)  $\sin^2 x - \cos^2 x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(ث)  $\sin 2x + \sin x = 0$

(ج)  $2 \sin^2 2x - \sin 2x + 1 = 0$

(ج)  $2 \sin^2 2x + \sin 2x - 1 = 0$

(ح)  $\sin 3x - \sin 4x = 0$

(خ)  $\cos 2x - \cos x + 1 = 0$

(د)  $\sin^3 x - \sin x = 0$

(ذ)  $\sin 2x = 2 \cos x$

(ر)  $\cos 2x - 4 \cos x + 3 = 0$



**مثال ۱۷** - معادله‌ی مثلثاتی زیر را حل کنید و جواب‌های کلی آن را بنویسید.

$$\cos 3x + 2 \cos 3x - 3 = 0$$

**مثال ۱۸** - جواب کلی معادله‌ی  $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$  کدام است؟

**مثال ۱۹** - معادله‌ی  $\sin 4x + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 0$  در بازه‌ی  $[0, 2\pi]$  کدام است؟

**مثال ۲۰** - جواب کلی معادله‌ی مثلثاتی زیر کدام است؟

$$2 \sin(\pi - x) \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + 3 \cot x \sin(\pi + x) = 0$$

**مثال ۲۱** - جواب‌های معادله‌ی  $\sin^2 x = \cos^2 x$  در بازه‌ی  $[0, 2\pi]$  کدام است؟

**مثال ۲۲** - جواب‌های کلی معادله‌ی مثلثاتی  $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + \cos(\pi - x) = -\sqrt{3}$  را بنویسید.

**مثال ۲۳** - معادله‌ی  $4 \cos^2 x - 9 \cos x + 5 = 0$  را حل کنید. و جواب‌های کلی آن را بیابید.

**مثال ۲۴** - جواب کلی معادله‌ی مثلثاتی  $5 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + \cos 2x = 5 \cos^2 x + 6$  را بدست آورید.

**مثال ۲۵** - جواب‌های کلی معادله‌ی مثلثاتی  $\sin 3x + \cos x = 0$  را به دست آورید.

**مثال ۲۶** - معادلات زیر را حل کنید.

(الف)  $\sin x - \sin 3x = 0$

(ب)  $\sin x + \sin 3x = 0$

(پ)  $\cos x - \cos 3x = 0$

(ت)  $\cos x + \cos 3x = 0$

**مثال ۲۷** - معادله‌ی  $\sin x + \cos x = 1$  را حل کنید.

**مثال ۲۸** - کلیه جواب‌های معادله مثلثاتی  $\cos^2 x - 3 \cos x + 2 = 0$  را تعیین کنید.

**مثال ۲۹** - معادله مثلثاتی  $2 \sin x - \sqrt{2} = 0$  را حل کنید.

**مثال ۳۰** - کلیه‌ی جواب‌های معادله‌ی  $2 \cos^2 x - \cos x = 0$  را تعیین کنید.

**مثال ۳۱** - معادله‌ی مثلثاتی  $\sin 5x = \sin 2x$  را حل کنید.

دانش آموزی عالی آنلاین

## درس دوم | معادلات مثلثاتی

**مثال ۳۲** - کلیه ای جواب های معادله ای مثلثاتی  $\sin 2x - \sqrt{3} \cos x = 0$  را تعیین کنید.

**مثال ۳۳** - معادله ای زیر را حل کنید.

$$(2 \sin x + 1)(\cos x - 1) = 0$$

**مثال ۳۴** - معادله ای مثلثاتی  $\sin^2 x + \cos 2x = 0$  را حل کرده و جواب های بین  $0$  و  $2\pi$  را تعیین کنید.

**مثال ۳۵** - معادله ای مثلثاتی روبه رو را حل کنید و جواب های کلی را بنویسید.

**مثال ۳۶** - معادله ای مثلثاتی  $2 \sin^2 x + \sin x - 3 = 0$  را حل کرده و جواب های بین  $0$  و  $2\pi$  را تعیین کنید.

**مثال ۳۷** - جواب کلی معادله ای  $2 \cos^2 x - 7 \cos x + 3 = 0$  را بیابید.

**مثال ۳۸** - معادله ای  $\sin^2 x + 2 \cos^2 x = \frac{5}{4}$  در بازه  $[0, 2\pi]$  چند ریشه دارد؟

**مثال ۳۹** - معادله ای  $\sin x + \cos x + \sin x \cos x + 1 = 0$  چند ریشه دارد؟

**مثال ۴۰** - معادله ای  $(2 \sin x + 1)(3 \sin x + 2) = 0$  در بازه  $[\pi, 2\pi]$  چند ریشه دارد؟

**مثال ۴۱** - جواب کلی معادله ای مثلثاتی  $2(1 + \tan^2 x) \cos(\pi + 2x) = 2$  را بیابید.

**مثال ۴۲** - جواب کلی معادله ای مثلثاتی  $\sin^2 x - \cos^2 x = \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)$  را بیابید.

**مثال ۴۳** - معادله ای  $\cos 5x = \sin x$  را حل کنید.

**تست ۴۴** - خلاصه شده ای عبارت  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \times \cos(\pi + \alpha) - \sin(\pi - \alpha) \times \cos(-\alpha)$  کدام است؟

-  $\cos 2\alpha$  (۴)

$\cos 2\alpha$  (۳)

$\sin 2\alpha$  (۲)

-  $\sin 2\alpha$  (۱)

**تست ۴۵** - اگر  $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right) \times \sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = 1$  مقدار  $\cos 2x$  کدام است؟

-  $\frac{1}{3}$  (۴)

$\frac{1}{3}$  (۳)

-  $\frac{2}{3}$  (۲)

$\frac{2}{3}$  (۱)

**مثال ۴۶** - اگر  $\alpha, \beta$  زاویه های منفرجه و کم تر از  $270^\circ$  باشند: به طوری که  $\sin \beta = \frac{4}{5}$  و  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$  مقادیر زیر بیابید.

(الف)  $\sin 2\alpha$

(ب)  $\tan 2\alpha$

(پ)  $\cos 2\alpha$

۴۷ - چه تعداد از تساوی های زیر یک اتحاد مثلثاتی را نشان می دهد؟ (مشابه تمرين کتاب درسی)

$$\cos^4 \alpha + \sin^4 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \quad \text{ب)$$

$$1 - \frac{\sin^2 \alpha}{1 + \cos \alpha} = \cos \alpha \quad \text{ت)$$

۴ (۴)

۳ (۳)

$$(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha) = \cos^2 \alpha \quad \text{الف)$$

$$\tan \alpha + \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{\cot \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha} \quad \text{پ)$$

۱ (۱)

۲ (۲)

۴۸ - اگر  $\cos \alpha = \frac{1}{3}$  باشد، حاصل عبارت  $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha + \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}$  برابر است با:

 $\frac{8}{9}$  (۴)

- (۳)

 $\frac{2}{3}$  (۲)

۱ (۱)

$$\frac{\cos \theta}{\sin \theta + 1 \circ \sin^3 \theta} \quad \text{کدام است؟}$$

 $\frac{4}{3}$  (۴) $\frac{3}{2}$  (۳) $\frac{2}{3}$  (۲)

۱ (۱)

۴۹ - اگر  $\cot \theta = 3$  باشد، مقدار کسر  $\frac{\sin x + 2 \cos x}{\sin x - 3 \cos x}$  کدام است؟ (مشابه تمرين کتاب درسی)

 $-\frac{8}{65}$  (۴) $-\frac{16}{65}$  (۳) $\frac{8}{65}$  (۲) $\frac{16}{65}$  (۱)

۵۰ - اگر  $x = 22 / 5^\circ$  باشد، حاصل  $\tan x$  برابر است با:

 $\frac{\sqrt{2}}{4}$  (۴) $\frac{\sqrt{2}}{3}$  (۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (۲) $\sqrt{2}$  (۱)

۵۱ - مقدار  $\frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}$  به ازای  $x = 22 / 5^\circ$  برابر است با:

 $2 \cos 40^\circ$  (۴) $2 \sin 40^\circ$  (۳) $-1(2)$ 

۱ (۱)

$$\frac{\cos^4 40^\circ - \sin^4 40^\circ}{\sin 1^\circ} \quad \text{برابر است با:}$$

۵۲ - حاصل عبارت  $\cos^2 22 / 5^\circ - \cos^2 67 / 5^\circ$  کدام است؟ (مشابه تمرين کتاب درسی)

 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$  (۴) $\frac{\sqrt{5}}{4}$  (۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (۲) $\frac{\sqrt{3}}{4}$  (۱)

۵۳ - حاصل  $\sin 18^\circ \times \cos 36^\circ$  برابر است با:

 $\frac{1}{4}$  (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (۳) $\frac{1}{3}$  (۲) $\frac{1}{2}$  (۱)

۵۴ - اگر  $A = (\cos 75^\circ - \sin 75^\circ)(\cos 75^\circ + \sin 75^\circ)$  باشد، آن گاه  $A$  کدام است؟

 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$  (۴) $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (۳) $\frac{1}{2}$  (۲) $-\frac{1}{2}$  (۱)

۵۵ - حاصل  $\sin^2 22 / 5^\circ + \cos^2 15^\circ$  کدام است؟

۱۸

**درسنامه** معادلات مثلثاتی

$$\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{4}$$

$$1 - \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{4}$$

$$1 + \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{4}$$

$$1 + \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{4}$$

(۹۲) - اگر  $f(x) = x - \sqrt{x}$  و  $g(x) = \sin^4 x$  کدام است؟ (تجربی خارج)  
باشد، ضابطه تابع  $fog$  کدام است؟ (تجربی خارج)

$$\frac{1}{2} \cos^2 2x$$

$$-\sin$$

$$-\frac{1}{2} \sin^2 2x$$

$$\frac{1}{4} \sin^2 2x$$

(۹۵) - اگر  $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - 2\alpha\right)$  باشد، مقدار  $\sin \alpha - \cos \alpha$  کدام است؟ (تجربی خارج)  
 $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}\right)$  باشد، مقدار کدام است؟ (تجربی خارج)

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{8}$$

$$-\frac{3}{8}$$

$$-\frac{3}{4}$$

(۹۵) - اگر  $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{2}$  باشد، مقدار  $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}\right)$  کدام است؟ (تجربی خارج)  
 $\tan x - \cot x$  باشد، مقدار  $\tan x$  کدام است؟ (تجربی خارج)

$$2$$

$$\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2}$$

$$-2$$

(۹۶) - اگر  $\tan x = \frac{4}{3}$  باشد، مقدار  $\tan x - \cot x$  کدام است؟ (تجربی خارج)  
 $A = \frac{(1 + \tan^2 \theta)(1 + \cot^2 \theta)}{1 - \sin^2 \theta - \cos^4 \theta}$  کدام است؟ (ریاضی خارج)

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{4}{3}$$

$$-\frac{3}{2}$$

$$-\frac{3}{4}$$

$$16 \sin^{-4} 2\theta$$

$$16 \cos^{-4} 2\theta$$

$$8 \sin^{-2} 2\theta$$

$$8 \cos^2 2\theta$$

(۶۲) - جواب کلی معادله  $\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$  کدام است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)  
جواب کلی معادله  $\cos x + \sqrt{3} = 0$  کدام است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)

$$k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

$$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

(۶۳) - جواب کلی معادله  $2 \cos x + \sqrt{3} = 0$  کدام است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)  
جواب کلی معادله مثلثاتی  $\cos^2 x - \cos x - 3 = 0$  کدام است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)

$$2k\pi \pm \frac{5\pi}{6}$$

$$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

(۶۴) - جواب کلی معادله مثلثاتی  $\cos^2 x - \cos x - 3 = 0$  کدام است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)  
جواب کلی معادله  $\sin\left(\frac{5\pi}{2} + x\right) \cos(x - 2\pi) = \sin^4 \frac{5\pi}{4}$  کدام است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)

$$k\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$2k\pi - \frac{\pi}{2}$$

$$2k\pi + \pi$$

$$k\pi$$

(۶۵) - جواب کلی معادله  $\sin\left(\frac{5\pi}{2} + x\right) \cos(x - 2\pi) = \sin^4 \frac{5\pi}{4}$  کدام است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)  
 $\sin(\pi + x) \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 2 \sin(\pi - x) + 1 = 0$  کدام است؟ (تجربی خارج)

$$k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

$$k\pi + \frac{\pi}{12}$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

(۶۶) - جواب کلی معادله مثلثاتی  $\sin(\pi + x) \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 2 \sin(\pi - x) + 1 = 0$  کدام است؟ (تجربی خارج)  
 $k\pi \pm \frac{\pi}{2}$

$$2k\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$2k\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$2k\pi - \frac{\pi}{2}$$

۶۷- جواب کلی معادله مثلثاتی  $(\sin x - \tan x) \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۰) 

$k\pi \pm \frac{\pi}{6}$  (۴)

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$  (۳)

$k\pi + \frac{\pi}{3}$  (۲)

$k\pi - \frac{\pi}{6}$  (۱)

۶۸- جواب کلی معادله مثلثاتی  $\sin^2 x - \cos^2 x = \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)$  به کدام صورت است؟ (تجربی ۹۱) 

$k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$  (۴)

$k\pi + \frac{\pi}{3}$  (۳)

$\frac{2k\pi}{3}$  (۲)

$\frac{k\pi}{3}$  (۱)

۶۹- جواب کلی معادله مثلثاتی  $\frac{\tan x}{1 - \tan^2 x} = \sqrt{3}$  به کدام صورت است؟ (تجربی ۹۲) 

$k\pi - \frac{\pi}{6}$  (۴)

$k\pi + \frac{\pi}{6}$  (۳)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$  (۲)

$\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$  (۱)

۷۰- نمودار تابع  $y = 3 \sin\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right)$  در چند نقطه محور  $x$  ها را قطع می کند؟ (تجربی خارج ۹۱) 

$5$  (۴)

$4$  (۳)

$3$  (۲)

$2$  (۱)

۷۱- جواب کلی معادله مثلثاتی  $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 \frac{5\pi}{4}$  به کدام صورت است؟ (تجربی ۹۲) 

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$  (۴)

$k\pi + \frac{\pi}{6}$  (۳)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$  (۲)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$  (۱)

۷۲- مجموع تمام جواب های معادله مثلثاتی  $\sin 5x + \sin 4x = 1 + \cos \pi$  در بازه  $[0, 2\pi]$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۲) 

خارج

$11\pi$  (۴)

$10\pi$  (۳)

$9\pi$  (۲)

$8\pi$  (۱)

۷۳- جواب کلی معادله مثلثاتی  $\frac{\sin 3x}{\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)} = 1$  به کدام صورت است؟ (تجربی خارج ۹۳) 

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$  (۴)

$2k\pi \pm \frac{3\pi}{4}$  (۳)

$2k\pi \pm \frac{\pi}{4}$  (۲)

$k\pi + \frac{\pi}{4}$  (۱)

۷۴- جواب کلی معادله مثلثاتی  $2 \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1$  به کدام صورت است؟ (تجربی ۹۴) 

$k\pi + \frac{\pi}{8}$  (۴)

$k\pi - \frac{\pi}{8}$  (۳)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$  (۲)

$\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$  (۱)

۷۵- جواب کلی معادله مثلثاتی  $\cos 3x + \cos x = 0$  با شرط  $\cos x \neq 0$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۳) 

$k\pi + \frac{\pi}{4}$  (۴)

$k\pi - \frac{\pi}{4}$  (۳)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$  (۲)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$  (۱)

## درس دوم | معادلات مثلثاتی

۷۶- جواب کلی معادله مثلثاتی  $\circ 2 \sin^2 x + 3 \cos x = 0$  کدام است؟ (تجربی ۹۵)  تست

$$k\pi - \frac{\pi}{3} \quad (۴)$$

$$2k\pi \pm \frac{5\pi}{6} \quad (۳)$$

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (۲)$$

$$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \quad (۱)$$

۷۷- اگر  $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{2}$  باشد، مقدار  $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}\right)$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۵)  تست

$$\frac{1}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۳)$$

$$-\frac{1}{2} \quad (۲)$$

$$-2 \quad (۱)$$

۷۸- جواب کلی معادله مثلثاتی  $\circ \cos 2x + 2 \cos^2 x = 0$  کدام است؟ (تجربی ۹۶)  تست

$$k\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad (۴)$$

$$k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (۳)$$

$$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \quad (۲)$$

$$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \quad (۱)$$

۷۹- مجموع جواب های معادله مثلثاتی  $\circ \sin 2x + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 0$  در بازه  $[0, 2\pi]$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۶)  تست

$$5\pi \quad (۴)$$

$$\frac{9\pi}{2} \quad (۳)$$

$$4\pi \quad (۲)$$

$$\frac{14\pi}{3} \quad (۱)$$

۸۰- جواب کلی معادله مثلثاتی  $\circ 2 \cos 2x = \cot x(4 \sin x + \tan x)$  کدام است؟ (ریاضی خارج ۹۲)  تست

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad (۴)$$

$$2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \quad (۳)$$

$$k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (۲)$$

$$k\pi - \frac{\pi}{3} \quad (۱)$$

۸۱- مجموع تمام جواب های معادله مثلثاتی  $\circ \sin 4x = \sin^4 x - \cos^4 x$  در بازه  $[0, \pi]$  برابر کدام است؟ (ریاضی ۹۵)  تست

$$\frac{11\pi}{3} \quad (۴)$$

$$\frac{5\pi}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{9\pi}{4} \quad (۲)$$

$$\frac{7\pi}{4} \quad (۱)$$

۸۲- مجموع جواب های معادله مثلثاتی  $\circ \sin(x + \frac{\pi}{8}) + \cos(x - \frac{3\pi}{8}) = 1$  برابر کدام است؟  تست

(ریاضی خارج ۹۵)

$$\frac{7\pi}{4} \quad (۴)$$

$$\frac{3\pi}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{5\pi}{4} \quad (۲)$$

$$\frac{3\pi}{4} \quad (۱)$$

۸۳- جواب کلی معادله مثلثاتی  $\circ \tan x \tan 3x = 1$  کدام است؟ (تجربی ۹۷)  تست

$$\frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{8} \quad (۴)$$

$$\frac{k\pi}{2} + \frac{3\pi}{8} \quad (۳)$$

$$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8} \quad (۲)$$

$$\frac{k\pi}{4} \quad (۱)$$

۸۴- اگر  $\cos 2\alpha$  حاصل  $\tan \alpha = 3$  کدام است؟  تست

$$0/45 \quad (۴)$$

$$0/8 \quad (۳)$$

$$0/6 \quad (۲)$$

$$0/75 \quad (۱)$$

۸۵- اگر  $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - 2\alpha\right)$  مقدار  $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{2}$  کدام است؟  تست

$$-\frac{3}{4} \quad (۴)$$

$$-\frac{3}{8} \quad (۳)$$

$$\frac{3}{8} \quad (۲)$$

$$\frac{3}{4} \quad (۱)$$

۸۶- حاصل  $\sin x \cos x (1 - 2 \sin^2 x)$  به ازای  $x = 7/5^\circ$  کدام است؟  تست

$$\frac{1}{4} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{8} \quad (۳)$$

$$\frac{3}{8} \quad (۲)$$

$$\frac{3}{16} \quad (۱)$$

۸۷ - جواب کلی معادله می مثلثاتی  $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \sin(\pi + x) = 0$  به کدام صورت است؟

- $2k\pi + \frac{\pi}{2}$  (۴)       $2k\pi \pm \frac{\pi}{4}$  (۳)       $k\pi - \frac{\pi}{4}$  (۲)       $k\pi + \frac{\pi}{4}$  (۱)

۸۸ - یکی از جواب های معادله  $2\sin^2 x - 3\sin x - 2 = 0$  کدام است؟

- $\frac{4\pi}{3}$  (۴)       $\frac{7\pi}{6}$  (۳)       $\frac{5\pi}{6}$  (۲)       $\frac{2\pi}{3}$  (۱)

۸۹ - جواب کلی معادله می مثلثاتی  $\cos 2x = \sin x$  به صورت  $x = 2k\pi + \frac{i\pi}{6}$  بیان شده است. مجموعه می مقادیر کدام است؟

- {1, 5, 9} (۴)      {1, 4, 7} (۳)      {1, 3, 5} (۲)      {7, 9} (۱)

۹۰ - جواب کلی معادله می مثلثاتی  $2\cos^2 x - \cos x - 3 = 0$  کدام است؟

- $k\pi + \frac{\pi}{2}$  (۴)       $2k\pi - \frac{\pi}{2}$  (۳)       $2k\pi + \pi$  (۲)       $k\pi$  (۱)

۹۱ - جواب کلی معادله می مثلثاتی  $2\sin^2 x = 3\cos x$  به کدام صورت است؟

- $2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$  (۴)       $2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$  (۳)       $k\pi \pm \frac{\pi}{3}$  (۲)       $k\pi \pm \frac{\pi}{6}$  (۱)

۹۲ - نمودار تابع  $y = \cos 3x$  محور  $x$  ها در فاصله  $[0, \pi]$  در چند نقطه قطع می کند؟

- ۴ (۴)      ۳ (۳)      ۲ (۲)      ۱ (۱)

۹۳ - جواب کلی معادله می مثلثاتی  $2\sqrt{2}\sin x \times \cos x = \sin x + \cos x$  کدام است؟

- $2k\pi + \frac{\pi}{4}$  (۴)       $2k\pi - \frac{\pi}{4}$  (۳)       $2k\pi \pm \frac{\pi}{4}$  (۲)       $k\pi + \frac{\pi}{4}$  (۱)

۹۴ - جواب کلی معادله می مثلثاتی  $2\sin^2 x + 3\cos x = 0$  کدام است؟

- $k\pi - \frac{\pi}{3}$  (۴)       $2k\pi \pm \frac{5\pi}{3}$  (۳)       $2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$  (۲)       $2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$  (۱)

بیان ریاضی عارل آنکردی

# مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار

## سوالات فصل سوم ریاضی ۳ تجربی

## درس اول

## حد بی نهایت

## سوالات تشریحی و تستی درس اول

۱- باقیمانده تقسیم چندجمله ای های زیر را پیدا کنید. مثال

(الف) باقیمانده تقسیم  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 1$  بر ۲

(ب) باقیمانده تقسیم  $f(x) = x^{100} + x^{50} + x^{25} + x^{10} + x^5 + 1$  بر ۱

(پ) باقیمانده تقسیم  $f(x) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x - 2$  بر ۲

۲- مقدار  $m$  را چنان بباید که چند جمله ای  $p(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + m$  بر ۱- $x$  بخش پذیر باشد. مثال

۳- چندجمله ای  $f(x) = x^4 - x^3 - x^2 - x - 2$  را به کمک تقسیم، تجزیه کنید. مثال

۴- نشان دهید یکی از فاکتور های معادله  $x^3 - 8x^2 + 9x - 3 = 0$  است و معادله  $x^3 - 8x^2 + ax^2 + 3 = 0$  را حل کنید. مثال

۵- اگر یکی از ریشه های معادله  $x^3 + ax^2 + 3 = 0$  برابر ۲ باشد، ریشه های دیگر معادله را در صورت وجود بباید. مثال

۶- اگر خارج قسمت تقسیم  $x^3 - 7x + b = 0$  بر  $x + a$  برابر ۲ باشد، باقی مانده ۵ باشد، مقادیر  $a$  و  $b$  را بباید. مثال

۷- اگر عبارت  $2x^3 - 3x^2 + ax - b$  بر ۲- $x$  بخش پذیر باشد، نشان دهید که رابطه  $2a + 4 = b$  برقرار است. مثال

درس اول حد بی نهایت

**مثال ۸** - مقدار  $a$  را چنان بباید که یک جواب معادله  $x^3 - 2x^2 + ax + 2 = 0$  باشد، سپس جواب های دیگر معادله را به دست آورید.

**مثال ۹** - مقدار  $a$  و  $b$  را طوری بباید تا  $x^3 - 2x^2 + ax + b$  بخش پذیر باشد.

**مثال ۱۰** - چند جمله ای درجه سومی را بباید که باقی مانده تقسیم آن بر هر یک از عبارت های  $x + 1$  ،  $x - 1$  و  $x - 2$  برابر با  $48$  و بر  $3 - x$  بخش پذیر باشد.

**مثال ۱۱** - نشان دهید  $3 + 2x^3 + 3x^2 - 8x - 12$  یک فاکتور  $2x + 1$  است. سپس نشان دهید دو فاکتور درجه اول دیگر نیز دارد.

**مثال ۱۳** - اگر باقیمانده تقسیم چند جمله ای  $2x^4 + mx + 2$  بر  $x + 1$  برابر  $2$  باشد، باقیمانده تقسیم آن بر  $x - 1$  را بباید.

**مثال ۱۴** - مقدار  $m$  را چنان بباید که چند جمله ای  $4 + 2x + x^3 - mx^2 - x$  بخش پذیر باشد.

**مثال ۱۵** - در چند جمله ای  $p(x) = x^3 + ax^2 + x + b$  ،  $a$  ،  $b$  را طوری بباید که باقی مانده تقسیم آن بر  $1 - x$  برابر  $4$  بوده و بر  $2 + x$  بخش پذیر باشد.

**مثال ۱۶** -  $m$  و  $n$  را چنان بباید که چند جمله ای  $x^2 - 5x + 6 + mx + n - 3x^3 - x^4$  بخش پذیر باشد.

**مثال ۱۷** - درستی یا نا درستی هر یک را مشخص کنید.

الف) باقی مانده ی تقسیم  $f(x)$  بر  $2x - 3$  برابر  $f\left(\frac{3}{2}\right)$  است.

ب) چند جمله ی  $x^n + y^n$  همواره بر  $x + y$  بخش پذیر است.

## فصل ۳ حد بی نهایت و حد در بی نهایت

پ) چند جمله‌ی  $x^{19} + y^{19}$  همواره بر  $x + y$  بخش پذیر است.

ت) عبارت  $2x^2 - 5x + 2$  بر  $x^2 - 5x + 1$  بخش پذیر است.

ث) چند جمله‌ای  $x^n - a^n$  بر  $x - a$  بخش پذیر است.

ج) چند جمله‌ای  $x^n + a^n$  بر  $x + a$  بخش پذیر است. (فرد است).

ج) باقی مانده‌ی تقسیم  $p(x)$  بر  $a x + b$  برابر است با  $p(-b)$ .

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4}{x^3 + 3x - 10} \quad \text{مثال ۱۸ - مقدار حد را بباید.}$$

$$f(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 9x - 2}{x^3 - 8} \quad \text{مثال ۱۹ - حد تابع را در نقطه } x = 2 \text{ در صورت وجود بباید.}$$

$$g(x) = \frac{2 - \sqrt{3x - 5}}{x - 3} \quad \text{مثال ۲۰ - حد تابع را در نقطه‌ای به طول } 3 \text{ در صورت وجود بباید.}$$

۲۱ - حدود زیر را در صورت وجود بباید. مثال

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^3 - 1} =$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt[3]{x} + 2}{x^3 - 64} =$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - \sqrt{2x}}{\sqrt{5x - 1} - 3} =$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{\sqrt[3]{x} - 1} =$$

۲۲ - حدود زیر را بباید. مثال

$$5) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{5 - |x + 1|}{16 - x^2} =$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{|x| - 3}{|x + 3|} =$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 - 3x + 2|}{\sqrt{x} - 1} =$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3} - \sqrt{x+2}}{|2x^2 - 2x|} =$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^4 - \sqrt{x}}{|1 - \sqrt{x}|} =$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 9^-} \frac{9-x}{3-\sqrt{x}} =$$

مثال ۲۳ - حد های زیر را در صورت وجود بیابید.

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 + 3x^2 - 2x - 2}{2x^2 - x - 1} =$$

$$2) \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{x|x| - 2x}{|x + 2|} =$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^5 - (x-2)^3}{3(x-2)^4 - 2(x-2)^3} =$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^2 + 9x - 5}{2x^2 - 7x + 3} =$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{8x^3 + 1}{|2x + 1|} =$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x^2 - 9} =$$

مثال ۲۴ - حاصل حد های زیر را بیابید.

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 2x + 1}{2x^2 - 3x + 1} =$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} =$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^2 + 3x - 2}{4x^2 - 1} =$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x^3 - 2x^2 - x - 6} =$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2 + x - 2} =$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^3 - 27} =$$

$$\text{۷) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^3 + 3x^2 + x - 1} =$$

$$\text{۸) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{\sqrt{x+12} - x} =$$

$$\text{۹) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-2}}{4-x} =$$

$$\text{۱۰) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x}{3 - \sqrt{x+4}} =$$

$$\text{۱۱) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x}} =$$

$$\text{۱۲) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^2 - 1} =$$

$$\text{۱۳) } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + \sqrt{2x+8}}{x+2} =$$

$$\text{۱۴) } \lim_{x \rightarrow 12} \frac{1 - \sqrt{x}}{12 - \sqrt{5-x}} =$$

$$\text{۱۵) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x^2 - x - 12} =$$

$$\text{۱۶) } \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x+1} - 3}{x^2 - 9x + 8} =$$

$$\text{۱۷) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{\sqrt{5x+4} - 3} =$$

$$\text{۱۸) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{\sqrt{x+3} - 2}}{\sqrt{x+8} - 3} =$$

$$\text{۱۹) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 2\sqrt{x}}{\sqrt{x-3} - 1} =$$

$$۲۰) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} =$$

$$۲۱) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 - \sqrt{x+3}}{x^4 - 1} =$$

 ۲۵- حاصل حد های زیر را بیابید.

$$۱) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x-1}}{x^2 + 2x - 3} =$$

$$۲) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x+2}}{x^2 + 8x} =$$

$$۳) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+2} - 2}{\sqrt{x-2} - 2} =$$

$$۴) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x-1} - 1}{x^2 - 4x - 8} =$$

 ۲۶- حاصل حد های زیر را در صورت وجود بیابید.

$$۱) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{2^2 - \sqrt{2x}} =$$

$$۲) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - \sqrt{x+2}}{\sqrt{4x+1} - 3} =$$

$$۳) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+4} - \sqrt{3x+4}}{\sqrt{x+1} - 1} =$$

$$۴) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4^2}{\sqrt{3} - \sqrt{x+2}} =$$

$$۵) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^2 - 4x - 8}{\sqrt[3]{x-2}} =$$

$$۶) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \sqrt[3]{x+1}}{x^2 - x} =$$

$$۱) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{|x|} =$$

$$۲) \lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{-4x}{|x-4|} =$$

$$۳) \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1-4x}{x^2-4} =$$

$$۴) \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{[x]-2}{2-x} =$$

$$۵) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-\cos x} =$$

$$۶) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x+1}{x-1} =$$

$$۷) \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x^2+1}{3-x} =$$

$$۸) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-5x^2}{x^2-4} =$$

$$۹) \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{3x-1}{x-5} =$$

$$۱۰) \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x^2+x-5}{3-x} =$$

$$۱۱) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x^2-4x+4} =$$

$$۱۲) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x|-1}{|x-2|} =$$

$$۱۳) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-3x^2+3x-1} =$$

$$۱۴) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x^2+4x+5}{x^2+3x^2+3x+1} =$$

$$۱۵) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-5x^2}{x^2-1} =$$

$$۱) \lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{1}{x+4} =$$

$$۲) \lim_{x \rightarrow \frac{-1}{3}} \frac{2x+4}{(3x+1)^2} =$$

$$۳) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin x} =$$

$$۴) \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2-4}{|3-x|} =$$

$$۵) \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{2}{1+\cos x} =$$

$$۶) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-12}{(x+2)^2} =$$

$$۷) \lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{4}{(x-6)^2} =$$

$$۸) \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{-1}{(x-2)^3} =$$

$$۹) \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{x-4}{x-5} =$$

$$۱۰) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2-9}{2-x} =$$

$$۱۱) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{[x]-2}{4x^2-4x+1} =$$

$$۱۲) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x^2-4x+4}} =$$

$$۱) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{1}{\cos x} =$$

## درس اول حد بی نهایت

۳)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x + \sqrt{x}}{x^2 - 16} =$

۴)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{1}{1 - \sin x} =$

۵)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan^2 x =$

۶)  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+2}{2-x} =$

۷)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{5}{(x-2)^3} =$

۸)  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x+2|}{x-2} =$

۹)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{|\cos x| + \frac{1}{2}}{x - \frac{\pi}{2}} =$

۱۰)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{1 + \cos x}{1 - \sin x} =$

۱۱)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x}{x^2 - x - 2} =$

۱۲)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x} =$

۱۳)  $\lim_{x \rightarrow -5^+} \frac{|x-5|}{x+10x+25} =$

۱۴)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{1 + \sin x}{\cos x} =$

۱۵)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x \sin x} =$

۱۶)  $\lim_{x \rightarrow -\pi^-} \frac{\cot x}{1 - \cot x} =$

۷)  $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \cot x =$

۸)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan^2 x =$

۹)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{1-x} =$

۱۰)  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{4x+1}{2x-1} =$

۱۱)  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x+1}{(2-x)^3} =$

۱۲)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan^2 x =$

۱۳)  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x-3}{(x-2)^3} =$

۱۴)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\tan x + \sqrt{3}}{\tan x - \sqrt{3}} =$

۱۵)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{2 + \sin x}{1 - \sin x} =$

۲۹) مثال - حاصل حد های زیر را تعیین کنید.

۱)  $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{2x-5}{x^2 + 2x} =$

۲)  $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2 - 3x}{|x-2|} =$

۳)  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\cos x}{x - \sqrt{x}} =$

۴)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \pi x}{x} =$

۵)  $\lim_{x \rightarrow -\pi^-} \frac{\tan x}{1 - \tan x} =$

دستور ریاضی عالی آنلاین



**مثال ۳۰** - الف) عبارت  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = +\infty$  به چه معناست؟ توضیح دهید.

ب) عبارت  $\lim_{x \rightarrow} f(x) = -\infty$  به چه معناست؟ توضیح دهید.

پ) نمودار تابعی رارسم کنید که در دو شرط الف و ب صدق کند.

**تست ۳۱** - چندجمله ای  $x^3 - 4x^2 + ax + 2$  بر ۲ بخش پذیر است. مقدار  $a$  کدام است؟

۱۳ (۴)

۷ (۳)

-۱۱ (۲)

-۹ (۱)

**تست ۳۲** - چندجمله ای  $x^3 + ax^2 + bx - 6$  بر ۲ بخش پذیر است و باقی مانده تقسیم  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 1$  بر ۱

برابر  $-15$  است. مقدار  $f(-2)$  کدام است؟

-۳۶ (۴)

-۳۰ (۳)

-۲۶ (۲)

-۱۸ (۱)

**تست ۳۳** - چندجمله ای  $2x^3 + ax^2 - 7x - 4x^3 + (x-1)Q(x)$  به صورت  $(x-1)Q(x)$  تجزیه شده است. مقدار  $Q(-1)$  کدام است؟

۳ (۴)

۴ (۳)

-۴ (۲)

-۳ (۱)

**تست ۳۴** - به ازای کدام مقدار  $m$  عبارت  $x^3 + (m-1)x^2 + 2mx + 3$  بر ۱- $2x$  بخش پذیر است؟

-۲/۵ (۴)

-۲/۱ (۳)

-۲/۳ (۲)

-۲/۷ (۱)

**تست ۳۵** - باقی مانده تقسیم عبارت  $2x^3 - 5x^2 - 2x - 3$  بر  $x-2$  کدام است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۲ (۲)

۱) صفر

**تست ۳۶** - باقی مانده تقسیم عبارت  $x^4 - x^3 - x^2 + 2x^2 + 2x$  بر  $x-2$  کدام است؟

-۴x + 4 (۴)

۴x + 4 (۳)

-x + 2 (۲)

x + 2 (۱)

**تست ۳۷** - مقدار خارج قسمت تقسیم عبارت  $x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 2x^2 + x$  بر دو جمله ای  $x-3$  به ازای  $x=3$  کدام است؟

۱۲ (۴)

۹ (۳)

-۱۵ (۲)

-۱۳ (۱)

**تست ۳۸** - چند جمله ای  $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 3x - 10$  بر کدام یک از عبارات زیر بخش پذیر است؟

x + 2 (۴)

x - 2 (۳)

x + 1 (۲)

x - 1 (۱)

۳۹- باقی مانده تقسیم عبارت  $x^6 - 5x^4 + 14$  بر  $x - 2$  کدام است؟

(۴) ۴

(۳) ۲

(۲) صفر

(۱) -۲



۴۰- اگر عبارت  $1 + ax^2 + bx + cx^3 + dx^4$  بر  $x - 4$  بخش پذیر باشد.  $a + b$  کدام است؟


 $\frac{-17}{8}$  (۴)

 $\frac{-15}{8}$  (۳)

 $\frac{-17}{4}$  (۲)

 $\frac{-15}{4}$  (۱)

۴۱- اگر  $x^3 + ax^2 + 2x + 1$  بر  $x - 2$  بخش پذیر باشد، باقیمانده تقسیم  $x^3 + ax^2 + 2bx$  بر  $x + 1$  کدام است؟



(۴) ۴

(۳) ۲

(۲) -۴

(۱) صفر

۴۲- حاصل  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$  کدام است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)



(۴) ۵

(۳) وجود ندارد

(۲) -\infty

(۱) +\infty

۴۳- حاصل  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^5 - 1}$  کدام است؟


 $\frac{2}{3}$  (۴)

 $\frac{4}{3}$  (۳)

 $\frac{5}{3}$  (۲)

 $\frac{3}{5}$  (۱)

۴۴- اگر حد  $\frac{x^3 + 2ax^2 - x - 2a}{ax^2 + x(1-a) - 1}$  وقتی  $x \rightarrow 1$  برابر ۱ باشد،  $a$  کدام است؟



(۴) ۳

 $\frac{1}{3}$  (۳)

 $-\frac{1}{3}$  (۲)

(۱) -۳

۴۵- حاصل  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x^2 - 4}$  کدام است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)


 $\frac{3}{8}$  (۴)

(۳) ۸

 $\frac{1}{16}$  (۲)

(۱) ۱۶

پیش‌نیاز ریاضی عالی آنکارا

## فصل ۳ حد بی نهایت و حد در بی نهایت

تست

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

۴)  $-\frac{1}{3}$ ۳)  $\frac{1}{2}$ ۲)  $\frac{1}{3}$ ۱)  $-\frac{1}{2}$ 

تست

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - 3}{x-1}$$

۴)  $\frac{1}{4}$ ۳)  $\frac{1}{6}$ ۲)  $\frac{1}{8}$ ۱)  $\frac{1}{3}$ 

تست

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{3x-5} - 2}$$

۴)  $-8$ ۳)  $4$ ۲)  $3$ ۱)  $8$ 

تست

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x-1}}$$

۴)  $\frac{1}{3}$ ۳)  $\frac{1}{2}$ ۲)  $1$ ۱)  $2$ 

تست

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 3\sqrt{x} + 1}{x-1}$$

۴)  $\frac{1}{3}$ ۳)  $2$ ۲)  $1$ ۱)  $\frac{1}{2}$ 

تست

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 1}{(x-1)^2}$$

۴)  $\frac{1}{2}$ ۳)  $\frac{1}{4}$ ۲)  $\frac{1}{9}$ ۱)  $\frac{1}{3}$ 

تست

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x})}{(1-x)^2}$$

۴) وجود ندارد


۳)  $\frac{1}{6}$ ۲)  $\frac{1}{3}$ ۱)  $\frac{1}{2}$

تست ۵۳ - اگر  $g(x) = \frac{x^2 + 2x - 9}{x^2 - 4}$  باشد، کدام یک از تساوی های زیر نادرست است؟ (مشابه تمرين کتاب درسی)


$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = +\infty \quad (4) \quad \lim_{x \rightarrow (-2)^+} g(x) = -\infty \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow (-2)^-} g(x) = -\infty \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = -\infty \quad (1)$$

-∞ (4) +∞ (3) 2 (2) 1) حد ندارد

تست ۵۴ - مقدار  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^3 - 8}{(x - 2)^2}$  برابر است با: (مشابه تمرين کتاب درسی)




تست ۵۵ - اگر  $f(x) = \frac{x^3}{x-2}$  باشد، کدام یک از نمودارهای زیر می تواند متعلق به تابع  $f$  باشد؟




تست ۵۶ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\tan x}{\cot x}$  کدام است؟

4 (1) 2 (-∞) 3 (0) صفر

تست ۵۷ - با توجه به حد تابع  $f(x) = 5 - \frac{2}{x^3}$  ، نمودار تابع وقتی  $x \rightarrow +\infty$  و  $x \rightarrow -\infty$  میل می کند، کدام است؟




تست ۵۸ - اگر نمودار  $f$  به شکل مقابل باشد، حاصل  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$  کدام است؟



1 (1) 2 (-∞) 3 (0) صفر

تست



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{[f(x)]}$$

(۴) وجود ندارد

(۳) صفر

۲(۲)

۱(۱)

(۴) وجود ندارد

(۳) صفر

۱(۲)

+∞ ۲(۱)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ باشد، } f(x) = \begin{cases} ۲x & ; x \in \mathbb{Z} \\ ۱ & ; x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

تست

۱(۴)

۱/۲ (۳)

-۱/۲ (۲)

-۱(۱)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{\cos 2x} \text{ کدام است؟ (تجربی خارج ۹۱)}$$

تست

$$\lim_{x \rightarrow ۲^+} \frac{۲ - \sqrt[۳]{x+۶}}{\sqrt{x^۲ - ۴x + ۴}} \text{ کدام است؟ (تجربی خارج ۹۳)}$$

تست

۱/۶ (۴)

۱/۱۲ (۳)

-۱/۱۲ (۲)

-۱/۶ (۱)

$$\lim_{x \rightarrow ۲} \frac{x - \sqrt{۳x-۲}}{ax+b} = \frac{۱}{۲} \text{ باشد، آن گاه } b \text{ کدام است؟ (تجربی خارج ۹۵)}$$

تست

۲(۴)

۱(۳)

-۱(۲)

-۲(۱)

$$\lim_{x \rightarrow ۲^-} \frac{|x^۲ - x - ۲|}{۲x - \sqrt{x^۲ + ۱۲}} \text{ کدام است؟ (ریاضی ۹۰)}$$

تست

۳(۴)

۲(۳)

-۲(۲)

-۳(۱)



۶۵ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(1 + \cos x)}{1 - \cos 2x}$  کدام است؟ (ریاضی ۹۲)

۲) ۴

۱) ۳

۱) ۲

۱) ۴



۶۶ - اگر  $\lim_{x \rightarrow ۳} \frac{x - ۴}{2x^2 + ax + b} = -\infty$  باشد،  $a + b$  کدام است؟ (ریاضی ۹۳)

۱۲) ۴

۶) ۳

۳) ۲

-۳) ۱



۶۷ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow \infty} ([2x] + [-2x]) \frac{1 - \cos^3 x}{1 - \sqrt{1 + x^2}}$  کدام است؟ (نماد [ جزو صحیح است). (ریاضی ۹۴)

۴) حد ندارد

۳) صفر

۳) ۲

-۳) ۱



۶۸ - اگر  $\lim_{x \rightarrow ۱} \frac{\sqrt{ax + b} - ۲}{x^2 - ۱} = \frac{۳}{۲}$  باشد،  $b$  کدام است؟ (ریاضی خارج ۹۵)

۵) ۴

۴) ۳

-۶) ۲

-۸) ۱



۶۹ - حد کسر  $\frac{(x-1)^4 + ۲(x^2-1)}{(x^2-1)^4 + ۳(x-1)}$  وقتی  $x \rightarrow ۱$  کدام است؟

۱) ۴

۱) ۱۶

۴) ۳

۲) ۳



۷۰ - اگر  $\lim_{x \rightarrow ۱} \frac{x^2 + ax + b}{x^3 - x} = -۱$  ، حاصل  $a \times b$  کدام است؟

۱۲) ۴

۶) ۳

-۶) ۲

-۱۲) ۱



۷۱ - اگر  $b \neq ۰$  و  $\lim_{x \rightarrow -۱} \frac{x^2 + ۵x + ۶}{2x^2 + x + a} = b$  مقدار  $b$  کدام است؟


-۱) ۶

-۱) ۷

۱) ۲

۱) ۱






۷۲ - شکل مقابل نمودار تابع  $f(x) = \frac{3x^3 + ax + b}{x - 2}$  کدام است؟

- ۴ (۳)      -۱۲ (۲)      -۱۸ (۱)

۷۳ - شکل مقابل نمودار تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{4x^3 + ax + b}{x - 1}$  کدام است. دو تایی مرتب  $(a, b)$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۷)



۷۴ - قدر مطلق تفاضل حد چپ و راست تابع  $y$  به معادله  $y = \frac{2x^2 - x - 1}{|x - 1|}$  در نقطه  $x = 1$  کدام است؟ (سراسری ریاضی)

- ۶ (۴)      ۴ (۳)      ۳ (۲)      ۲ (۱)

۷۵ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| - [x]}{2|x| + [x]}$  کدام است؟ (سراسری ریاضی)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| - [x]}{2|x| + [x]}$$

- $\frac{1}{2}$  (۳)       $-\frac{1}{2}$  (۲)      -۱ (۱)

۷۶ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x^2 - x + [-x]}{2x^3 + 3x - 5}$  کدام است؟

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x^2 - x + [-x]}{2x^3 + 3x - 5}$$

- $\frac{5}{9}$  (۴)       $\frac{4}{3}$  (۳)       $\frac{3}{4}$  (۲)       $\frac{2}{3}$  (۱)

۷۷ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 2\sqrt{x}}{x^2 - 16}$  کدام است؟

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 2\sqrt{x}}{x^2 - 16}$$

- $\frac{1}{2}$  (۴)       $\frac{1}{4}$  (۳)       $\frac{1}{8}$  (۲)       $\frac{1}{16}$  (۱)

۷۸ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + \sqrt{x + 2}}{x^3 + 1}$  کدام است؟ (سراسری تجربی)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + \sqrt{x + 2}}{x^3 + 1}$$

- ۲ (۴)      -۲ (۳)       $\frac{1}{2}$  (۲)       $-\frac{1}{2}$  (۱)

تست ۷۹ - حد عبارت  $\frac{x + \sqrt{2x + 8}}{x + 2}$  وقتی  $x \rightarrow -2$  برابر کدام است؟ (سراسری تجربی)

 $\frac{3}{2}$  (۴) $\frac{2}{3}$  (۳) $-\frac{2}{3}$  (۲) $-\frac{3}{2}$  (۱)

تست ۸۰ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x + \sqrt{3-x}}{x^2 + x}$  کدام است؟ (سراسری تجربی خارج از کشور ۸۵)

 $\frac{5}{4}$  (۴) $\frac{3}{4}$  (۳) $-\frac{1}{4}$  (۲) $-\frac{7}{4}$  (۱)

تست ۸۱ - اگر  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{ax + 3a}{1 - \sqrt{5x + 16}}$  وقتی  $x \rightarrow -3$  ، آن گاه  $a$  کدام است؟ (سراسری تجربی)

 $-5$  (۴) $-3$  (۳) $3$  (۲) $5$  (۱)

تست ۸۲ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow -12} \frac{1 - \sqrt{x}}{\sqrt{5} - x}$  کدام است؟ (سراسری تجربی خارج از کشور ۸۸)

 $4$  (۴) $2$  (۳) $-2$  (۲) $-4$  (۱)

تست ۸۳ - حد تابع با ضابطه  $y = \frac{x + \sqrt{2-x}}{\sqrt{-4x+1}-3}$  وقتی  $x \rightarrow -2$  چقدر است؟ (سراسری ریاضی)

 $-\frac{9}{8}$  (۴) $\frac{9}{8}$  (۳) $\frac{3}{4}$  (۲) $-\frac{3}{4}$  (۱)

تست ۸۴ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow -12} \frac{2x^2 + 5x + 3}{\sqrt{2 + \sqrt{3-x}}}$  کدام است؟ (سراسری تجربی خارج از کشور ۹۷)

 $24$  (۴) $16$  (۳) $12$  (۲) $8$  (۱)

تست ۸۵ - حاصل  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 10x - 8}{\sqrt{3 - \sqrt{x}} - 1}$  کدام است؟ (سراسری تجربی خارج از کشور ۹۷)

 $-72$  (۴) $-84$  (۳) $-96$  (۲) $-112$  (۱)

تست

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos^3 x}{1 - \cos x}$$

کدام است؟

-۳ (۴)

-۲ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

تست

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^-} \frac{1 - \sin 2x}{(1 - \tan x)^2}$$

کدام است؟ (سراسری ریاضی خارج از کشور)

∞ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

 $\frac{1}{2}$  (۱)

تست

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{3\pi}{4})^-} \frac{1 + \cot x}{1 + \tan x}$$

کدام است؟ (سراسری تجربی)

+∞ (۴)

۱ (۳)

۲) صفر

-۱ (۱)

تست

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{\sin^2 x}$$

کدام است؟ (سراسری تجربی خارج از کشور)

 $\frac{1}{4}$  (۴) $\frac{1}{2}$  (۳)

۲ (۲)

∞ (۱)

تست

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}^-} \frac{\cos 2x}{\sin x + \cos x}$$

کدام است؟

 $2\sqrt{2}$  (۴) $\sqrt{2}$  (۳) $-\sqrt{2}$  (۲) $-2\sqrt{2}$  (۱)

تست

$$\lim_{x \rightarrow \infty^-} \frac{x + 2}{x^3 - x}$$

کدام است؟

-∞ (۴)

+∞ (۳)

-۱ (۲)

(۱) صفر

تست

**تست ۹۲ - حد وقتی  $x \rightarrow 1^-$  کدام است؟ (سراسری ریاضی)**

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x}{x-1}$$

(۱) ۴

+∞ (۳)

-1 (۲)

-∞ (۱)

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} \frac{4x}{(x+2)^3} = -\infty \quad (۲)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{4x}{4-x^2} = -\infty \quad (۴)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x-5}{|x-1|} = +\infty \quad (۱)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-x}{x^2-3x+2} = +\infty \quad (۳)$$

**تست ۹۴ - حاصل کدام یک از حد های زیر درست محاسبه شده است؟**




$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^-} \frac{[x]}{|2x+1|} \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{[x]-1}{x^2-3x}$$

+∞, -∞ (۴)


-∞, +∞ (۳)

-∞, -∞ (۲)





+∞, +∞ (۱)



**تست ۹۵ - نمودار تابع  $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} & x > 0 \\ 2x+1 & x < 0 \end{cases}$  به کدام صورت است؟**



**تست ۹۶ - نمودار تابع  $f(x) = \frac{1}{x-|x|}$  چگونه است؟**



**تست ۹۷ - نمودار تابع  $y = \frac{x+1}{x^3+x}$  به کدام صورت است؟**

پیش‌نیاز ریاضی عالی آنکارا



۹۸ - کدام یک از گزینه های زیر نادرست می باشد؟ (مشابه کتاب درسی)

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1}{\sin x} = +\infty \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^+} \frac{1}{\cos x} = +\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \cot x = -\infty \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan x = +\infty \quad (3)$$

۹۹ - مقادیر  $a$  و  $b$  برای ان که داشته باشیم  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x^2 - ax + b} = +\infty$  کدام است؟

$-a = b = -4$  (4)

$a = b = 4$  (3)

$a = b = -2$  (2)

$a = -b = 2$  (1)

۱۰۰ - اگر  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-4}{2x^2 + ax + b} = -\infty$  باشد، کدام است؟ (سراسری ریاضی ۹۳)

۱۲ (4)

۶ (3)

-۳ (2)

۳ (1)

۱۰۱ - حد کسر  $\frac{x^3 + x - 2}{\sqrt[3]{x-1}}$  وقتی  $x \rightarrow 1$  کدام است؟

$\frac{2}{3}$  (4)

$\frac{4}{3}$  (3)

۱۲ (2)

۴ (1)

۱۰۲ - درباره مجموعه جواب نامعادله  $| \frac{2x+1}{x-1} | < 1$  کدام عبارت نادرست است؟

۲) همسایگی چپ عدد صفر است.

۴) همسایگی عدد ۱ است.

۱) همسایگی مذوف عدد ۱ است.

۳) همسایگی راست عدد ۲ است.

۱۰۳ - حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[x]}{x}$  کدام است؟

۱ (4)

$-\infty$  (3)

$+\infty$  (2)

۱) صفر

۱۰۴ - حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow \frac{-1}{2}} \frac{[x]-3}{| 2x-1 |}$  کدام است؟

$-\infty$  (4)

$+\infty$  (3)

۱ (2)

۱) صفر

۱۰۵ - حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{| x |} \times \frac{x+1}{\sin^2 x}$  کدام است؟

$-\infty$  (4)

$+\infty$  (3)

-۱ (2)

۱ (1)

**تست ۱۰۶** - حاصل حد های  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2 - 3x}$  و  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - 2x + 1}$  به ترتیب کدام است؟

(۱)  $+\infty$  و  $+\infty$  (۲)  $-\infty$  و  $-\infty$  (۳)  $-\infty$  و  $+\infty$  (۴)  $-\infty$  و  $-\infty$

**تست ۱۰۷** - حاصل حد های  $\lim_{x \rightarrow (\pi)^+} \cot x$  و  $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \tan x$  به ترتیب کدام است؟

(۱)  $+\infty$  و  $+\infty$  (۲)  $+\infty$  و  $-\infty$  (۳)  $-\infty$  و  $-\infty$  (۴)  $-\infty$  و  $-\infty$

**تست ۱۰۸** - حاصل کدام حد  $\infty$  نیست؟

(۱)  $\lim_{x \rightarrow (\frac{7\pi}{2})^+} \cot x$  (۲)  $\lim_{x \rightarrow (-\frac{9\pi}{2})^-} \tan x$  (۳)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\cot x}$  (۴)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 - \sin x}$

(۱)  $-\infty$  (۲)  $-\infty$  (۳)  $-\infty$  (۴)  $-\infty$

**تست ۱۰۹** - حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\sin x}{1 + \cos x}$  کدام است؟

(۱)  $+\infty$  (۲)  $-\infty$  (۳)  $1$  (۴)  $-1$

**تست ۱۱۰** - حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 2}$  کدام است؟

(۱)  $+\infty$  (۲)  $-\infty$  (۳)  $1$  (۴)  $0$

# مرکز مشاوره تحصیلی

**تست ۱۱۱** - حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x-1}}{(1-x)^2(x^2-5x+2)}$  کدام است؟

(۱)  $+\infty$  (۲)  $-\infty$  (۳)  $\frac{1}{3}$  (۴)  $-\frac{1}{3}$

**تست ۱۱۲** - حاصل حد راست تابع  $f(x) = \frac{[x]-3}{x|x|-9}$  در  $x=3$  کدام است؟

(۱)  $\frac{1}{6}$  (۲)  $-\frac{1}{6}$  (۳)  $+\infty$  (۴) صفر

دیدگاه ریاضی عالی آنکارا

۱۱۳- چند تا از تساوی های زیر درست است؟

$$\lim_{\rightarrow} \frac{[\sin]}{[x]}$$


$$\lim_{x \rightarrow \infty^-} \frac{x}{[x]} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{|x|} = +\infty$$

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰) صفر



۱۱۴- نمودار کدام یک از توابع زیر در  $x = 0$ , شبیه شکل مقابل است؟





$$y = \frac{x-1}{x} \quad (۲)$$

$$y = \frac{1}{x} \quad (۰)$$


$$y = \frac{-1}{\sqrt{x}} \quad (۴)$$

$$y = \frac{1}{x^2} \quad (۳)$$

۱۱۵- نمودار تابع  $f(x) = \frac{x+3}{x^2 - 4x + 4}$  در کنار خط  $x = ۲$  چگونه است؟



۱۱۶- شکل رو به رو نمودار تابع  $f(x) = \frac{ax+2}{x^2+b}$  کدام است.  $f(4) = ۰$  است.



$$-\frac{1}{4} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{8} \quad (۴)$$

$$-\frac{1}{8} \quad (۰)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۳)$$

۱۱۷- در تابع  $f(x) = \frac{2x}{x^2 + ax + b}$ ، مقدار  $f(2) = +\infty$  است. اگر  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ ،

$$\frac{4}{9} \quad (۴)$$

$$\frac{4}{3} \quad (۳)$$

$$2 \quad (۲)$$

$$4 \quad (۱)$$

۱۱۸- حاصل حد های  $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{[x]}{|2x+1|}$  و  $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{[x]-1}{x^2 - 3x}$  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$$-\infty \quad (-\infty) \quad (۴)$$

$$+\infty \quad (+\infty) \quad (۳)$$

$$+\infty \quad (-\infty) \quad (۲)$$

$$-\infty \quad (+\infty) \quad (۱)$$

- ۱۱۹- در صورتی که  $\lim_{x \rightarrow 11^-} f(x - 7) = \lim_{x \rightarrow 11^+} f(x + 2)$  کدام است؟
- ۲ (۴)                     (۳)                     (۲)                     (+∞)                     (-∞)

دستور ریاضی عالی آنکارا

# مرکز مشاوره تحصیلی

# علیرضا افشار

دیپلم ریاضی عارل آنکردی

# مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار

## سوالات فصل سوم ریاضی ۳ تجربی

## درس دوم

## حد در بی‌نهایت

## سوالات تشریحی و تستی درس دوم

۱- حاصل هر یک از حد های زیر را بیابید.



۱)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^3$

۲)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^4$

۳)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x^3}{-2x^2}$

۴)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2\sqrt{x}$

۵)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2[x]$

۶)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} -5|x|$

۷)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 3 + 5x^3$

۸)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 + 4x^2 - 5x - 9$

۹)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+2}{x-1}$

۱۰)  $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1-5t^2}{t^2 + 3t}$

۱۱)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 - 4x + 1}{3x^2 + 5x - 6}$

۱۲)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - x^3 + 1}{2x^3 + 5}$

۱۳)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-7x^3 - 4x + 1}{3x^2 + 5x + 36}$

۱۴)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[ \frac{-4x^5 - 2x}{3x^4 - 4x + 8} \right]$

۱۵)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2 - 3x}$

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذربایجانی

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{x(2x+1)^2} =$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^3 - (x-1)^3}{(x+1)^3 + (x-1)^3} =$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-5x^4 + 3x^2 - 1}{x(x-2)} =$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(x+1)^4 (2x-1)^3}{(x-1)^3 (2x+1)^4} =$$

$$5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x^4 + 3x^2 - 1}{(x^3 + 1)(2x+5)} =$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 - 5)(x^2 + 5)}{x^3 + 2x^5 - 4} =$$

مثال ۳ - حد های زیر را بدست آورید.

$$\text{الف) } \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^2 + 4x^3 + 5x - 1 =$$

$$\text{ب) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 4 - \sqrt{x^2}}{-2x - 4} =$$

$$\text{مثال ۴ - اگر } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(1+a)x^3 + 2x - 1}{4x^2 + bx^n - 1} = 2 \text{ باشد، آن گاه بین } a \text{ و } b \text{ چه رابطه ای وجود دارد؟}$$

$$\text{مثال ۵ - اگر } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{mx^4 + 1}{2x^n + x^2 + 1} =$$

باشد، مقدار  $m$  و  $n$  را تعیین کنید.

**مثال ۶-** اگر  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^2 + 3x}{bx^3 - 4x^2 + 1} = 2$  باشد، آن گاه مقادیر  $a$  و  $b$  را به دست آورید.

**مثال ۷-** اگر  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^3 - 3x}{3x^m + 5x + 2} = \frac{1}{6}$  باشد، مقادیر  $m$  و  $a$  را بیابید.

**مثال ۸-** حاصل عبارت های زیر را بیابید.

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 - 1)(x + 2x^2)}{(2 - x^2)(3x + x^2)} =$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2 - 3x)(1 + 5x)}{3x^2 + 2x - 3} =$$

**مثال ۹-** مقدار  $a$  و  $b$  را طوری بیابید که  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^3 + x^2 + 1}{6x^b - x} = -\frac{2}{3}$  باشد.

**مثال ۱۰-** اگر  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^n - 3x + 4}{mx^2(1 - 4x)} = \frac{1}{3}$  باشد، مقدار  $m$  و  $n$  را بیابید.

**مثال ۱۱-** مقدار  $a$  و  $b$  را چنان بیابید که حد تابع زیر برابر ۵ باشد.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2a - 1)x^5 - 3(x - 1) + 4x^3}{7x^4 - 2(3 - b)x^3 - 7x} = 5$$

**مثال ۱۲-** اگر  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^4 + 1}{2x^b + x^2 + 1} = 2$  مقدار  $a + b$  چقدر است؟

$$1) \lim_{x \rightarrow -\infty} 7 - \frac{6}{x^2} =$$


$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^5 - 4x^3 + 9}{8} =$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x + 6}{7} =$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 + \frac{1}{x^3}}{\frac{3}{x} - 1} =$$


۱۴- ۱) هر یک از رابطه های  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$  به چه معناست؟ توضیح دهید.

۲) نمودار تابعی مانند  $f$  را رسم کنید که هر دو ویژگی الف را داشته باشد؟




۱۵- اگر نمودار تابع  $f$  به شکل مقابل باشد، آنگاه  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2 \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  کدام است؟

- (۱) ۵  
(۲) ۳  
(۳) ۴  
(۴) ۲



۱۶- اگر نمودار تابع  $f$  به شکل زیر باشد، آنگاه  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{|x|} f(x)$  کدام است؟


- (۱) ۵  
(۲) ۳  
(۳) ۲  
(۴) وجود ندارد



۱۷- اگر نمودار تابع  $f$  به شکل زیر باشد، آنگاه  $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)|$  کدام است؟

- (۱) ۱  
(۲) -1  
(۳) +infinity  
(۴) ۰

۱۸- اگر دامنه تابع  $f$  با نمودار زیر برابر  $\{1\} - \mathbb{R}$ ، باشد، حاصل کدام حد نادرست است؟



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \circ \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \quad (3)$$

-۱۵ (۴)

۱۵ (۳)

-۱ (۲)

۱ (۱)

۱۹- حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+2}{x-1} \times \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1-5t^3}{t^3+3t}$  کدام است؟

تست

-۸ (۴)

+\infty (۳)

-۳ (۲)

۳ (۱)

۲۰- حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 9 + \frac{7}{x^3} \right)$  چند برابر حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-6x^3 + 7x - 9}{2x^3 - 4x^2 + x}$  است؟

تست

۲۱- حاصل حد عبارت  $\frac{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}}{\frac{4}{x} - 5}$  وقتی  $x \rightarrow +\infty$  کدام است؟

تست

۱/۴ (۴)

-۳/۵ (۳)

-\infty (۲)

+\infty (۱)

۲۲- اگر  $a$  کدام است،  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a-1)(x+1)}{(4-a)(x-2)} = \frac{1}{2}$

تست

۲ (۴)

۱/۲ (۳)

۰ صفر (۲)

-۲ (۱)

۲۳- حد کسر  $\frac{x^k + x^3 + 1}{x^5 + 3x^2 + 1}$  اگر  $x \rightarrow +\infty$  برابر است با:

تست

۱/۲ (۴) فقط ۱ و

۰ فقط (۳)

۰ و ۱ و \infty (۲)

۱ فقط (۱)

پیش‌نیازی علم آنکه‌رو

تست

۲۴- حد کسر وقتی  $x \rightarrow +\infty$  برابر  $\frac{1}{2}$  است.  $n$  کدام است؟

 $n = 2$  (۴) $n = 1$  (۳) $n < 2$  (۲) $n > 2$  (۱)

تست

۲۵- حاصل  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(2x^2 + 3)^2 (3x^2 + 2)^3}{(2x^2 - 1)^5}$  کدام است؟

 $\frac{9}{8}$  (۴) $\frac{27}{8}$  (۳) $\frac{27}{4}$  (۲) $\frac{9}{4}$  (۱)

تست

۲۶- اگر  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(m-1)(x+1)}{(4-m)(x-2)} = \frac{1}{2}$  باشد، مقدار  $m$  کدام است؟

 $-2$  (۴) $-1$  (۳) $2$  (۲) $1$  (۱)

تست

۲۷- اگر  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(m-n)x^3 + x^2 - 1}{3x^n + x}$  باشد، مقدار  $m+n$  کدام است؟

 $9$  (۴) $8$  (۳) $7$  (۲) $6$  (۱)

تست

۲۸- اگر  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 4x - 1}{(m-1)x^4 + nx^3 - 2} = 4$  باشد، حاصل  $m+n$  کدام است؟

 $-\frac{3}{2}$  (۴) $\frac{3}{2}$  (۳) $-\frac{2}{3}$  (۲) $\frac{2}{3}$  (۱)

تست

۲۹- اگر  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{mx^3 + nx^2 + 4}{(m+2)x^2 + x - 1}$  برابر ۱ باشد،  $m + n$  کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

تست

۳۰- حد کسر  $\frac{x^{m+3} + nx + m}{mx^{n-2} - mx + n - 1}$  با شرط  $n > 3$  وقتی  $x \rightarrow +\infty$  برابر ۲ است.  $m + n$  کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

تست

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

تست

۳۱- اگر حاصل  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^n + 2x + 3}{3x^2 - 5x + 1}$  برابر ۲ باشد،  $a + n$  کدام است؟

کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

تست

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

تست

۳۲- حاصل  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + (x+1)^4 + (x+2)^4}{x(2x-1)^3}$  کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱) صفر

تست

۳۳- در تابع  $f(x) = \frac{ax^m - 3x + 2}{3x - 5x^3 + x^2}$  اگر  $f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{2}{5}$  باشد،  $f(-1)$  کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

تست

۳۴- در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{ax^n - 3x + 1}{3x^2 + x}$  اگر  $f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{2}{3}$  باشد،  $f(-1)$  کدام است؟

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)

تست

پیش‌نیازی علم آنکه‌رو

# مرکز مشاوره تحصیلی

## علیرضا افشار

تست ۳۵ - آن گاه حد راست این عبارت در نقطه  $x = -2$  کدام است؟

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x^2 - 4|}{ax^2 - x + 2}$$

$\frac{4}{3}$  (۴)

$\frac{2}{3}$  (۳)

$-\frac{2}{3}$  (۲)

$-\frac{4}{3}$  (۱)

تست ۳۶ - آن گاه حد دامنه این عبارت کدام است؟


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x - \sqrt{2x+1}}{x + \sqrt{x+2}}$$

$\sqrt{2}$  (۴)

۴ (۳)

۲ (۲)

۰ صفر



تست ۳۷ - چند تا از عبارت های زیر درباره تابع  $f$  درست است؟

ب)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$

الف)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

ت)  $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$

پ)  $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty$


۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ صفر

تست ۳۸ - شکل مقابل نمودار کدام تابع  $f$  است، کدام گزینه نادرست است؟




$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$  (۱)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  (۲)

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$  (۳)

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$  (۴)

تست ۳۹ - با توجه به نمودار نمودار تابع  $f$ ، کدام مورد نادرست است؟



$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] = 0$  (۱)

$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x)] = 1$  (۲)

$\lim_{x \rightarrow 0^-} [f(x)] = 0$  (۳)

$\lim_{x \rightarrow 0^+} [f(x)] = 0$  (۴)

**تست ۴۰** - وضعیت تابع  $f(x) = \frac{3x+a}{x^2-2ax+2a+3}$  در اطراف جایی که حدش بی نهایت می شود، در شکل مقابل نمایش داده شده است. کدام است؟ 


$a = 3$  (۲)

$a = -1$  (۱)

۴) مقداری برای وجود ندارد.

$a = 3$  یا  $a = -1$  (۳)

**تست ۴۱** - با توجه به نمودار  $f$ ، حاصل  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{f(x)}$  کدام است؟



(۱)

$+\infty$  (۲)

$-\infty$  (۳)

۴) صفر

**تست ۴۲** - حد تابع  $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x} - \sqrt{x^2 + 9}$  وقتی  $x \rightarrow +\infty$  کدام است؟


۶) ۶ (۴)

۳) ۳ (۳)

$\frac{3}{2}$  (۲)

۱) صفر

**تست ۴۳** - شکل مقابل نمودار تابع  $f$  است. کدام گزینه نادرست است؟



$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(f(x)) = 1$  (۱)

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(f(x)) = 1$  (۲)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] = 1$  (۳)

$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x)] = 1$  (۴)

**تست ۴۴** - حد عبارت  $\frac{x^2 + 10x + 16}{12 + 6\sqrt[3]{x}}$  وقتی  $x \rightarrow -\infty$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۹۸)

-۶ (۴)

-۱۲ (۳)

-۱۸ (۲)

-۲۴ (۱)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذربایجان

تست

۴۵- در مورد تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + |x|}$  کدام بیان، درست است؟ (سراسری تجربی ۹۸)

$$\lim_{x \rightarrow \infty^-} f(x) = -\infty \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty^-} f(x) = +\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty^+} f(x) = -\infty \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty^+} f(x) = +\infty \quad (3)$$

تست

۴۶- در مورد تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{\sin x}{1 + 2 \cos x}$  کدام بیان، درست است؟ (سراسری تجربی خ ۹۸)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{2\pi}{3}^+} f(x) = +\infty \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{2\pi}{3}^+} f(x) = -\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{4\pi}{3}} f(x) = +\infty \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{4\pi}{3}^-} f(x) = -\infty \quad (3)$$

تست

۴۷- در تابع با ضابطه  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \text{ اشد آنگاه } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{5}{2}$  اگر  $f(x) = \frac{ax + \sqrt{4x^2 + 5}}{2x + 2}$  دام گزینه

است؟ (ت ۹۵)

$$\frac{5}{6} \quad (4)$$

$$\frac{5}{4} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} \quad (1)$$

تست

۴۸- در تابع با ضابطه  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \text{ اشد آنگاه } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$  اگر  $f(x) = \frac{ax^n + 15}{3x - \sqrt{4x^2 + 15x}}$  کدام گزینه

است؟ (سراسری تجربی ۹۴)

$$5 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$-4 \quad (2)$$

$$-6 \quad (1)$$

تست

۴۹- در تابع با ضابطه  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \text{ اشد آنگاه } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\frac{1}{2}$  اگر  $f(x) = \frac{2x + \sqrt{x^2 - 3x}}{ax^n - 6}$  کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (4)$$

$$\frac{1}{4} \quad (3)$$

$$-\frac{1}{8} \quad (2)$$

$$-\frac{1}{6} \quad (1)$$

**تست ۵۰**- اگر  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2x + \sqrt{4x^2 + x}$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۹۸)

۴) صفر

 $-\frac{1}{4}$  (۳) $-\frac{1}{2}$  (۲)

-۱ (۱)

**تست ۵۱**- اگر  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = x - \sqrt{4x^2 + x}$  کدام است؟ (سراسری تجربی خ ۹۸)

۳ (۴)

۲ (۳)

-۱ (۲)

-۲ (۱)

**تست ۵۲**- اگر  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + 9}{1 - x + \sqrt{x+1}} = 3$  دام است؟ (سراسری تجربی ۹۲)

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

**تست ۵۳**- نمودار تابع با ضابطه  $y = \frac{ax + 1 + \sqrt{4x^2 + 9}}{3x - 2}$  را بر کدام یک از گذرد (۲, ۱) ز نقطه‌ی  $f(x)$  را برابر کند؟ (سراسری تجربی ۹۱)

اعداد زیر است؟ (سراسری تجربی ۹۱)

۱ (۴)

 $\frac{2}{3}$  (۳) $\frac{1}{3}$  (۲) $-\frac{1}{3}$  (۱)

**تست ۵۴**- در تابع با ضابطه  $y = \frac{ax^n - 3x + 1}{3x^2 + x}$  آنگاه  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2}{3}$  دام است؟ (تجربی ۹۱)

۲ (۴)

۳ (۳)

 $\frac{3}{2}$  (۲)

-۲ (۱)

**تست ۵۵**- اگر  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \sqrt{x^2 - 2x + 3} - ax - b \right) = 0$  کدام است؟

۴) صفر

 $\pm 3$  (۳) $\pm 2$  (۲) $\pm 1$  (۱)

۵۶- در تابع با ضابطه  $y$  کدام  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  باشد، آن گاه است؟

(۴)  $\frac{3}{2}$ (۳)  $\frac{3}{4}$ (۲)  $\frac{2}{3}$ (۱)  $\frac{1}{3}$



عنوان

## جزوه آموزشی مشتق

نگارش

عادل آخکندی

مرکز مشاوره تحصیلی

علیرضا افشار

دبير رياضي : عادل آخکندی



## صفحه

## فهرست

۱.....	اشنایی با مفهوم مشتق (تعبیر هندسی)
۳.....	۱. تست های قوانین مشتق
۱۲.....	۱.۱. ساده کردن، سپس مشتق گیری
۱۴.....	۲.۱. عامل صفر کننده در مشتق
۱۶.....	۱.۲.۱. مشتق مرتبه دوم
۱۷.....	۳.۱. ارتباط مشتق پذیری و پیوستگی
۱۷.....	۱.۳.۱. مشتق پذیری روی بازه
۴۴.....	۲.۳.۱. بررسی برخی حدود به کمک قاعده هوبیتال
۴۸.....	۲ فصل دوم
۴۸.....	۱.۲ آهنگ تغییرات
۴۸.....	۱.۱.۲ آهنگ تغییرات و مشتق توابع
۵۹.....	۳ معادله خط مماس و قائم
۵۹.....	۱.۳ خط مماس و قائم بر منحنی از نقطه ای روی منحنی

# مرکز مشاوره تحصیلی

# علیرضا افشار

دیبر ریاضی : عادل آخوندی



ب

# مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار

دیبر ریاضی : عادل آخوندی



ث

## جزوه آموزشی مشتق

درس اول : مفاهیم مشتق















مفاهیم مشتق

درس اول

## اشنایی با مفهوم مشتق (تعبیر هندسی)

سوال ۱: در هر یک از نمودارهای زیر خط مماس بر منحنی در نقطه داده شده را در صورت وجود رسم کنید.



دییر ریاضی : عادل آخوندی




## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

**سوال ۲ :** در شکل زیر کدام یک از گزاره ها درست است؟

- ب ) در دو نقطه مشتق صفر است.  
الف) شیب مماس در ۱ - عددی منفی است.

- ت ) در نقاطی از نمودار شیب مماس ها برابر است.  
پ ) در  $x = 5$  هم مقدار تابع و هم مشتق منفی است.




- ث ) در نقطه ای به طول ۴، مقادیر  $f$  و  $f'$  هم علامت نیستند.

- ج ) شیب مماس در ۱ - بیشتر از شیب مماس در ۱ + است.

- چ ) کم ترین شیب مماس بین ۴ و ۵ است.

**تست ۱ :** در شکل مقابل، به ترتیب کدام نقاط دارای بیشترین و کم ترین شیب خط مماس هستند؟




- الف )  $C - D$  ( ب )  $C - F$

- ( ج )  $F - D$  ( د )  $F - E$

**تست ۲ :** برای نمودار در شکل مقابل، در موارد داده شده، کوچک ترین و بزرگ ترین کدام است؟

- الف ) شیب نمودار در نقطه A  
ب ) شیب نمودار در نقطه B  
پ ) شیب خط AB




- الف ) پ-الف

- ( ج ) ب-پ ( د ) پ-ت

**تست ۳ :** نقاط A, B, C, D, E, F را روی منحنی رو به رو در نظر می گیریم. در مورد شیب منحنی در این نقاط، چند عبارت درست است؟

- الف ) شیب منحنی در همه نقاط مثبت است.  
ب )  $m_A < m_B < m_C$  ( پ )  $m_A < m_B$



- ت ) شیب منحنی در نقاط C و D و منفی است.  
ث )  $m_F < m_D < m_C$

- ج )  $m_C < m_D < m_F < m_E < m_B < m_A$  ( ب ) ۲

۴

۳

۱


دیبر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۴: برای تابع  $F$  در شکل رو به رو داریم :  $f(4) = 25, f'(4) = 1/5$  با توجه به شکل، مختصات نقطه  $B$  کدام است؟



الف )  $(5, 4/5)$

ب )  $(5, 5/5)$

ج )  $(5, 26/5)$


تست ۵: شیب وتری که دو نقطه به طول های ۱ و  $x$  از تابع  $y = f(x)$  را به هم وصل می کند برابر  $4 - x + 2x^2$  است. شیب خط مماس بر منحنی در نقطه  $x = 1$  کدام است؟

۳ ) د

۴ ) ج

۵ ) ب

الف ) ۶



تست ۶: در شکل زیر عرض از مبدأ خط مماس بر منحنی در نقطه  $A$  کدام است؟

۵ ) د

۶ ) ج

۷ ) ب

الف ) ۲

## ۱.۱ تست های قوانین مشتق

تست ۷: مقدار مشتق تابع  $f(x) = x^4 + 3x^3$  به ازای  $x = 1$  کدام است؟

۱۰ ) د

۹ ) ج

۷ ) ب

الف ) ۳

تست ۸: اگر  $f(x) = x^{-1} + x^{-2}$  باشد،  $\frac{1}{3} f'$  برابر کدام است؟

-۲۰ ) د

-۱۲ ) ج

-۱۶ ) ب

الف ) -۴

دییر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی مشتق

درس اول : مفاهیم مختصر

 تست ۹: اگر  $f(x) = x^{-\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}} + \sqrt{x}$  باشد،  $(f')$  برابر کدام است؟

د)  $\frac{-3}{2}$

ج)  $\frac{1}{2}$

ب)  $\frac{5}{2}$

الف) ۳

 تست ۱۰: مقدار مشتق تابع  $f(x) = \frac{x^{\frac{2}{3}}}{2} + \sqrt[3]{x}$  به ازای  $x = 2\sqrt{2}$  کدام است؟

د)  $\frac{17}{6}$

ج)  $\frac{17}{2}$

ب)  $\frac{25}{3}$

الف)  $\frac{49}{6}$  تست ۱۱: اگر  $f(2) = 6$  و  $f'(2) = 2$  و آنگاه  $(f \cdot g)'(2) = -g'(2)$  کدام است؟

د) -۱۸

ج) ۱۸

ب) ۹

الف) -۹

 تست ۱۲: اگر  $\left(\frac{f}{g}\right)'(2) = \frac{5}{8}$  و  $g'(2) = 5$  و آنگاه  $f'(2) = -4f(2) = 8$  کدام است؟

د)  $\frac{8}{5}$

ج)  $\frac{5}{8}$

ب)  $\frac{7}{8}$

الف)  $\frac{8}{7}$  تست ۱۳: اگر  $f$  تابعی پیوسته باشد، آنگاه  $\left(\frac{1}{f}\right)'(1) = 2f(1)$  کدام است؟

د) -۲

ج)  $-\frac{1}{2}$

ب)  $\frac{1}{2}$

الف) ۲

دییر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۱۴: مشتق تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{(2x-1)^3}{2x^2}$  کدام است؟

د)  $\frac{2x+1}{2x^3}$

ج)  $\frac{2x+1}{x^3}$

ب)  $\frac{2x-1}{x^3}$

الف)  $\frac{2x-1}{2x^3}$

تست ۱۵: اگر  $f(x) = \sqrt{3x+1}(2x-4)^3$  مقدار  $f'(0)$  کدام است؟

د) ۰

ج) ۱۸۴

ب) ۱۳۶

الف) ۱۱۸

تست ۱۶: اگر  $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x}$  مقدار  $f'(1)$  کدام است؟

د)  $\frac{1}{2}$

ج)  $\frac{5}{4}$

ب)  $\frac{1}{4}$

الف) ۱

تست ۱۷: مشتق عبارت  $\left(\frac{16}{x} - \sqrt[3]{x^2}\right)^2$  به ازای  $x = -8$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۸)

د) ۲

ج)  $-\frac{1}{2}$

ب) ۱

الف) -۱

تست ۱۸: اگر  $f(x) = \sqrt{1+\sqrt{x}}$  مقدار  $f'(\frac{1}{4})$  کدام است؟

د)  $\frac{\sqrt{6}}{12}$

ج)  $\frac{\sqrt{6}}{6}$

ب)  $\frac{\sqrt{2}}{6}$

الف)  $\frac{\sqrt{3}}{6}$

## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۹: مقدار مشتق تابع  $y = (\frac{3}{x} - x^2)^3$  به ازای  $x = 1$  کدام است؟

- الف) ۱۲      ب) -۱۲      ج) ۶۰      د) -۶۰

تست ۲۰: مشتق تابع  $y = \frac{f(x)}{g(x)}$  در نقطه  $x = 1$  برابر ۳ است . اگر  $f(1) = -4$  و  $f'(1) = 1$  و  $g(1) = g'(1) = 0$  موجود باشد مقدار  $g(1)$  کدام است ؟ (سراسری تجربی ۸۱)

- الف)  $-\frac{4}{3}$       ب)  $-\frac{3}{4}$       ج)  $\frac{3}{4}$       د)  $\frac{4}{3}$

تست ۲۱: اگر  $f(x) = \sqrt{\frac{3x-1}{2x+1}}$  آنگاه  $f'(2)$  کدام است ؟ (سراسری تجربی ۸۱)

- الف) ۰/۲      ب) -۰/۱      ج) ۰/۱      د) ۰/۲

تست ۲۲: تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = x^{\frac{m}{n}}$  مفروض است . اگر مشتق سوم این تابع در صفر موجود باشد ، کدام رابطه بین دو عدد مثبت  $m$  و  $n$  برقرار است ؟ (سراسری تجربی ۸۱)

- الف)  $n > 3m$       ب)  $m > 3n$       ج)  $m > n + 3$       د)  $n > m + 3$

تست ۲۳: اگر  $f$  تابعی درجه دوم و مختصات رأس آن  $(-1, 2)$  باشد، آنگاه  $f'(-4)$  کدام است؟

- الف) -۴      ب) -۲      ج) ۴      د) ۱

دیبر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی مشتق

درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۲۴: اگر  $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$  کدام است؟

- الف )  $\frac{19}{2}$       ج )  $\frac{-15}{4}$       ب )  $\frac{15}{4}$       د )  $\frac{1}{2}$

تست ۲۵: اگر  $f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^4 + x^2 + 3}$  آنگاه حاصل  $f'(-2) + f'(2)$  کدام است؟

- الف )  $\frac{1}{5}$       ج )  $\frac{9}{20}$       ب )  $\frac{1}{12}$

تست ۲۶: اگر  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  در  $x=2$  مقدار مشتق  $f'(2)$  کدام است؟

- الف )  $\frac{1}{3}$       ب )  $\frac{2}{3}$       ج ) وجود ندارد      د )  $\frac{1}{2}$

تست ۲۷: در صورتی که  $f(x) = \sqrt{2x+a}$  باشد و  $f'(4)=\frac{1}{3}$  آنگاه  $f(12)$  کدام است؟

- الف )  $3$       ب )  $4$       ج )  $5$       د )  $7$

تست ۲۸: در تابع با ضابطه  $g(x) = x + 2\sqrt{x}$  آنگاه  $g'(a) = 2$ ، اگر  $a$  کدام است؟

- الف )  $6$       ب )  $10$       ج )  $8$       د )  $12$

دیر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۲۹: در تابع با ضابطه  $f(x) = \sqrt{x(3x^2 + 5)}$ ، آنگاه  $a$  کدام است؟

- الف) ۱      ب) ۲      ج) ۳      د) ۴

تست ۳۰: در تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & x < 0 \\ \sqrt{2x+1} & x > 0 \end{cases}$  کدام است؟

- الف) ۱      ب)  $\frac{1}{2}$       ج)  $\frac{1}{3}$       د) وجود ندارد

تست ۳۱: اگر  $x = 2$  در نقطه  $fog$  تابع مشتق  $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$  و  $g(x) = x^3 + 1$  باشد، کدام است؟

- الف) ۱۲      ب) ۱      ج) ۲      د) ۵

تست ۳۲: اگر  $g'(0) = -2$  و  $f'(1) = 0$  آنگاه  $(fog)'(1) = -12$  کدام است؟

- الف) -۲      ب) ۶      ج) ۲۴      د) ۰

تست ۳۳: اگر  $x = 2$  در نقطه  $fog$  مشتق  $f(x) = x^3$  و  $g(2) = -g'(2) = -2$  کدام است؟

- الف) -۲۴      ب) -۱۲      ج) ۲۴      د) ۱۲



## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۳۴: اگر  $f(x) = \sqrt{x+1}$  و  $g(x) = x^3 + x + 1$  باشد، مشتق تابع  $gof$  در نقطه  $x = 0$  کدام است؟

۴) ۵

ج) ۲

ب)  $\frac{1}{4}$ الف)  $\frac{1}{2}$ 

تست ۳۵: اگر  $f(x) = \frac{x^3}{x^3 + 2}$  و  $g(x) = \sqrt[3]{x}$  باشد، حاصل  $f'(g(x)) \times g'(x)$  به ازای  $x = 1$  کدام است؟

- $\frac{2}{9}$ ) ۵ج)  $\frac{2}{9}$ ب)  $\frac{1}{4}$ الف) - $\frac{1}{4}$ 

تست ۳۶: اگر  $f(x) = \frac{x^3 - 2}{x^3 + 1}$  و  $g(x) = \sqrt[3]{x-1}$  باشد، حاصل  $f'(g(x)) \times g'(x)$  کدام است؟ (ریاضی ۹۲)

 $\frac{x-3}{x^2}$ ) ۵ج)  $\frac{1}{3x}$ ب)  $\frac{3}{x^2}$ الف)  $\frac{3}{x}$ 

تست ۳۷: اگر  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$  و  $g(x) = f(f(x)) \times f'(x)$  باشد، حاصل  $g'(0)$  کدام است؟ (ریاضی ۹۲)

۱)  $\frac{1}{2}x$ ) ۵ج)  $x$ 

ب) ۱

الف) -۱

تست ۳۸: اگر  $f(x) = \sqrt{x+1}$  و  $g(x) = x^3 + x + 1$  باشد، مشتق تابع  $gof$  در نقطه  $x = 0$  کدام است؟

۴) ۵


ج) ۲

ب)  $\frac{1}{4}$ الف)  $\frac{1}{2}$

## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۳۹: اگر نمودار دو تابع  $f$  و  $g$  به صورت زیر باشند و آنگاه  $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$  برابر است با؟




۵)  $\frac{5}{4}$

ج)  $\frac{5}{8}$

ب) ۱

الف) ○

تست ۴۰: اگر نمودار تابع  $f$  به صورت زیر باشد، ضریب زاویه خط مماس بر تابع  $f(\sqrt{x})$  در  $x = 4$  کدام است؟



۲) ۵

ج) ۳

ب) ۴

الف)  $\frac{1}{2}$ 

تست ۴۱: اگر  $f'(5) = -\frac{1}{2}$  و  $g(x) = x^4 - 3x + 5$  باشند مقدار  $h'(3)$  کدام است؟

۵)  $\frac{3}{2}$

ج) ۳

ب)  $-\frac{3}{2}$

الف) -۳

تست ۴۲: اگر  $f'(1) = -2$  آنگاه مشتق تابع  $\frac{1}{x-1}$  در نقطه  $x = 2$  کدام است؟

۵) -۲

ج) ۲

ب) ۱

الف) ۱

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۴۳: اگر  $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{3-x}}$  در نقطه  $x = -1$  کدام است؟

- الف)  $\frac{1}{6}$       ب)  $\frac{1}{12}$       ج)  $-\frac{1}{6}$       د)  $-\frac{1}{12}$

تست ۴۴: اگر  $f'(a) = 2$  و  $f'(x) + \frac{1}{f(x)}$  مقدار مشتق تابع عبارت  $f(a) = \frac{1}{2}$  در نقطه  $x = a$  کدام است؟

- الف)  $-4$       ب)  $-6$       ج)  $4$       د)  $6$

تست ۴۵: اگر  $f'(x) = 5x - 1$  کدام است؟

- الف)  $5x^2 - 1$       ب)  $5x - 1$       ج)  $10x^3 - 2x$       د)  $2x(5x - 1)$

تست ۴۶: اگر  $f(x) = \frac{x^{\frac{3}{2}} - \sqrt{x+2}}{x-2}$  در نقطه  $x = 2$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۹)

- الف)  $-1$       ب)  $-\frac{1}{2}$       ج)  $\frac{1}{2}$       د)  $1$

تست ۴۷: اگر  $f(x) = \frac{x^{\frac{1}{2}} + \sin^{\frac{1}{2}} x + 2x \sin x}{x+1}$  و  $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x + \sin x}$  باشد، آنگاه  $2ff'g + g'f^2$  به ازای  $x = 1$  کدام است؟

- الف)  $\frac{1}{2}$       ب)  $\frac{1}{4}$       ج)  $-\frac{1}{4}$       د)  $1$

دیبر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

**درس اول : مفاهیم مشتق**

تست ۴۸: اگر  $f(x^3) = \sqrt{x+7}$  کدام است؟

- د)  $\frac{1}{12}$       ج)  $\frac{1}{72}$       ب)  $\frac{1}{48}$       الف)  $\frac{1}{24}$

تست ۴۹: اگر  $f'(x) = \frac{1}{x}$  مشتق تابع  $f(x + \sqrt{1+x^2})$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۵)

- د)  $\sqrt{1+x^2}$       ج)  $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$       ب)  $x - \sqrt{1+x^2}$       الف)  $-x + \sqrt{1+x^2}$

تست ۵۰: اگر  $f(x) = g(x^3 + 2x)$  و  $g'(3) = 4$  آنگاه  $f'(1)$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۹)

- د) ۵      ج) ۱۵      ب) ۱۰      الف) ۲۰

### ۱.۱ ساده کردن، سپس مشتق گیری

**تذکر:** در برخی از موارد می‌توان ابتدا عبارت مورد نظر را ساده نمود سپس از آن مشتق گرفت.

**سوال ۳:** اندازه‌ی مشتق تابع  $y = \log_{10} \sqrt{x}$  را در نقطه‌ای به طول  $\frac{1}{e} = x$ ، واقع بر آن کدام است؟

تست ۵۱: اگر تابع  $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$  و تابع  $g(x) = \sqrt[3]{x^2-2}$  باشد حاصل  $f'(g(x)) \cdot g'(x)$  کدام است؟ (ر ۹۲)

- د)  $\frac{x-3}{x^2}$       ج)  $\frac{1}{3x}$       ب)  $\frac{3}{x^2}$       الف)  $\frac{3}{x}$

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۵۲: اگر  $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + x + 1}$  و  $g(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$  کدام است؟

- الف ) ۱  $-x$  ( د )  $x - 1$  ( ج )  $-1 - x$  ( ب )  $1 - x$  ( الف ) ۱

تست ۵۳: اگر  $f(x) = \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{2x+1}}$  و  $g(x) = \frac{x\sqrt{x} + 2x\sqrt{2x+1}}{\sqrt{x} + \sqrt{2x+1}}$  کدام است؟

- الف )  $\sqrt{x}$  ( ب )  $2$  ( ج )  $\sqrt{2x+1}$  ( د )  $1$  ( الف ) ۱

تست ۵۴: اگر  $f'(g) - g'(f)$  حاصل  $f(x) = \frac{1}{x-\sqrt{x^2+1}}$  و  $g(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$  کدام است؟

- الف )  $-1$  ( ب ) صفر ( ج )  $2x$  ( د )  $\sqrt{x^2 + 1}$  ( الف ) ۱

تست ۵۵: مشتق تابع  $y = \frac{x\sqrt{x+5} + \sqrt{x}(x+5)}{\sqrt{x^2+5x}}$  به ازای  $x = 4$  کدام است؟ (آزاد تجربی ۸۴)

- الف )  $\frac{5}{6}$  ( ب )  $\frac{13}{72}$  ( ج )  $\frac{5}{12}$  ( د )  $\frac{1}{12}$  ( الف ) ۵

تست ۵۶: اگر تابع  $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x+2}$  و تابع  $g(x) = \frac{x^2+4x+4}{(x+1)\sqrt{x+1}}$  باشد، حاصل  $f'(g) + g'(f)$  به ازای  $x = 1$  کدام است؟ (آزاد تجربی ۸۶)

( د )  $\frac{1}{4}$

( ج )  $-\frac{1}{4}$

( ب )  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

( الف )  $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$

**دیبر ریاضی : عادل آخوندی**

## جزوه آموزشی مشتق

درس اول : مفاهیم متفق

تسهیت ۵۷: اگر  $f'(g + g')^5$  باشد، حاصل  $f'g + g'f$  در کدام است؟

د)  $\frac{1-\sqrt{2}}{2}$

ج)  $\frac{1-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$

ب)  $\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

الف)  $\frac{1}{\sqrt{2}-2}$

### ۲.۱ عامل صفر کننده در مشتق

فرض کنید  $f$  و  $g$  هر دو در نقطه  $a$  مشتق پذیر و  $f(a) = 0$  باشد. در این صورت :

بقیه عبارت

$$(f \cdot g)'(a) = \underbrace{f'(a)}_{\text{عامل صفر کننده}} \underbrace{g(a)}_{\text{}} \quad \text{زیرا :}$$

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a) = f'(a) \cdot g(a)$$

در واقع به جای مشتق گرفتن از  $f \cdot g$  فقط از  $f$  (عامل صفر شونده) مشتق می‌گیریم.

یعنی اگر تابعی به صورت حاصل ضرب چند عامل باشد و بخواهیم مشتق را در نقطه‌ای حساب کنیم که یکی از عوامل در آن نقطه صفر باشد، کافی است از همان عامل صفر ساز مشتق گرفته و در بقیه عبارات ضرب کنیم.

$$f(x) = g(x)h(x) \Rightarrow f'(x) = g'(x) \times h(x)$$

سوال ۴: مشتق تابع  $f(x) = (x-2) \frac{\sqrt{2x}}{x^2+1}$  در نقطه  $x=2$  کدام است؟

تسهیت ۵۸: مقدار مشتق تابع  $f(x) = \frac{x^2-x}{x+\sqrt{x}}$  در  $x=1$  کدام است؟

د) صفر

ج) ۲

ب)  $\frac{1}{2}$

الف) ۱

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۵۹: مشتق تابع  $f(x) = \frac{(x-1)\sqrt[5]{3x-2}}{(5x-3)^4}$  در نقطه  $x = 1$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۳)

- الف)  $\frac{1}{16}$
- ب)  $\frac{1}{8}$
- ج)  $\frac{3}{2}$
- د)  $\frac{5}{18}$

تست ۶۰: مشتق تابع  $f(x) = \frac{(x-2)\log(x+1)}{\sqrt{x^2+5}}$  در  $x = 2$  کدام است؟

- الف) صفر
- ب) ۲
- ج)  $\frac{1}{2}$
- د)  $\frac{1}{3}$

تست ۶۱: در تابع  $y = x|x|\sqrt{x+3} + \frac{2}{x+1}$  در این صورت  $(\cdot)' f'$  کدام است؟

- الف) وجود ندارد
- ب) -۱
- ج) -۲
- د) -۳

**نکته:** اگر تعداد عامل های صفر کننده در نقطه  $a$  بیشتر از یکی باشد باشد آنگاه  $f'(a) = 0$

تست ۶۲: اگر  $f(x) = (x^2 + x - 2)(x^3 - 1)(x + \sqrt{x})$  آنگاه  $(1)' f'$  کدام است؟

- الف) صفر
- ب) ۲
- ج) ۶
- د) ۱۲

تست ۶۳: مشتق تابع  $y = (x^2 - 1)\sqrt[3]{x-1} + x\sqrt{2x}$  به ازای  $x = 1$  کدام است؟ (آزاد تجربی ۸۶)

- الف)  $\sqrt{2}$
- ب)  $\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$
- ج)  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
- د)  $2\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}$

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مشتق

**سوال ۵ :** مشتق تابع  $y = (x - a)(2x - a) \dots (nx - a)$  در  $x = a$  را بیابید؟

### ۱.۲.۱ مشتق مرتبه‌ی دوم

برای این کار کافی است دو بار از عبارت مشتق بگیریم

**سوال ۶ :** مشتق مرتبه‌ی دوم تابع  $f(x) = x^3 + 2x$  را بیابید.

تست ۶۴: در تابع  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ، مقدار  $a$  کدام است؟

- الف) -۴
- ب) -۳
- ج) -۲
- د) ۳
- ۵) ۴

تست ۶۵: در تابع  $f(x) = \frac{x-1}{x+3}$ ، حاصل  $(f'' \circ)$  کدام است؟

- الف)  $\frac{4}{27}$
- ب)  $-\frac{4}{27}$
- ج)  $\frac{8}{27}$
- د)  $-\frac{8}{27}$

تست ۶۶: مقدار مشتق دوم تابع  $f(x) = (x-2)\sqrt{x}$ ، به ازای  $x = 2$  کدام است؟

- الف)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ب)  $\sqrt{2}$
- ج)  $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- د)  $2\sqrt{2}$

## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر


تست ۶۷: در تابع با ضابطه  $y = \left( \sqrt{\frac{x+2}{2x-3}} \right)^3$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۹۵)

- الف) -۲۱      ب) -۱۸      ج) ۱۲      د) ۱۵

## ۳.۱ ارتباط مشتق پذیری و پیوستگی

## ۱.۳.۱ مشتق پذیری روی بازه

سوال ۷: در شکل رو به رو نمودار تابع  $f$  رسم شده است. مشتق پذیری تابع  $f$  را در هر یک از بازه های زیر بررسی کنید.



- (۱)  $(-\infty, 0]$       (۲)  $[0, 1]$       (۳)  $(1, 3)$       (۴)  $(0, 0)$

سوال ۸: با رسم نمودار توابع زیر، فواصل مشتق پذیری را بیابید.

۱)  $f(x) = \sqrt{x}$

۲)  $g(x) = \frac{1}{x}$

۳)  $h(x) = |x - 1|$

۴)  $k(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ x + 1 & x < 0 \end{cases}$

دیبر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

**سوال ۹:** در هر کدام از بخش های زیر مشتق پذیری تابع  $f$  را در  $\mathbb{R}$  بررسی کنید و ضابطه  $f'$  و نمودارهای  $f$  و  $f'$  را رسم کنید.

$$1) f(x) = \begin{cases} 5x - 4 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 3 \\ x + 6 & x > 3 \end{cases}$$

$$2) g(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & x < -1 \\ 2x & -1 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{3x+1} & x > 1 \end{cases}$$


$$3) h(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \geq 1 \\ -x^2 & x < 1 \end{cases}$$

$$4) l(x) = \begin{cases} 3x & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases}$$

$$5) m(x) = x |x - 1|$$

$$6) n(x) = |x^2 - 4|$$

تست ۶۸: نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است. تابع  $f$  در کدام بازه زیر مشتق پذیر است؟



(ج)  $(1, 3]$

(ب)  $[1, 2]$


(الف)  $(0, 1)$

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۶۹: نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است. تابع  $|f|$  در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟



( د )

( ج ) ۳

( ب ) ۲

( الف ) ۱۰

تست ۷۰: تعداد نقاط مشتق ناپذیری تابع با ضابطه  $f(x) = |x| - 1$  بر روی  $R$  کدام است؟

( د )

( ج ) ۳

( ب ) ۲

( الف ) ۱۰

تست ۷۱: کدام یک از توابع زیر بر  $\mathbb{R}$  مشتق پذیر نیست؟

$y = |(x+1)(x-2)^2| \quad ( د )$

$y = |(x-1)^3| \quad ( ج )$

$y = x\sqrt[3]{x} \quad ( ب )$

$y = x|x| \quad ( الف )$

تست ۷۲: برای تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & , -3 \leq x < 1 \\ \sqrt{x} & , x \geq 1 \end{cases}$  گزینه نادرست است؟

( ۱ )  $f$  روی بازه  $(-1, 2)$  مشتق پذیر است.

( ۲ )  $f$  روی بازه  $(1, 3)$  مشتق پذیر است.

( ۳ )  $f$  روی بازه  $(-\infty, 1)$  مشتق پذیر است.

( ۴ ) گزینه های ۱ و ۳ با هم

تست ۷۳: برای تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} |x| & , -1 \leq x < 1 \\ \sqrt{x-1} & , x \geq 1 \end{cases}$  در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟

( ۱ ) یک

( ۲ ) دو

( ۳ ) سه

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول: مفاهیم مشتق

تست ۷۴: تابع با ضابطه  $y$   $f(x) = \begin{cases} |x^2 - 1| & , \quad |x| \leq 2 \\ 4x - 1 & , \quad |x| > 2 \end{cases}$  پذیر نیست؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۴ (۲)

۱ (۱)

تست ۷۵: اگر  $f$  روی چند تا از بازه های  $[-1, 1], (2, 5)$  و  $[0, 2]$  مشتق پذیر است، تابع  $f$  روی  $\mathbb{R}$  چند تا از بازه های  $[x_1, x_2]$  مشتق پذیر است؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ (۰) صفر

تست ۷۶: تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 & -2 \leq x \leq 1 \\ x + 1 & x > 1 \end{cases}$  روی کدام بازه زیر مشتق پذیر نیست؟

(۲, ۵) (۴)

[۱, ۲] (۳)

(۱,  $+\infty$ ) (۲)

[-۲, ۱] (۱)

تست ۷۷: اگر  $f'(x)$  در چند نقطه ناپیوسته است، تابع  $f(x) = \begin{cases} 5x - 4 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 3 \\ x + 6 & x > 3 \end{cases}$  پذیر است؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ (۰) صفر

تست ۷۸: تابع با ضابطه  $y$   $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - |x| & , \quad |x| \leq 2 \\ 3x & , \quad |x| > 2 \end{cases}$  پذیر است؟

(-1, 0) (۴)

(-1, 1) (۳)

[1, 4) (۲)

(1, 3) (۱)

دیبر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۷۹: اگر تابع  $f(x) = \begin{cases} g(x) & , \quad x > 0 \\ x^3 & , \quad x \leq 0 \end{cases}$  کدام تابع زیر می تواند باشد؟

$$x^3 \quad (4)$$

$$x^3 \quad (3)$$

$$\sqrt{x} \quad (2)$$

$$\frac{1}{x} \quad (1)$$


تست ۸۰: برای تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} 5x - 4 & , \quad x < 0 \\ x^2 & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 - 4 & , \quad x > 2 \end{cases}$  کدام گزینه نادرست است؟

$$f'(-1) \neq f'(2/5) \quad (4)$$

$$f'(5) = 10 \quad (3)$$

$f'(2)$  وجود ندارد.  $(2)$   $f'(0)$  وجود ندارد.  $(1)$

تست ۸۱: تابع  $f$  با ضابطه  $f$  در چند نقطه ناپیوسته و در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟ (بجز نقاط انتهایی)



- ۱) یک نقطه ناپیوسته و دو نقطه مشتق ناپذیر
- ۲) دو نقطه ناپیوسته و چهار نقطه مشتق ناپذیر
- ۳) یک نقطه ناپیوسته و سه نقطه مشتق ناپذیر
- ۴) دو نقطه ناپیوسته و پنج نقطه مشتق ناپذیر

تست ۸۲: ضابطه مشتق تابع  $f(x) = \begin{cases} 6x & , \quad x \neq 1 \\ 3 & , \quad x = 1 \end{cases}$  کدام است؟

$$f'(x) = 6x \quad (4)$$

$$f'(x) = 6x \text{ و } x \neq 1 \quad (3)$$

$$f'(x) = 6 \text{ و } x \neq 1 \quad (2)$$


$$f'(x) = 6 \quad (1)$$

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۸۳: نمودار تابع  $f$  و  $g$  در شکل مقابل رسم شده اند. اگر  $k(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ , چند تا از نتایج زیر نادرست است؟



الف)  $g(x)$  در بازه  $[0, 4]$  مشتق پذیر است.

ب)  $f'(x)$  در  $x = 3$  مثبت است.

پ) تابع  $k(x)$  در تمامی نقاط بازه  $(0, 4)$  مشتق پذیر است.

ت)  $k'(3) = 0$

۱) ۲) ۳)

۴) ۵) ۶)

تست ۸۴: در کدام گزینه، تابع مشتق در همهٔ نقاط اعداد حقیقی تعریف می‌شود؟

$$f(x) = \begin{cases} 3x & , \quad x \neq 1 \\ 4 & , \quad x = 1 \end{cases} \quad (4) \quad f(x) = x^3 \quad (3) \quad f(x) = \sqrt[3]{x} \quad (2) \quad f(x) = \frac{1}{x} \quad (1)$$

تست ۸۵: تابع  $f(x) = x - [x]$ , مفروض است، آن گاه  $D_f'$  کدام است؟ ([ ]، علامت جزء صحیح است).

۱)  $[0, \infty)$  ۲)  $R - Z$  ۳)  $Z$  ۴)  $R$

تست ۸۶: دامنهٔ تابع مشتق تابع  $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x}$  کدام است؟

۱)  $[-1, +\infty) - \{0\}$  ۲)  $[-1, +\infty)$  ۳)  $(-1, +\infty)$  ۴)  $(-1, +\infty) - \{0\}$






## جزوه آموزشی مشتق

درس اول: مفاهیم مختلط









تست ۸۷: اگر  $f(x) = \begin{cases} x + \sqrt{x} & x \geq 0 \\ \frac{1}{x} & x < 0 \end{cases}$  دامنه تابع  $f'$  کدام است؟

 $[0, +\infty)$  (۴) $(0, +\infty)$  (۳) $\mathbb{R} - \{0\}$  (۲) $\mathbb{R}$  (۱)

تست ۸۸: اگر نمودار تابع  $f$  به شکل باشد، نمودار تابع  $f'$  به کدام شکل زیر است؟ ( $f$  تابعی درجه دوم است).



تست ۸۹: اگر  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} + x^2 & x \leq 1 \\ 4x + 2 & x > 1 \end{cases}$  نمودار  $f'$  کدام است؟






تست ۹۰: اگر  $f(x) = x | x |$  نمودار تابع  $f'$  کدام است؟

دیبر ریاضی: عادل آخوندی




## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر




تست ۹۱: اگر  $f'$  به شکل رو به رو باشد، نمودار تابع  $f$  کدام است؟



تست ۹۲: اگر  $f$  به صورت رو به رو باشد، نمودار مشتق تابع  $f$  کدام است؟







تست ۹۳: اگر  $f$  به صورت رو به رو باشد، نمودار مشتق تابع  $f$  کدام است؟







## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر





تست ۹۴: نمودار مشتق تابع  $f(x) = ax^3 + bx^2$  با شرط  $a < 0$  و  $b > 0$  به کدام شکل زیر است؟







تست ۹۵: نمودار تابع مشتق تابع  $f(x) = (1-x)^3$  کدام است؟



تست ۹۶: نمودار تابع مشتق تابع  $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$  کدام است؟



تست ۹۷: نمودار تابع مشتق تابع با ضابطه  $y = |x^3 - 4|$  کدام است؟



## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۹۸: در تابع درجه دوم  $f''(1) = -f'(1) = \frac{1}{2} f(1) = 2$ ،  $y = f(x)$  باشد، آنگاه طول راس تابع  $f$  کدام است؟

-۱ (۴)

۱ (۳)

-۲ (۲)

۲ (۱)

تست ۹۹: اگر  $y = ax^3 + bx + c$  در رابطه‌ی  $y + y' + y'' + = x^4 + x + 1$  صدق کند، مقدار  $a + b + c$  کدام است؟

۲ (۴)

-۱ (۳)

۱ (۲)

(۱) صفر

تست ۱۰۰: مشتق دوم تابع  $y = (x^4 + 1)^2 + x^5 - x^2$  در  $x = 0$  کدام است؟

۲ (۴)

۶ (۳)

-۲ (۲)

۴ (۱)

تست ۱۰۱: در تابع  $y = f(x)$  رابطه‌ی  $f(x) = (f'(x))^2$  برقرار است.  $f''(x)$  کدام است؟

 $\frac{1}{2} f(x)$  (۴) $f(x)$  (۳) $\frac{1}{2}$  (۲) $\frac{2}{f(x)}$  (۱)

تست ۱۰۲: اگر تابع  $f(x)$  و مشتق اول و دوم آن در نقطه‌ی  $(0, 1)$  مشترک باشند، مشتق دوم تابع  $(g(x) = f^{\prime\prime}(x))$  در  $x = 0$  کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۱۰۳: اگر  $f$  تابعی درجه دوم باشد و داشته باشیم  $f''(2\sqrt{2} - 1) = 10.8x^2$  کدام است؟

۶) ۴

۲۷) ۳

۱۸) ۲

۱) ۱۶

**نکته:** اگر تابع  $y = f(x)$  در نقطه  $x = a$  مشتق پذیر باشد، نتیجه می‌گیریم که اولاً تابع در این نقطه، پیوسته است.

ثانیاً مشتق‌های چپ و راست در این نقطه موجود و با هم برابرند.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

$$f'_+(a) = f'_-(a)$$

تست ۱۰۴: تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 5}{x^2 + ax + b} & x \geq 1 \\ \end{cases}$  مشتق پذیر است. کدام است؟ (تجربی خارج ۹۳)

۴) ۵

۳) ج

۲) ب

۱) الف

تست ۱۰۵: اگر تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 + a & x > 2 \\ bx + 1 & x \leq 2 \end{cases}$  در  $x = 2$  مشتق پذیر باشد،  $a + b$  کدام است؟

۹) ۴

۱۱) ۳

۵) ۲

۷) ۱

تست ۱۰۶: تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} ax^3 + bx & x < 1 \\ 2\sqrt{4x - 3} & x \geq 1 \end{cases}$  بر روی مجموعه اعداد حقیقی مشتق پذیر است،  $b$  کدام است؟

۲) ۴

۳)  $\frac{3}{2}$ 

۱) ۲

۱)  $\frac{1}{2}$ 

۱) است؟

دییر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۱۰۷: در تابع  $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{(2x+6)^2} & x > 1 \\ ax+b & x \leq 1 \end{cases}$  کدام یک از گزینه های زیر است؟  
(سراسری تجربی ۹۰)

د)  $\frac{10}{3}$ ج)  $\frac{8}{3}$ ب)  $\frac{7}{3}$ الف)  $\frac{4}{3}$ 

تست ۱۰۸: تابع با ضابطه  $y$   $f(x) = \begin{cases} ax^3 + bx & x < 1 \\ 2\sqrt{4x-3} & x \geq 1 \end{cases}$  کدام است؟  
بر روی مجموعه اعداد حقیقی مشتق پذیر است.

۲) ۴

۳)  $\frac{3}{2}$ 

۱) ۲

۱)  $\frac{1}{2}$ 

تست ۱۰۹: تابع  $f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{4x-3} & x < 1 \\ ax^3 + bx & x \geq 1 \end{cases}$  بر روی مجموعه اعداد حقیقی مشتق پذیر است،  $b$  کدام یک از گزینه های زیر است؟ (سراسری ریاضی ۹۲)

۱) ۵

ج)  $\frac{3}{2}$ ب)  $\frac{1}{2}$ 

الف) ۲

تست ۱۱۰: تابع  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}}{x} & x \geq 1 \\ ax^3 + bx & x < 1 \end{cases}$  بروی  $R$  مشتق پذیر است  $b$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۹)

۵) ۵

۳) ج

ب) -۱

الف) ۱

تست ۱۱۱: در تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} x+a & x \leq 1 \\ b\sqrt{x} & x > 1 \end{cases}$  کدام است؟  
مقدار  $\frac{2b-a}{2}$  مقدار  $f'(x)$  موجود است.

د) صفر

ج) ۱

ب) ۲

الف) ۳

دییر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۱۲: اگر ضابطه تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & x > 4 \\ 4\sqrt{x} + b & x \leq 4 \end{cases}$  باشد مقدار  $a + b$  کدام است؟

(سراسری تجربی ۸۸)

- الف) -۲۷      ب) -۱۳      ج) ۱۳      د) ۲۷

تست ۱۱۳: تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} (x-1)|x-1| & x \neq 1 \\ a & x = 1 \end{cases}$  مشتق پذیر است. مقدار  $a$  کدام است؟

(سراسری ریاضی ۸۴)

- الف) صفر      ب) ۱      ج) -۱      د) ۲

تست ۱۱۴: تابع  $f(x) = \begin{cases} ax - a & x < 1 \\ x^2 - x & x \geq 1 \end{cases}$  مشتق پذیر است. این تابع به ازای کدام مقدار  $a$  در  $x = 1$  مفروض است.

(سراسری تجربی ۸۶)

- الف) -۱      ب) ۱      ج) هر مقدار  $a$       د) هیچ مقدار  $a$

تست ۱۱۵: تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} 1 + a \cos \pi x & x > 1 \\ bx^2 + x & x \leq 1 \end{cases}$  مشتق پذیر است مقدار  $a$  کدام است؟

(سراسری ریاضی ۹۱)

- الف) ۱      ب) -۱      ج)  $\frac{1}{2}$       د)  $-\frac{1}{2}$

تست ۱۱۶: تعداد نقاط مشتق ناپذیری تابع  $y = ||x| - 1|$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۵)

- الف) ۰      ب) ۱      ج) ۲      د) ۳

**دیبر ریاضی : عادل آخوندی**

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۱۷: اگر  $y = f(f(x)) = 1 - |x|$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۸)

- الف) ۱ ب) ۲ ج) ۳ د) صفر

تست ۱۱۸: اگر  $f(x) = (x^3 + ax + b)[x]$  در ۲ - مشتق پذیر باشد آنگاه  $a^2 + b^2$  کدام است؟

- الف) ۱۳ ب) ۳۲ ج) ۸ د) ۴۱

تست ۱۱۹: در تابع باضابطه  $y = \sqrt[4]{\frac{4x+5}{x+3}}$  کدام است؟ (سراسری تجربی خارج کشور ۹۵)

- الف)  $\frac{7}{48}$  ب)  $\frac{5}{24}$  ج)  $\frac{7}{24}$  د)  $\frac{7}{16}$

تست ۱۲۰: اگر  $f(x) = (x - ۲)\sqrt[۳]{x^۲}$  کدام است؟ (خارج از کشور ۸۴)

- الف) ۲ ب) ۳ ج)  $\frac{2}{3}$  د)  $\frac{4}{3}$

تست ۱۲۱: اگر تابع  $f$  به صورت  $f(x) = (x^3 - x - ۲)\sqrt[۳]{x^۲ - ۷x}$  کدام است؟

(سراسری ریاضی ۹۲)

- الف) ۶ ب) -۳ ج)  $-\frac{3}{2}$  د)  $-\frac{3}{4}$

**دیبر ریاضی : عادل آخوندی**



## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر


تست ۱۲۲: اگر  $f(2) = -2$  باشد، مقدار  $(f')'(2)$  کدام است؟

- الف)  $\frac{1}{8}$       ب)  $\frac{1}{4}$       ج)  $-\frac{1}{4}$       د)  $-\frac{1}{8}$

تست ۱۲۳: اگر  $x = -1$  به ازای  $y = \frac{f(x)}{x^2 + \sqrt{-x}}$  باشد، مقدار مشتق تابع  $f(-1) = -2$  و  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = 3$  کدام است؟


- الف) ۱      ب)  $\frac{1}{2}$       ج)  $\frac{1}{4}$       د)  $\frac{1}{8}$

تست ۱۲۴: با توجه به شکل زیر، حاصل  $f'(2) + f''(2)$  کدام است؟



- الف)  $\frac{10\sqrt{3}}{3}$       ب)  $\frac{\sqrt{3}}{3} + 3$       ج)  $3\sqrt{3}$       د)  $4\sqrt{3}$

تست ۱۲۵: اگر شکل زیر قسمتی از تابع  $f(x)$  باشد،  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x) - 4}{x^2 - 1}$  کدام است؟



- الف) ۱      ب) ۲      ج) ۴      د) ۸

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۲۶ : معادله نیم مماس چپ تابع  $|x^2 - 1|$  در  $x = 1$  از کدام نقطه زیر عبور می کند؟

- (الف) (-۳, ۸)      (ب) (۰, ۱)      (ج) (-۲, ۵)      (د) (-۱, ۳)

تست ۱۲۷ : معادله نیم مماس راست تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$  در  $x = 0$  کدام است؟

- (الف)  $x = 0$       (ب)  $y = 0$       (ج) نیمساز ناحیه دوم      (د) نیمساز ناحیه اول

تست ۱۲۸ : در تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{x}} & x \geq 1 \\ x & x < 1 \end{cases}$  با هم چه زاویه ای می سازند؟

- (الف) ۳۰      (ب) ۶۰      (ج) ۹۰      (د) صفر

تست ۱۲۹ : در تابع  $f(x) = \begin{cases} 5x - 1 & x \geq 1 \\ x + 4 & x < 1 \end{cases}$  کدام است؟

- (الف) ۵      (ب) ۲      (ج) ۰      (د) وجود ندارد


تست ۱۳۰ : در تابع  $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$  کدام است؟

- (الف) -۱      (ب) ۱      (ج) ۰      (د) -۲

## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

مسئله ۱۳۱ : نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است. حاصل  $\lim_{h \rightarrow (0)^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$  کدام است؟




الف ) ۱

ج ) ○ وجود ندارد.

د ) وجود ندارد.

مسئله ۱۳۲ : نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است. اختلاف مشتق چپ و راست در  $x = 4$  است؟

الف )  $\frac{1}{4}$ ج )  $\frac{1}{8}$ ب )  $\infty$ 

سوال ۱۰ : مشتق پذیری تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & x \geq 1 \\ 2x & x < 1 \end{cases}$  را در  $x = 1$  بررسی کنید.

سوال ۱۱ : چند تا از توابع زیر در  $x = 2$  مشتق پذیر نیستند؟

$$y_1 = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 & x \geq 2 \\ 2x - 2 & x < 2 \end{cases}, \quad y_2 = \begin{cases} x^2 - x & x \geq 2 \\ x & x < 2 \end{cases}, \quad y_3 = \begin{cases} \sqrt{x^2} - x & x \geq 2 \\ x|x-2| & x < 2 \end{cases}$$

$$y_4 = |(x-1)(x-2)^2|, \quad y_5 = |(x-1)(x-2)^3|, \quad y_6 = |x^2 - 2x|$$

دیبر ریاضی : عادل آخوندی


## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

سوال ۱۲ : تابع با ضابطه  $|x^3 - 4|$  را در نظر بگیرید. وجود مشتق تابع  $f$  در  $x = \pm 2$  را بررسی کنید.

سوال ۱۳ : تابع با ضابطه  $|\sqrt{x^3} - 4|$  را در نظر بگیرید. وجود مشتق تابع  $f$  در  $x = \pm 2, x = \pm 4$  را بررسی کنید.

تست ۱۳۳ : تابع مقابله ، در چند نقطه مشتق پذیر نیست؟



۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۶ (۴)

تست ۱۳۴ : تابع  $|x^3 - x^2|$  در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟

۴) هیچ

۳) سه

۲) دو

۱) یک

تست ۱۳۵ : کدام یک از توابع زیر در  $x = 1$  مشتق پذیر است؟

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ x+1 & x > 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$$

$$f(x) = |x - 1|$$

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & x \geq 1 \\ -(x-1)^2 & x < 1 \end{cases}$$






دییر ریاضی : عادل آخوندی

۳۴

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۱۳۶: چند تا از توابع زیر، در نقطه  $A$  مشتق پذیرند؟



- ۱) ۲) ۴) ۱)  
۳) ۴) ۲) ۳)

تست ۱۳۷: تابع  $|x^2 - 1|$  در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟





- ۳) ۴) ۲) ۳) ۱) ۲) ۱) صفر

تست ۱۳۸: تابع  $|x^3 - x^2|$  در چند نقطه مشتق پذیر است؟




- ۴) بی شمار ۳) سه ۲) دو ۱) یک

# مرکز مشاوره تحصیلی

تست ۱۳۹: در کدام تابع زیر، مماس چپ و راست در  $x_0$  وجود ندارد؟







تست ۱۴۰: در کدام یک از نمودارهای زیر، در  $x = 1$ ، مشتق راست وجود دارد ولی مشتق چپ وجود ندارد؟



## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۴۱: در کدام تابع با نمودار زیر، تابع در  $x = 1$  مشتق ناپذیر است ولی مشتق چپ و راست دارد؟



تست ۱۴۲: در تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x > 0 \\ 2 & x = 0 \\ x & x < 0 \end{cases}$  مماس راست  $x = 0$  در و مماس چپ  $x = 0$  دارد- وجود ندارد- وجود ندارد- وجود دارد؟

(۱) وجود دارد- وجود ندارد


(۳) وجود ندارد- وجود دارد

تست ۱۴۳: در تابع  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & x \geq 1 \\ x^2 + 1 & x < 1 \end{cases}$  مشتق راست  $x = 1$  در و مشتق چپ  $x = 1$  دارد- وجود ندارد- وجود دارد- وجود ندارد؟





(۱) وجود دارد- وجود ندارد

(۳) وجود ندارد- وجود دارد

تست ۱۴۴: نمودار تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ 2x & x < 0 \end{cases}$  در همسایگی نقطه مشتق ناپذیر به کدام شکل زیر است؟



تست ۱۴۵: در کدام تابع با نمودار زیر،  $f'_+(0) = +\infty$  و  $f'_-(0) = -\infty$  است؟



## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

 تست ۱۴۶: در کدام تابع با ضابطه زیر، مشتق در  $x = 0$  وجود دارد؟

۴)  $x | x |$

۳)  $\frac{1}{|x|}$

۲)  $\frac{|x|}{x}$

۱)  $|x|$

 تست ۱۴۷: در کدام تابع با ضابطه زیر، مشتق چپ و راست در  $x = 0$  هر دو  $\infty$ - است؟

۴)  $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

۳)  $f(x) = -\sqrt[3]{x}$

۲)  $f(x) = x\sqrt[3]{x}$

۱)  $f(x) = \sqrt[3]{x}$

 تست ۱۴۸: تابع  $f(x) = \begin{cases} |x^2 - 1| & |x| \leq 2 \\ 4x - 1 & |x| > 2 \end{cases}$  در چند نقطه مشتق پذیر نیست؟

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

 تست ۱۴۹: اگر تابع  $f(x) = (2x^3 - 3x + a) |x - 2|$  در تمام نقاط صحیح مشتق پذیر باشد،  $a$  کدام است؟

۴) -۴

۳) ۴

۲) -۲

۱) ۲

 تست ۱۵۰: تابع  $f(x) = ||x| - 2|$  در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

 تست ۱۵۱: منحنی کدام یک از توابع زیر در  $x = 0$  دارای خط مماس قائم است؟

۴)  $y = \sqrt[3]{x}$

۳)  $y = \frac{\sqrt{x}}{x}$

۲)  $y = \frac{1}{x}$

۱)  $y = x^3$

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۵۲ : چند تا از توابع زیر در  $x = 0$  مشتق پذیر است؟


$$y = \sqrt{|x|} \quad (4) \quad y = \frac{1}{x} \quad (5) \quad y = \sqrt[3]{x^3} \quad (4) \quad y = \sqrt[3]{x^2} \quad (3) \quad y = \sqrt[3]{x} \quad (2) \quad y = \sqrt{x} \quad (1)$$

○ ) ۵                          ج ) ۳                          ب ) ۲                          الف ) ۱

تست ۱۵۳ : کدام تابع در  $x = 1$  مشتق پذیر است؟

$$y = [x - 1] \quad (5) \quad y = (x - 1)|x - 1| \quad (ج) \quad y = x|x - 1| \quad (ب) \quad y = |x - 1| \quad (الف)$$

تست ۱۵۴ : شکل رو به رو نمودار تابع  $y = f(x)$  است. در چند نقطه مشتق ندارد؟



۲ ) ۵                          ج ) ۳                          ب ) ۴                          الف ) ۵

تست ۱۵۵ : در تابع  $\frac{f'_+(1)}{f'_-(1)}$  کدام است؟  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \geq 1 \\ 2x & x < 1 \end{cases}$

-۱ ) ۵                          ج ) ۱ ) ۱                          ب ) ۲                          الف ) ۲

تست ۱۵۶ : اگر  $f(x) = \sqrt{x^2 - [x] + |x|}$  باشد  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۹۷)

$\frac{5}{2}$  ) ۵                          ج )  $\frac{3}{2}$                           ب )  $\frac{5}{4}$                           الف )  $\frac{1}{2}$

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۵۷ : مشتق چپ تابع  $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}}$  در نقطه  $x = 0$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۹)\*

- الف )  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$       ب )  $-\sqrt{2}$       ج )  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       د )  $\sqrt{2}$

تست ۱۵۸ : اگر  $f(x) = |x^2 - 2x| + x + 4$  آن گاه  $f'(1)$  کدام است؟

- الف ) ۱      ب ) ۲      ج ) -۲      د ) -۱

تست ۱۵۹ : مشتق تابع  $f(x) = |x| + |x^2 - 2x|$  در  $x = -1$  کدام است؟

- الف ) ۵      ب ) -۵      ج ) -۳      د ) ۳

تست ۱۶۰ : در تابع با ضابطه  $f(x) = |5 - x\sqrt{x}|$  مقدار  $f'(4) + f'(1)$  کدام است؟

- الف ) ۰      ب )  $\frac{1}{2}$       ج )  $\frac{3}{2}$       د ) ۵

تست ۱۶۱ : اگر  $f(x) = |2x - 6|$  حاصل  $f'_+(3) - f'_-(3)$  کدام است؟

- الف ) ۲      ب ) ۴      ج ) ۳      د ) ۶

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۱۶۲: مشتق چپ تابع  $y = |x^3 - 2x|$  در نقطه ای به طول  $x = 0$  کدام است؟

- الف) ۱ - ۵      ب) ۲ - ۷      ج) ۳ - ۶

تست ۱۶۳: اگر  $f(x) = |x^3 - 2x|$  حاصل  $f'_+(2)$  کدام است؟

- الف) ۲ - ۱      ب) ۱ - ۴      ج) ۰ - ۵

تست ۱۶۴: در تابع  $f(x) = x\sqrt{x} + |x - 1|$  مقدار  $f'_-(1) + 3f'_+(1)$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۹۰)

- الف) ۲ - ۵      ب) ۳ - ۴      ج) ۴ - ۵

تست ۱۶۵: اگر  $f(x) = x|x - 2|$  کدام است؟

- الف) ۴ - ۵      ب) ۲ - ۶      ج) ۲ - ۴

تست ۱۶۶: اگر  $f(x) = |x - 2| + \sqrt{2x}$  حاصل  $\lim_{\Delta x \rightarrow -} \frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۳)

- الف) ۲ - ۵      ب) ۱ - ۲      ج) ۱ - ۳

## جزوه آموزشی مشتق

## درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۶۷ : اختلاف مشتق چپ و راست تابع  $(x^3 - 2)$  در  $x = 0$  کدام است ؟

- الف) ۰      ب) ۲      ج) ۴      د) ۶

تست ۱۶۸ : در تابع با ضابطه  $f(x) = x^2 + \sqrt{x^2 - 4x + 4}$  مقدار  $f'_+(2) - f'_-(2)$  کدام است ؟

- الف) -۱      ب) ۱      ج) ۲      د) ۰

تست ۱۶۹ : اگر  $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 4}$  و  $g(x) = |1 - x^2|$  آن گاه  $(f + g)'(-2)$  کدام است ؟

- الف) -۷      ب) -۵      ج) ۵      د) ۷

تست ۱۷۰ : اگر  $f(x) = \sqrt{6 - x}$  و  $g(x) = |x|$  آن گاه  $(fog)'(-2)$  کدام است ؟

- الف) ۰      ب)  $-\frac{1}{4}$       ج)  $\frac{1}{4}$       د) ۱

تست ۱۷۱ : در تابع با ضابطه  $|x^2 - 1|$  معادله نیم مماس راست در نقطه  $(1, 0)$  کدام است ؟

- الف)  $y = -2x + 2$       ب)  $y = 2x - 2$       ج)  $y = 2x + 2$       د)  $y = -2x - 2$

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختلف

تست ۱۷۲: اگر  $|x| = \frac{4}{5}x - \frac{1}{5}|x|$  باشد مشتق تابع  $fog$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۹۴)

- الف) ۲      ب) ۳      ج) ۴      د) مشتق ندارد

\*تست ۱۷۳: اگر  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = -\frac{1}{3}$  در نقطه  $x = -1$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۷)

- الف)  $\frac{1}{6}$       ب)  $\frac{1}{12}$       ج)  $-\frac{1}{6}$       د)  $-\frac{1}{12}$

تست ۱۷۴: مشتق راست تابع  $f(x) = x^{\gamma}[x]$  در  $x = 1$  کدام است؟

- الف) ۰      ب) ۳      ج) ۶      ۲) ۵

تست ۱۷۵: اگر  $f(x) = (x-2)[3x-2]$  کدام است؟

- الف) صفر      ب) ۲      ج) ۱      ۱) ۵

تست ۱۷۶: اگر  $f(x) = x^3 - 2[2x^2]x$  باشد مقدار  $f'_+(2) - f'_-(2)$  کدام است؟ (تجربی خارج کشور ۹۴)

- الف) ۱      ب) -۲      ج) ۲      ۱) ۵

## جزوه آموزشی مشتق

### درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۷۷: در تابع با ضابطه  $f(x) = |x|$  [ $x$ ] کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۷)

- الف) -۱      ب) صفر      ج) ۱      د) ۲

تست ۱۷۸: اگر  $f(x) = x^{\frac{1}{3}}[x]$  کدام است؟

- الف) ۱۲      ب) ۱۴      ج) ۱۶      د) ۱۸

تست ۱۷۹: اگر  $f(x) = \left[ \frac{2x^3+2}{3} \right]$  در این صورت (۱) کدام است؟

- الف) صفر      ب) ۱      ج) ۲      د) وجود ندارد

تست ۱۸۰: اگر  $f(x) = x[2x + 1]$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۰)

- الف) ۳      ب) ۲      ج) ۱      د) وجود ندارد

تست ۱۸۱: در تابع  $|x^2 - 9|$  حاصل  $\lim_{h \rightarrow (-3)^-} \frac{f(x) - f(-3)}{x + 3}$  کدام است؟

- الف) ۱۲      ب) -۱۲      ج) ۲۴      د) -۲۴

## جزوه آموزشی مشتق

درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۸۲ : در تابع  $x^2$ ،  $f(x) = |x| + [x]x^2$  کدام است؟

۶) د

۵) ج

۹) ب

۷) الف

تست ۱۸۳ : مشتق راست تابع با ضابطه  $y = -3$  در نقطه  $x = 3$  کدام است؟ (ریاضی ۹۳)

۵)  $\frac{7}{3}$ 

-۴) ج

-۵) ب

الف)  $\frac{-16}{3}$ 

## ۲.۳.۱ بررسی برخی حدود به کمک قاعده هیپیتال

تست ۱۸۴ : اگر  $f(x) = x^2 + 5\sqrt{x} - 2$  باشد حاصل  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1-h)}{h}$  کدام است؟

۳۶) د

۹) ج

۱۶) ب

الف) ۱۸

تست ۱۸۵ : اگر  $f(x) = x^2 + x + 1$  باشد حاصل  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+5h) - f(1+2h)}{h^2 + 5h^2 - 2h}$  کدام است؟

-۲) د

۲) ج

-۹) ب

الف)  $\frac{9}{2}$ 

دیری ریاضی : عادل آخوندی

۴۴

## جزوه آموزشی مشتق

درس اول : مفاهیم مشتق

تست ۱۸۶ : در تابع  $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3 & x \geq 1 \\ 5x & x < 1 \end{cases}$  کدام است؟

۱۰) د

ج) ۹

ب) ۵

الف) ۸

تست ۱۸۷ : در تابع  $f(x) = \begin{cases} x^3 + x & x \geq 2 \\ 3x + x^2 & x < 2 \end{cases}$  کدام است؟

-۳۹) د

ج) ۳۹

ب) ۲۱

الف) -۲۱

تست ۱۸۸ : در تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & x \geq 1 \\ x^3 + \sqrt{x} & x < 1 \end{cases}$  کدام است؟

- $\frac{7}{2}$  ) دج)  $-\frac{5}{2}$ 

ب) -۳

الف) -۲

تست ۱۸۹ : مشتق  $F$  در  $x = 2$  به صورت  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(2+h)^2 + k(2+h) - 2k - 8}{h} = 12$  بیان شده ، مقدار عدد  $k$  کدام است ؟

(سراسری ریاضی ۸۱)

۶) د

ج) ۴

ب) ۳

الف) ۲

تست ۱۹۰ : اگر تابع  $f$  در  $x$  مشتق پذیر و  $-2$  مقدار  $\lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(x.-h) - f(x)}{h}$  کدام است ؟

(سراسری تجربی ۸۰)

-۲) د

ج) ۲

ب)  $2 + f(x.)$ الف)  $2 - f(x.)$ 

دیری ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی مشتق

درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۹۱: اگر  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h^2+4h}$  آنگاه کدام است ؟

- الف)  $\frac{1}{10}$       ب)  $\frac{2}{5}$       ج)  $\frac{1}{5}$       د)  $\frac{1}{2}$

تست ۱۹۲: اگر  $F(x) = x^2 - x$  ,  $g(x) = \sqrt{2x}$  حاصل کدام گزینه است ؟

(سراسری تجربی ۸۲)

- الف) ۳      ب) ۴      ج) ۶      د) ۷

تست ۱۹۳: مشتق تابع  $f$  در نقطه  $x = 2$  به صورت  $12 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(2+h)^k + k(2+h) - 2k - 8}{h}$  بیان شده است . مقدار عدد  $k$  است ؟ (سراسری ریاضی ۸۱)

- الف) ۲      ب) ۳      ج) ۴      د) ۶

تست ۱۹۴: اگر  $f$  مشتق پذیر و  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x-h)}{h} = \sqrt{x}$  به ازای  $x = 1$  کدام است ؟

- الف) ۱-      ب)  $-\frac{1}{2}$       ج)  $\frac{1}{2}$       د) ۱

تست ۱۹۵: اگر  $h(x) = F(x) + g(2-x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)-g(x)}{x-1} = 4$  کدام است ؟

- الف) ۲      ب) ۲-      ج) ۴      د) ۴-

دیبر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

درس اول : مفاهیم مختصر

تست ۱۹۶: اگر  $y = xF\left(\frac{1}{x}\right)$  در این صورت مشتق تابع  $F(1) = 2$  و  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)-F(1)}{2-2x} = 3$  کدام است؟

- الف ) ۸      ب ) ۱۲      ج ) ۱۰      د ) ۹

تست ۱۹۷: اگر  $f(x) = \sqrt{2x}$ ,  $g(x) = x^{\alpha} + x + 1$  باشد آنگاه مشتق  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h)g(2-h)-f(2+h)g(2+h)}{h}$  کدام است؟

- الف ) ۲۷      ب ) -۲۷      ج ) ۹      د ) -۹

تست ۱۹۸: اگر تابع  $f$  در  $x = 4$  مشتق پذیر و  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)+7}{x-4} = \frac{-3}{2}$  باشد آنگاه مشتق  $f$  در  $x = 2$  کدام است؟

(سراسری ریاضی ۹۶)

- الف )  $\frac{-1}{4}$       ب )  $\frac{-1}{2}$       ج )  $\frac{1}{4}$       د )  $\frac{1}{2}$

تست ۱۹۹: اگر تابع  $f$  در  $x = -2$  مشتق پذیر،  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h)+3}{h} = \frac{1}{2}$  باشد آنگاه مشتق  $f(x)$  در  $x = -2$  کدام است؟

(سراسری ریاضی خارج کشور ۹۶)

- الف ) ۸      ب ) ۱۰      ج ) ۱۲      د ) ۱۴

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

درس دوم: آهنگ تغییر متوسط و لحظه‌ای



آهنگ تغییر متوسط و آهنگ تغییر لحظه‌ای

درس دوم

## ۲ فصل دوم

## ۱.۲ آهنگ تغییرات

## ۱.۱.۲ آهنگ تغییرات و مشتق توابع

 تست ۲۰۰: در تابع  $f(x) = \log_2^{(x-1)}$  آهنگ متوسط تغییر بین  $x = 3$  و  $x = 9$  برابر کدام است؟

$\frac{3}{2}$  (۴)

$\frac{1}{3}$  (۳)

$\log_2^{\frac{1}{3}}$  (۲)

$\log_2^{\frac{3}{2}}$  (۱)

 تست ۲۰۱: در تابع  $f(x) = \sqrt{x}$  آهنگ تغییر از  $x = 4$  تا  $x = 9$  برابر آهنگ لحظه‌ای با کدام طول است؟

۶ / ۲۵ (۴)

۶ / ۷۵ (۳)

۲ / ۲۵ (۲)

۲ / ۵ (۱)

 تست ۲۰۲: در کدام تابع آهنگ متوسط روی بازه  $[a, b]$  از آهنگ لحظه‌ای در  $x = a$  بیشتر است؟

$y = \log_2 x$  (۴)

$y = 2^x$  (۳)

$y = \sqrt{x}$  (۲)

$y = 2x - 1$  (۱)

دییر ریاضی: عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

## درس دهم: آنچه تغییر متوسط و احتمالی

تست ۲۰۳: دو نقطه به طول های ۴ و ۵ از نمودار  $f(x) = \sqrt{x^2 - 16}$  را به هم وصل می کنیم. اگر مماس بر نمودار در موازی این پاره خط واصل باشد،  $f(c)$  کدام است؟

(۴)  $\sqrt{3}$

(۳)  $\sqrt{2}$

(۲)  $2\sqrt{3}$

(۱)  $3\sqrt{2}$

تست ۲۰۴: جسمی از ارتفاع ۱۵ متری با سرعت ۱۰ متر بر ثانیه به بالا پرتاب می شود. ارتفاع آن از سطح زمین در هر لحظه از

معادله  $h(t) = -5t^2 + 10t + 15$  به دست می آید. چند گزاره درست هستند؟

(۱) سرعت جسم در لحظه بروخته با زمین ۲۰ است.

(۲) حرکت جسم در فاصله [۱, ۰] رو به بالا است.

(۳) حداقل تا ارتفاع ۲۵ متری بالا می رود.

(۴) سرعت آن در لحظاتی  $\pm 5$  است که از هم یک ثانیه فاصله دارند.

(۵) سرعت متوسط آن از شروع حرکت تا لحظه  $t = 2$  برابر  $5^\circ$  است.

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

تست ۲۰۵: جسمی را از سطح زمین به طور عمودی پرتاب می کنیم. ارتفاع این جسم از سطح زمین در هر لحظه از معادله

$h(t) = -5t^2 + 40t$  به دست می آید. اگر  $V_1$  سرعت لحظه ای جسم در  $t = 2$  و  $V_2$  سرعت متوسط جسم در بازه  $[3, 4]$

باشد  $\frac{V_1}{V_2}$  کدام است؟

(۴)  $\frac{2}{3}$

(۳)  $\frac{3}{2}$

(۲) ۲

(۱) ۴

## جزوه آموزشی مشتق

### درس دهم: آهنگ تغییر متوسط و احظای

تست ۲۰۶: یک توده باکتری پس از  $t$  ساعت دارای جرم  $m(t) = 2\sqrt{t} + 2t^3$  گرم است. آهنگ رشد جرم توده باکتری در لحظه  $t = 1$  چقدر کم تر از آهنگ متوسط رشد این توده در بازه زمانی  $[1, 4]$  است؟

$$\frac{109}{3} \quad (4)$$

$$\frac{107}{3} \quad (3)$$

$$\frac{104}{3} \quad (2)$$

$$\frac{106}{3} \quad (1)$$

تست ۲۰۷: گنجایش ظرفی ۴۰ لیتر مایع است. در لحظه  $t = 0$  سوراخی در ظرف ایجاد می‌کنیم. اگر حجم مایع باقی مانده در ظرف پس از  $t$  ثانیه از رابطه  $v(t) = 40 - \frac{t^2}{100}$  به دست آید. در چه زمانی، آهنگ تغییر لحظه‌ای حجم آب برابر آهنگ تغییر متوسط آن در بازه  $[0, 100]$  می‌شود؟


$$40 \quad (4)$$

$$75 \quad (3)$$

$$50 \quad (2)$$

$$25 \quad (1)$$

تست ۲۰۸: با توجه به شکل زیر، آهنگ متوسط تغییر تابع  $f$  در کدام یک از بازه‌های زیر بیشتر است؟




$$[1, 2] \quad (2)$$

$$[0, 1] \quad (1)$$

$$[3, 4] \quad (4)$$

$$[2, 3] \quad (3)$$

تست ۲۰۹: اگر نمودار تابع  $f$  در بازه  $[0, 6]$  به شکل زیر باشد، آنگاه کدام گزینه نادرست است؟



(۱) آهنگ متوسط تغییر در بازه  $[2, 6]$  همواره منفی است.

(۲) آهنگ لحظه‌ای تغییر در  $x = 2$  صفر است.

(۳) آهنگ لحظه‌ای تغییر به ازای هر  $x \in (0, 2)$  منفی است.

(۴) معادله‌ای  $f'(x_0) = 1/5$  دارای دو ریشه در بازه  $(0, 6)$  است.

**دیبر ریاضی : عادل آخوندی**

۵۰

## جزوه آموزشی مشتق

## درس دهم: آهنگ تغییر متوسط و احتمال

تست ۲۱۰: سنگی را از ارتفاع  $h$  رها می کنیم، اگر مسافت طی شده از رابطه  $S(t) = 5t^2$  ( بر حسب ثانیه و  $S$  بر حسب متر) به دست آید، سرعت متوسط حرکت سنگ از ثانیه ۱ تا ثانیه ۲ چند متر بر ثانیه است؟


(۴) ۱۹/۵

(۳) ۲۰/۱

(۲) ۲۰/۵

(۱) ۲۰۰

تست ۲۱۱: تابع حرکت متحرکی  $x(t)$  است. نمودار  $x(t)$  در زیر رسم شده، این متحرک چند بار سرعتش صفر شده و جهت حرکتش تغییر کرده است؟



(۱) یک بار

(۲) دو بار

(۳) سه بار

(۴) چهار بار

تست ۲۱۲: تابع حرکت متحرکی روی محور  $x$  ها بر حسب متر، در فاصله زمانی  $[0, 4]$  بر حسب ثانیه، به صورت  $x(t) = -t^3 + 4t + 1$  است، متحرک حداقل چند متر از مبدأ فاصله می گیرد؟

(۴) ۶ متر

(۳) ۳ متر

(۲) ۵ متر

(۱) ۴ متر

تست ۲۱۳: اگر  $P(t) = 3000 + 100t^3$  نمایش جمعیت یک نوع باکتری در زمان  $t$  (ساعت) باشد، آهنگ متوسط افزایش جمعیت در ۳ ساعت اول پس از زمان  $t = 2$  چه قدر از آهنگ لحظه ای افزایش جمعیت در  $t = 3$  بیش تراست؟

(۴) ۴۰۰

(۳) ۲۰۰

(۲) ۱۰۰

(۱) صفر

## جزوه آموزشی مشتق

### درس دهم: آهنگ تغییر متوسط و احظه‌ای


تست ۲۱۴: نمودار زیر روند تورم ماهانه در یک سال کشوری را نمایش می‌دهد. کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) در بازه‌ی زمانی  $[3, 6]$  به طور متوسط در هر ماه تورم  $\frac{2}{3}$  درصد کاهش می‌یابد.


- (۲) آهنگ لحظه‌ای تغییر تورم در  $t = 4$  برابر ۲ درصد است.

- (۳) در بازه‌ی زمانی  $[3, 5]$  آهنگ متوسط تغییر تورم مثبت است.

- (۴) در طول یکسال، آهنگ متوسط تغییر تورم این کشور مثبت است.



تست ۲۱۵: در شکل زیر، نمودار فروش یک کالا در طی شش ماه نمایش داده شده است. کدام گزینه درست است؟



- (۱) بیشترین فروش در انتهای ماه چهارم است.

- (۲) در بازه‌ی زمانی  $[2, 6]$  به طور متوسط در هر ماه هزار عدد از کالا فروخته شده است.

- (۳) آهنگ لحظه‌ای تغییر تورم در  $t = 3$  برابر  $5/1$  هزار عدد ده ماه است.

- (۴) هر سه گزینه درست است.

تست ۲۱۶: آهنگ لحظه‌ای تغییر حجم  $V$  یک کره نسبت به ساعت  $r$  در  $r = 1$ ، چند برابر آهنگ لحظه‌ای تغییر مساحت

آن نسبت به ساعت در  $r = 1$  است؟

۳ (۴)

۲ (۳)

$\frac{1}{2}$  (۲)

$\frac{1}{3}$  (۱)

## جزوه آموزشی مشتق

## درس دهم: آهنگ تغییر متوسط و احتمالات

تست ۲۱۷: اگر  $P(t) = 2500 + 50t^3$  نمایش جمعیت یک نوع باکتری در زمان  $t$  باشد (بر حسب ساعت)، آهنگ متوسط افزایش جمعیت این نوع باکتری در ۴ ساعت پس از زمان  $t=1$  بقدر از آهنگ لحظه‌ای آنها در  $t=2$  بیش تر است؟

(۴) ۵۰

(۳) ۱۰۰

(۲) ۳۰۰

(۱) ۲۰۰

تست ۲۱۸: در تابع  $f(x) = \sqrt{x}$ ، آهنگ متوسط تغییر تابع نسبت به متغیر روی بازه  $[2/25, 2/56]$  از آهنگ آنی در این نقطه چقدر کمتر است؟ (سراسری تجربی ۸۷)

(۵)  $\frac{1}{31}$ (ج)  $\frac{1}{62}$ (ب)  $\frac{2}{93}$ (الف)  $\frac{1}{93}$ 

تست ۲۱۹: آهنگ متوسط تغییر تابع با ضابطه  $y = \sqrt{x^3 + 144}$  نسبت به متغیر  $x$  روی بازه ای از  $x=5$  و  $x=9$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۴)

(۵) ۰/۷

(ج) ۰/۶

(ب) ۰/۵

(الف) ۰/۴

تست ۲۲۰: متحرکی بر روی محور  $x$ ها در حرکت است. اگر معادله حرکت  $x = t^2 - 8t + 20$  باشد، بعد از طی چه مسافتی متوقف خواهد شد؟

(۵) ۱۶ متر

(ج) ۱۲ متر

(ب) ۲۰ متر

(الف) ۴ متر

## جزوه آموزشی مشتق

## درس دهم: آهنگ تغییر متوسط و احتمالات

تست ۲۲۱: تابع با ضابطه  $f(x) = (2x + 1)^{-\frac{1}{2}}$  آهنگ متوسط تغییر تابع از نقطه  $x = 4$  تا  $x = 12$  از آهنگ لحظه‌ای آن در نقطه  $x = 4$  چقدر بیشتر است؟ (سراسری تجربی ۹۳)

د)  $\frac{11}{270}$

ج)  $\frac{7}{270}$

ب)  $\frac{11}{540}$

الف)  $\frac{7}{540}$

تست ۲۲۲: در تابع با ضابطه  $f(x) = 3x^3 + 4x - 2$ ، تفاضل آهنگ لحظه‌ای در نقطه  $x = a + \frac{h}{2}$  از آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر  $x$  از عدد  $a$  به عدد  $a + h$  تغییر کند، کدام است؟ (خارج از کشور ۸۶)

د) صفر

ج)  $3h$

ب)  $2h$

الف)  $h$

تست ۲۲۳: در تابع با ضابطه  $f(x) = x^3$  آهنگ متوسط تغییر این تابع وقتی  $x = 1/10$  و  $x = 0$  از آهنگ لحظه‌ای تغییر این تابع در نقطه  $x = 3$  چقدر بیشتر است؟ (خارج از کشور ۸۷)

د)  $0/91$

ج)  $0/62$

ب)  $0/41$

الف)  $0/31$

تست ۲۲۴: در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ، آهنگ متوسط از  $x_1 = 2$  تا  $x_2 = 5$  برابر آهنگ لحظه‌ای آن در  $x = a$  است. کدام است؟ (خارج از کشور ۹۰)

د) ۵

ج) ۳

ب)  $1 + \sqrt{3}$

الف)  $2/5$

## جزوه آموزشی مشتق

### درس دهم: آهنگ تغییر متوسط و احظای

تست ۲۲۵: معادله حرکت یک گلوله توپ که از زمین به طور قائم به طرف بالا پرتاب می شود، به صورت  $S = -5t^2 + 20t$  است. سرعت لحظه‌ای این گلوله در زمان برخورد به زمین (صرف نظر از مقاومت هوا) چند متر بر ثانیه است؟ (سراسری تجربی ۸۲)

د) -۵

ج) -۱۰

ب) -۱۵

الف) -۲۰

تست ۲۲۶: در تابع با ضابطه  $y = \sqrt{x}$  آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر  $x$  از ۴ به ۲۵ تغییر کند برابر آنگ لحظه‌ای در نقطه  $a$  است. کدام است. (سراسری تجربی ۸۳)

د)  $\frac{13}{5}$ ج)  $\frac{12}{5}$ ب)  $\frac{12}{25}$ الف)  $\frac{11}{75}$ 

تست ۲۲۷: در تابع با ضابطه  $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ، آهنگ متوسط تغییر تابع وقتی متغیر از عدد ۲ به  $2+h$  تغییر کند برابر است.  $h$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۶)

د) ۳

ج) ۲

ب) ۲

الف) ۱/۵

تست ۲۲۸: آهنگ متوسط تغییر روی تابع  $f(x) = \sqrt{x^2 + 16}$  نسبت به متغیر  $x$  روی بازه  $[0, 3]$ ، از آهنگ لحظه‌ای تابع در  $\sqrt{2} = x$  چقدر کمتر است؟ (سراسری تجربی ۸۸)

د)  $\frac{1}{9}$ ج)  $\frac{1}{12}$ ب)  $\frac{1}{18}$ 

الف) صفر

## جزوه آموزشی مشتق

## درس دهم: آهنگ تغییر متوسط و احتمالات

تست ۲۲۹: در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{3x}{x^2}$ ، آهنگ متوسط تابع از  $x_1 = 2$  تا  $x_2 = 3$  چقدر از آهنگ لحظه‌ای آن در  $x = \sqrt[3]{12}$  بیشتر است؟ (سراسری تجربی ۹۰)

۲.۵) د

۲) ج

۱.۵) ب

الف) ۱

تست ۲۳۰: در تابع با ضابطه  $f(x) = \sqrt{x}$  آهنگ متوسط تغییر تابع نسبت به متغیر  $x$  را در نقطه ۱ با نمو متغیر  $\frac{1}{21}$  از آهنگ لحظه‌ای تابع در این نقطه چقدر کمتر است؟ (سراسری تجربی ۹۴)

۲) ۵

۳) ۴۲

۱) ۲۱

الف)  $\frac{1}{42}$ 

تست ۲۳۱: در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}}$  آهنگ متوسط تغییر تابع نسبت به متغیر  $x$  را در نقطه ۱ با نمو متغیر  $\frac{1}{44}$  از آهنگ لحظه‌ای تابع در این نقطه چقدر کمتر است؟ (سراسری تجربی خارج کشور ۹۴)

۱) ۶

۱) ۱۲

۱) ۲۴

الف)  $\frac{1}{30}$ 

مرکز مشاوره تحصیلی

دییر ریاضی: عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

درس سوم : معادله خط مماس و قائم

## ۳ معادله خط مماس و قائم

## ۱.۳ خط مماس و قائم بر منحنی از نقطه‌ای روی منحنی

تست ۲۳۲ : معادله خط قائم بر منحنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}} + 1$  در نقطه‌ای به طول ۱ واقع بر آن کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۵)

الف)  $y - 2x = 0$       ب)  $y - x = 3$       ج)  $y + x = 4$       د)  $y + 2x = 0$

تست ۲۳۳ : معادله خط مماس بر منحنی تابع  $f(x) = -x^3 + 10x$  در  $A(2, f(2))$  کدام است؟

الف)  $y = 6x + 4$       ب)  $y = -2x + 18$       ج)  $y = -2x + 14$       د)  $y = 4x + 12$

تست ۲۳۴ : عرض از مبدا خط مماس بر منحنی به معادله  $y = \sqrt{x^3 + 3x}$  در نقطه‌ای  $x = 1$  واقع بر آن کدام است؟ (تجربی داخل ۸۷)

الف)  $\frac{-3}{5}$       ب)  $\frac{3}{4}$       ج)  $\frac{3}{2}$       د)  $2$

تست ۲۳۵ : خط مماس بر منحنی  $y = x^3 + 3x^2 - 3y = 2$  بر خط  $x - 3y = 1$  عمود است این خط مماس از کدام نقطه می‌گذرد؟ (سراسری تجربی ۸۹)

الف)  $(1, 3)$       ب)  $(1, 4)$       ج)  $(2, -4)$       د)  $(2, -6)$

دیبر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

### درس سوم : معادله خط مماس و تابع

تست ۲۳۶: خط مماس بر منحنی  $y = \frac{x^3}{x-1}$  در نقطه‌ای به طول ۲ واقع بر آن محور  $u$  را با کدام عرض قطع می‌کند؟ (سراسری ریاضی ۸۵)

- الف) ۰      ب) ۱      ج) ۲      د) ۴

تست ۲۳۷: خط مماس بر منحنی به معادله  $y = x^3 - x^2$  در نقطه‌ی  $x=1$  واقع بر آن، منحنی را در نقطه دیگر قطع می‌کند، عرض این نقطه کدام است؟ (تجربی خارج ۸۷)

- الف) -۳      ب) -۲      ج) ۲      د) ۳

تست ۲۳۸: شیب خط مماس بر منحنی  $y = \frac{x-3}{x-1}$  در نقاط  $A, B$  برابر ۲ است. طول پاره خط  $AB$  کدام است؟

- $\sqrt{2}$  (۴)       $2\sqrt{2}$  (۳)       $2\sqrt{5}$  (۲)       $\sqrt{5}$  (۱)

تست ۲۳۹: خط مماس بر منحنی به معادله  $y = \frac{x-3}{2x+1}$  برخطی به معادله  $2y + 14x = 9$  عمود است. طول نقطه تماس کدام است؟

- ۲, ۳ (۴)      -۴, ۳ (۳)      ۴, -۳ (۲)      ۲, -۳ (۱)

## جزوه آموزشی مشتق

درس سوم : معادله خط مماس و تابع

تست ۲۴۰ : عرض از مبدأ خط قائم بر منحنی  $y = \frac{2x-1}{x+1}$  در نقطه‌ی تقاطع اش با محور طول‌ها، کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۴)

$$-\frac{2}{3} \quad (4)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{3}{8} \quad (2)$$

$$\frac{3}{4} \quad (1)$$

مرکز مشاوره تحصیلی  
علیرضا افشار

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

درس سوم : معادله خط مماس و قاعده

سوالات کنکور ۹۸

تست ۲۴۱: در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{5-2x}$  کدام است؟ (ت ۹۸)

(د)  $\frac{5}{6}$ (ج)  $\frac{7}{12}$ (ب)  $\frac{5}{12}$ (الف)  $\frac{4}{9}$ 

تست ۲۴۲: تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & x \geq 2 \\ -x^2 + ax + b & x < 2 \end{cases}$  روی مجموعه اعداد حقیقی مشتق پذیر است. مقدار  $b$  کدام است؟ (ت ۹۸)

(د) ۲

(ج) ۱

(ب) -۱

(الف) -۲

تست ۲۴۳: اگر  $f'(5) = 6$  و  $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$  کدام است؟ (ت ۹۸)

(د) ۳

(ج) ۲

(ب) -۱

(الف) -۲

تست ۲۴۴: در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{x}$  اختلاف آهنگ تغییر لحظه‌ای در  $x = 2$  از آهنگ تغییر متوسط در بازه  $[1, 4]$  کدام است؟ (ت ۹۸)

(د)  $0/75$ (ج)  $0/45$ (ب)  $0/5$ (الف)  $0/25$ 

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی مشتق

درس سوم : معادله خط مماس و چشم

تست ۲۴۵: در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{-x-1}{\sqrt{x}}$  کدام است؟ (ت خ ۹۸)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\frac{1}{4} + h) - f(\frac{1}{4})}{h}$$

۴) د

۳) ج

۲) ب

الف) ۱

تست ۲۴۶: در تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} ax+b & x > 2 \\ -x^3+6x & x \leq 2 \end{cases}$  کدام است؟ (ت خ ۹۸)

۴) د

۳) ج

۲) ب

الف) ۱

تست ۲۴۷: مشتق تابع  $f(x) = x\sqrt[3]{\frac{3x+1}{x+2}}$  در نقطه  $x = -3$  کدام است؟ (ت خ ۹۸)

۳) ۵

۴) ۳

۳) ۴

الف) ۳

تست ۲۴۸: در تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{4x-5}{x+1}$  و دامنه  $[8, \infty]$ ، خط مماس بر نمودار آن موازی پاره خطی است که ابتدا و

انتهای منحنی را به هم وصل کند، این خط مماس، محور y را با کدام عرض، قطع می کند؟ (ت خ ۹۸)

۵) ۰/۵

-۱) ۱

-۱/۵

الف) ۲

دیبر ریاضی : عادل آخوندی



عنوان

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

نگارش

عادل آخکندی

مرکز مشاوره تحصیلی

علیرضا افشار

دبیر ریاضی : عادل آخکندی



## صفحه

## فهرست

۱	بررسی یکنواختی در توابع مشتق پذیر.....	۱
۱	۱.۱ آزمون یکنواختی تابع.....	۱
۱۰	۲ نقاط اکسٹرمم.....	۲
۱۰	۱.۲ اکسٹرمم های نسبی.....	۱۰
۱۳	۲.۲ آزمون مشتق اول.....	۱۳
۱۸	۳ نقطه بحرانی.....	۳
۲۶	۳.۱ اکسٹرمم های مطلق.....	۲۶
۲۷	۱.۱.۳ تعیین اکسٹرمم های مطلق $f$ بر بازه $[a, b]$ .....	۲۷
۲۹	۲.۱.۳ جمعبندی درس اول.....	۲۹
۳۷	۲.۳ تابع درجه ۳.....	۳۷
۳۸	۴ بهینه سازی.....	۴
۴۲	۴.۱ تست های جمعبندی.....	۴۲

# مرکز مشاوره تحصیلی

# علیرضا افشار

دییر ریاضی : عادل آخوندی



جزوه آموزشی کاربرد مشتق

## درس اول: یلنوایر و آکترمہم ھا



## پکنوایی و اکسترهم‌ها

## درس اول

## ۱ بررسی پکنوایی در توابع مشتق پذیر

**سوال ۱:** نمودار هر کدام از توابع زیر را رسم کنید، سپس از آنها مشتق گرفته و یکنواختی آن‌ها را با علامت مشتق تابع مقایسه کنید.

$$1) f(x) = 4x - 1$$

$$4) g(x) = -x + 4$$

$$\text{r}) h(x) = \sqrt{x}$$

$$\text{f)} u(x) = -\sqrt{x}$$

$$\mathfrak{d}) m(x) = x^{\mathfrak{r}}$$

$$\textcircled{c}) n(x) = x^r$$

۱.۱.۱ آزمون پکنواپی تابع

**سوال ۲:** تابع  $f(x) = x^3 - x^2 - x$  در چه بازه هایی صعودی و در چه بازه هایی نزولی است؟

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکترهم ها

تست ۱: تابع با ضابطه  $f(x) = 3x^3 - x^2$  در کدام بازه زیر اکیداً صعودی است؟

- (۱)  $(-\infty, 0)$       (۲)  $(0, 2)$       (۳)  $(2, \infty)$       (۴)  $(0, \infty)$

تست ۲: تابع  $f(x) = x^3 - 3x^2$  در نزدیکی  $x = 1$  به ازای مقادیر کمتر و بیشتر از آن: (سراسری ریاضی ۸۳)

- الف) صعودی و صعودی      ب) نزولی و نزولی      ج) نزولی و صعودی      د) صعودی و نزولی

تست ۳: تابع  $f(x) = x^3 - 3x^2$  در کدام فاصله اکیداً صعودی است؟ (آزاد پژوهشی ۸۵)

- الف)  $-1 < x < 1$       ب)  $1 < x < 2$       ج)  $-1 < x < -1$       د)  $x < 1$

تست ۴: نمودار تابع  $f(x) = (x - 1)^3(x + 1)$  در کدام فاصله نزولی است؟

- الف)  $x \leq -\frac{1}{2}$       ب)  $x \geq \frac{1}{2}$       ج)  $x \leq 1$       د)  $x \geq -1$

تست ۵: با چه شرطی تابع  $f(x) = ax^3 + bx^2 + 1$  اکیداً صعودی است؟

- الف)  $a > 0, b = 0$       ب)  $a = 0, b > 0$       ج)  $a \neq 0, b = 0$       د)  $ab = -1$

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکترهم م

نکته: اگر تابعی مجانب قائم (ریشهٔ مخرج  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ ) داشته باشد نه صعودی و نه نزولی است. به نمودار توابع زیر که شامل مجانب قائم هستند دقت کنید:

$$1) f(x) = \frac{1}{x-1}$$

$$2) g(x) = \cot x$$

تست ۶: کدام تابع در بازه  $[1, 2]$  یکنواست؟

y =  $\frac{x-1}{5x+7}$  (د)

y =  $\frac{x}{2x-3}$  (ج)

y =  $\frac{x-1}{2x+1}$  (ب)

y =  $\frac{x-1}{x}$  (الف)

تست ۷: نمودار تابع با ضابطه  $y = \frac{x}{1-x^2}$  بر کدام بازهٔ صعودی است؟ (سراسری تجربی ۸۰)

(۰, ۲) (د)

(-۲, ۲) (ج)

(-۲, ۰) (ب)

(-∞, -۲) (الف)

تست ۸: تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{-1}{x}$  در کدام بازهٔ اکیداً صعودی است؟

۴) همهٔ موارد

[۰, ۴) (۳)

(-۲, ۰) (۲)

(-۱, ۱) (۱)

تست ۹: کدام گزینه در مورد تابع  $f(x) = \sin x + \cos x$  در فاصله  $[0, \frac{\pi}{2}]$  درست است؟

د) ابتدا نزولی سپس صعودی

ج) ابتدا صعودی سپس نزولی

ب) همواره نزولی

الف) همواره صعودی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکترهم ها

نکته: توابع غیریکبهیک ( و ثابت ) مطمئناً اکیداً یکنوا نیستند.

تذکر: هر تابع اکیداً یکنوا را می توان یکنوا نیز در نظر گرفت ولی عکس آن لزوماً درست نیست.

تست ۱۰: تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$  فقط در بازه  $(a, b)$  اکیداً صعودی است. مقدار  $a - b$  کدام است؟

۴ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

 $\frac{1}{2}$  (۱)

تست ۱۱: اگر  $f(x) = \frac{\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{4}x^3}{x^3}$  فقط در بازه  $(\frac{1}{2}, +\infty)$  نزولی باشد. مقدار  $a$  کدام است؟

-۱ (۴)

۳ (۳)

-۳ (۲)

۱ (۱)

تست ۱۲: هرگاه تابع  $f(x) = mx^3 - 3x^2 + x$  همواره صعودی باشد، حدود  $m$  کدام است؟

۵)  $m < -3$ ج)  $m < 3$ ب)  $m \leq 3$ الف)  $m \geq 3$ 

تست ۱۳: تابع  $f(x) = x^3 + ax^2$  همواره صعودی است. حدود تغییرات  $a$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۲)

۵)  $|a| \leq 2$ ج)  $|a| \leq \sqrt{3}$ ب)  $-\sqrt{3} \leq a < 2$ الف)  $-2 < a \leq 0$ 

تست ۱۴: تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{ax - 2}{x + a - 3}$  اکیداً صعودی است. بازه مقادیر  $a$  کدام است؟

۴)  $(-\infty, 1)$ ۳)  $[2, +\infty)$ ۲)  $(-\infty, 1]$ ۱)  $(2, +\infty)$

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکترهم ها

تست ۱۵: به ازای چند مقدار صحیح  $m$  تابع با ضابطه  $f(x) = -x^3 + mx^2 - 3x$  بر کل  $\mathbb{R}$  نزولی است؟

۹) ۴

۷) ۳

۵) ۲

۳) ۱

تست ۱۶: در کدام فاصله تابع  $y = x + \frac{4}{x^2}$  صعودی است؟

- (الف)  $(-\infty, 0)$ ,  $[2, \infty)$       (ب)  $(-\infty, 2)$ ,  $(0, \infty)$       (ج)  $(-\infty, 2)$       (د)  $(0, \infty)$

\*تست ۱۷: تابع  $y = \sin^x x - \sin x$  در بازه  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$  کدام وضعیت را دارد؟

- (الف) صعودی      (ب) نزولی      (ج) صعودی و نزولی      (د) نزولی و صعودی

\*تست ۱۸: در تابع  $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$  کدام درست است؟

(الف)  $f$  بر  $[1, 3]$  صعودی است.

(ب)  $f$  بر  $(0, 3)$  صعودی است.

(ج)  $f$  بر  $(1, -\infty)$  صعودی است.

(د)  $f$  بر  $(1, \infty)$  نزولی است.

\*تست ۱۹: به ازای چه مقدار از  $b$  تابع  $f(x) = \sin x - bx + c$  همواره نزولی است؟

(الف)  $b \geq 1$

(ب)  $b \leq 1$

(ج)  $b > 4$

(د)  $b \leq 0$



## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

**درس اول : یکنواخت و اکترهم ها**

تست ۲۰ : تابع  $f(x) = x^3 - 2x$  با دامنه  $\{x : |x| < 1\}$  همواره چگونه است؟ (سراسری ریاضی ۹۱)

- الف) نزولی      ب) مثبت      ج) صعودی      د) منفی

نکته: همواره این مطلب را مدنظر داشته باشید که رسم نمودار تابع در اولویت قرار دارد، پس در صورت امکان با رسم نمودار به بررسی یکنواختی تابع بپردازید. بویژه در مرز توابع چندضابطه‌ای به تغییرات یکنواختی توجه کنید.

تست ۲۱ : در تابع  $f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & x \leq 0 \\ 2 - x^3 & x > 0 \end{cases}$  کدام درست است؟

- الف) بر دامنه اش اکیداً نزولی است .      ب)  $f$  بر دامنه اش غیر یکنوا است .

ج)  $f$  بر دامنه اش نزولی است .      د)  $f$  بر  $(1, \infty]$  صعودی است .

تست ۲۲ : تابع  $f(x) = \begin{cases} x^3 - 1 & x \geq 0 \\ (1+x)^3 & x < 0 \end{cases}$  در کدام بازه صعودی است؟

- (۰, ۲) (۴)      (-۲, ۱) (۳)      (-۱, ۲) (۲)      (-۱, ۱) (۱)

نکته: در مواردی با ایجاد مجھول در توابع چندضابطه‌ای به بررسی یکنواختی می‌پردازیم.

تست ۲۳ : تابع  $f(x) = \begin{cases} 2 + 3x & x \geq 0 \\ x + a & x < 0 \end{cases}$  اکیداً صعودی است. حدود  $a$  کدام است؟

- الف)  $a \leq 2$       ب)  $a \geq 2$       ج)  $a \leq \frac{3}{2}$       ج)  $a \geq \frac{3}{2}$

تست ۲۴ : به ازای کدام مقدار  $m$  تابع  $f(x) = \begin{cases} 4x + 4 & x \geq 1 \\ 3x + m & x < 1 \end{cases}$  اکیداً صعودی است؟

- (۱)  $m \leq 5$       (۲)  $m \geq \frac{5}{3}$       (۳)  $m \leq 5$  هیچ مقدار  $m$  (۴)

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکترهم ها

نکته: در ترکیب توابع می‌توان یکنواختی را بر اساس علامت‌های  $+/-$  در نظر گرفت. بطوریکه اگر  $f, g$ ، هر دو صعودی باشند آنگاه  $fog$  یا  $gof$  صعودی  $((+)(+)=+)$ ، اگر یکی صعودی و دیگری نزولی باشد آنگاه  $(-)(+)(-)=-$ . در نهایت اگر هر دو نزولی باشند آنگاه:  $((-)(-)=+)$ .

به عنوان مثال چون دو تابع  $x = \sqrt{\log x}$  و  $f(x) = \log x$  هر دو صعودی‌اند، پس ترکیب آن‌ها یعنی  $\sqrt{\log x}$  صعودی خواهد بود.

تست ۲۵: اگر  $f(x) = x^3$ ، آنگاه با کدام انتخاب تابع  $g$ ، تابع مرکب  $f(g(x))$  نزولی است؟

$$\sin x \quad (4)$$

$$x + [x] \quad (3)$$

$$\frac{1-x}{2} \quad (2)$$

$$\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^x} \quad (1)$$

تست‌های جمع‌بندی یکنواختی:

تست ۲۶: به ازای کدام مقادیر  $x$ ، نمودار تابع  $y = 1 - 4x^4$  صعودی اکید است؟

$$\frac{-1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \quad (4)$$

$$-2 \leq x \leq 2 \quad (3)$$

$$x \geq 0 \quad (2)$$

$$x \leq 0 \quad (1)$$

تست ۲۷: تابع  $f(x) = x^4 - 4x^3$  در کدام بازه صعودی است؟

$$(-10, 0) \quad (4)$$

$$(-6, 1) \quad (3)$$

$$(-4, 3) \quad (2)$$

$$(5, 10) \quad (1)$$

تست ۲۸: تابع  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 14$  در بازه  $(a, b)$  اکیداً نزولی است. حداقل مقدار  $a - b$  کدام است؟

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس اول : یکنواخت و اکترهم ها

تست ۲۹: نمودار تابع  $f(x) = x^3 - 12x$  شبیه کدام گزینه زیر است؟



تست ۳۰: تابع با ضابطه  $f(x) = x^3 - 2x - 3$  با دامنه  $\{x : |x - 1| < 2\}$  همواره چگونه است؟

- (۱) نزولی      (۲) مثبت      (۳) صعودی      (۴) منفی

تست ۳۱: تابع  $f(x) = \begin{cases} x^3 - 1 & x \geq 0 \\ x + 1 & x < 0 \end{cases}$  چگونه است؟

- (۱) صعودی      (۲) نزولی      (۳) غیریکنوا      (۴) معکوس پذیر

تست ۳۲: تابع  $f(x) = \frac{3x - 5}{2 - x}$  روی کدام بازه اکیداً صعودی است؟

- (۱)  $(-\infty, +\infty)$       (۲)  $(0, +\infty)$       (۳)  $(2, +\infty)$       (۴)  $(-2, 3)$

مرکز مشاوره تحصیلی


تست ۳۳: نمودار تابع با ضابطه  $f(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x$  در نقطه  $x = 1$  کدام وضع را با محور  $x$  ها دارد؟



## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس اول : یکنواخت و اکترهم ها

تست ۳۴: نمودار تابع  $f(x) = \frac{x^3}{x-1}$  در حوالی مبدا مختصات چگونه است؟



تست ۳۵: تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = x^3 + ax^2$  در تمام دامنه اش اکیداً صعودی است. حدود تغییرات  $a$  کدام است؟

$$-2 \leq a \leq 2 \quad (4)$$

$$-\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3} \quad (3)$$

$$-\sqrt{3} \leq a \leq 2 \quad (2)$$

$$0 \leq a \leq 2 \quad (1)$$

تست ۳۶: تابع  $f(x) = \frac{5}{x^2 - 2x}$  روی کدام بازه یکنوا است؟

$$(2, 3) \quad (4)$$

$$(0, 2) \quad (3)$$

$$(-1, 1) \quad (2)$$

$$(1, 3) \quad (1)$$

تست ۳۷: اگر  $f$  اکیداً صعودی و  $g$  اکیداً نزولی باشد، توابع  $(-f) \circ g$  و  $f \circ g$  به ترتیب چگونه اند؟

(۱) اکیداً صعودی - اکیداً نزولی

(۲) اکیداً نزولی - اکیداً صعودی

(۳) اکیداً صعودی - اکیداً نزولی

(۴) اکیداً نزولی - اکیداً نزولی

تست ۳۸: اگر  $f(x) = \tan x$  و  $g(x) = -2x + 1$ ،  $gof(x) = \frac{-\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  چگونه است؟

(۱) صعودی      (۲) نزولی      (۳) ابتدا صعودی و سپس نزولی      (۴) ابتدا نزولی و سپس صعودی

**دییر ریاضی : عادل آخکندي**

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۳۹:  $f(x)$  تابعی نزولی است. در بین توابع  $f(x), fof(x), f(x^3), f(-x)$  چند تابع صعودی‌اند؟

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

### ۲ نقاط اکسترمم

#### ۱.۲ اکسترمم‌های نسبی


سوال ۳: اکسترمم‌های نسبی تابع  $y = \sin x$  را در بازه  $[0, 2\pi]$  بدست آورید.

سوال ۴: کلیه نقاط دامنه تابع  $[x] = y$  را از نظر اکسترمم‌های نسبی بررسی کنید.

سوال ۵: نقاط اکسترمم نسبی تابع  $y = \frac{1}{x}$ ,  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = 2x - 3$ ,  $y = x^3$  را در صورت وجود بیابید.

سوال ۶: اکسترمم‌های نسبی تابع  $x^{[x]} = y$  را در نقاط  $x = -1$  و  $x = 0$  بدست آورید.\*

تست ۴۰: شکل مقابل نمودار تابع  $f$  در بازه  $[a, b]$  است، تعداد نقاط اکسترمم نسبی  $f$  کدام است؟ (ریاضی داخل ۸۰)



۴) ۵

۳) ۳

ج) ۱

۲) ۲


الف) ۱

دبير رياضي : عادل آخوندي

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۴۱ : با توجه به نمودار  $f$ ، این تابع چند نقطه اکسترمم نسبی دارد؟



۳ (۱)      ۴ (۲)

۵ (۳)      ۶ (۴)

تست ۴۲ : چندتا از توابع مقابل  $\min$  نسبی دارند؟

$$y = |x - 2|, \quad y = -x^2, \quad y = x|x|, \quad y = x + |x|, \quad y = \frac{1}{x}$$

۵ (۴)      ۴ (۳)      ۳ (۲)      ۲ (۱)

تست ۴۳ : اگر تابع  $f$  در نقطه  $c$  دارای ماقسیمم نسبی باشد، الزاماً تابع  $f$  چگونه است؟

(۱) در  $c$  پیوسته است.       $f'(c) = +\infty$

(۲) در  $c$  مشتق‌پذیر است.      در همسایگی  $c$  تعریف شده است.

تست ۴۴ : کدام نقطه یا نقاط در نمودار تابع  $f(x) = x - |x - 1|$  فقط ماقزیمم نسبی است؟

$x < 1$  (۴)

$x = 1$  (۳)

$x > 1$  (۲)

$x \geq 1$  (۱)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x > 1 \\ k & x = 1 \\ x^2 - 2 & x < 1 \end{cases}$$

تست ۴۵ : در تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x > 1 \\ k & x = 1 \\ x^2 - 2 & x < 1 \end{cases}$  به ازای کدام مقدار  $k$ ، ماقزیمم نسبی داریم؟

$k < -1$  (۴)

$-1 < k < 2$  (۳)

$k > 2$  (۲)

$k \geq 2$  (۱)

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

**درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها**

تست ۴۶ : تابع  $y = x - [x]$  بر روی کدام مجموعه نقاط، دارای مینیمم نسبی است؟

$\mathbb{Z}$  (د)

$\emptyset$  (ج)

$\mathbb{R} - \mathbb{Z}$  (ب)

$\mathbb{N} \cup \{0\}$  (الف)

\*تست ۴۷ : اگر  $x = f(x) = 2^x$  و  $g(x) = [x] - x$  ، آنگاه تابع  $gof$  از نظر اکسترمم نسبی کدام نوع را دارد؟ (ریاضی ۹۱)

الف) ماقزیم - می نیم      ب) فاقد ماقزیم - می نیم      ج) ماقزیم - فاقد می نیم      د) فاقد ماقزیم و می نیم

سوال ۷: نقاط تابع ثابت  $c$  را از نظر اکسترمم نسبی بودن بررسی کنید.

سوال ۸: تابعی مثال بزنید که بی شمار اکسترمم نسبی داشته باشد.

مرکز مشاوره تحصیلی  
علیرضا افشار

دبیر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

### ۲.۱ آزمون مشتق اول

**سوال ۹:** اکسترمم های نسبی تابع  $f(x) = x^3 - 3x$  را در صورت وجود بیابید. (در نهایت نمودار تابع را رسم کنید.)

**سوال ۱۰:** اکسترمم های نسبی تابع  $g(x) = x^3$  را بیابید.

**سوال ۱۱:** ماکزیمم و مینیمم نسبی توابع زیر را در صورت وجود بیابید.

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 30$$

و

$$g(x) = 3x^5 - 25x^3 + 60x + 10$$

**سوال ۱۲:** تابع  $y = \sin x - \cos x$  در بازه  $\left(0, \frac{5\pi}{2}\right)$  چند نقطه اکسترمم نسبی دارد؟\*

تست ۴۸ : در نمودار  $f(x) = x^3 - 12x + 4$ ، عرض نقطه ماکزیمم نسبی کدام است؟

۲۲ (۴)

۲۰ (۳)

۱۶ (۲)

۱۴ (۱)

خراموش نکنید که: در تابع مشتق پذیر اگر نقطه  $(a, b)$  اکسترمم نسبی باشد آنگاه  $f'(a) = 0$  و  $f''(a) \in \mathbb{R}$

**سوال ۱۳:** ضرایب  $a$  و  $b$  را چنان تعیین کنید که تابع با ضابطه  $y = x^3 + ax^2 + b$  در  $(2, 3)$  یک ماکزیمم یا مینیمم نسبی داشته باشد.

**سوال ۱۴:** ضرایب  $a$  و  $b$  و  $c$  را چنان تعیین کنید که تابع با ضابطه  $y = ax^3 + bx^2 + c$  در  $x = 1$  دارای مقدار ماکزیمم نسبی ۷ باشد و از نقطه  $(-2, -2)$  بگذرد.

دبیر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۴۹ : تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{a}{x} + bx^2$  در  $(-2, 1)$  اکسترمم دارد. عدد  $a$  و نوع اکسترمم کدام است؟

$\frac{-4}{3}$  ، مینیمم

$\frac{-4}{3}$  ، ماکزیمم

$\frac{-2}{3}$  ، مینیمم

$\frac{-2}{3}$  ، ماکزیمم

\*تست ۵۰ : نقطه مینیمم تابع  $f(x) = a \cos 2x + b \sin x$  باشد. مقدار  $a$  کدام است؟ (ت ۸۹)

-۲ (۵)

-۱ (ج)

۱ (ب)

-۴ (الف)

تست ۵۱ : به ازای مقداری از  $k$  تابع با ضابطه  $y = \frac{x+k}{x^2}$  در نقطه با طول ۲ اکسترمم دارد. مقدار  $k$  چند برابر عرض این

اکسترمم است؟


-۴ (۴)

-۳ (۳)

-۲ (۲)

-۱ (۱)

تست ۵۲ : شکل روبرو قسمتی از نمودار تابع  $f(x) = \frac{x^4 + ax + c}{x + b}$  است. مقدار ماکزیمم نسبی کدام است؟



۱ (۴)

۰ (۳)

-۲ (۲)

-۱ (۱)

تست ۵۳ : در مورد تابع  $y = x^4 + 2x^2 + 1$  کدام گزینه درست است؟

۲) فقط یک ماکزیمم نسبی دارد.

۱) فقط یک مینیمم نسبی دارد.

۴) یک مینیمم نسبی و دو ماکزیمم نسبی دارد.

۳) یک ماکزیمم نسبی و دو مینیمم نسبی دارد.

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۵۴ : تابع با ضابطه  $f(x) = x^4 - 6x^3 + 8x$  به ترتیب ..... مینیمم نسبی و ..... ماکزیمم نسبی دارد.

(۱) ۲ - ۱

(۳) ۱ - ۱

(۲) ۰ - ۱

(۱) ۱ - ۰

تست ۵۵ : طول نقطه ماکزیمم نسبی تابع با ضابطه  $f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$  کدام است؟

(۴) ۱

(۳) صفر

(۲) -۱

(۱) -۲

تست ۵۶ : فاصله نقاط ماکزیمم و مینیمم نسبی تابع  $y = x^3 - 3x$  از یکدیگر چه قدر است؟

(۴) ۴

(۳) ۲

(۲)  $2\sqrt{5}$ (۱)  $2\sqrt{2}$ 

تست ۵۷ : فاصله نقطه مینیمم تابع  $y = x^3 - 12x + 12$  از مبدأ مختصات کدام است؟

(۴)  $\sqrt{10}$ (۳)  $2\sqrt{5}$ (۲)  $4\sqrt{5}$ (۱)  $\sqrt{5}$ 

تست ۵۸ : مشتق تابع در هر نقطه از آن به صورت  $f'(x) = (x - x^3)(x + 1)$  است. این تابع چند ماکزیمم نسبی دارد؟

(۴) ۳

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر

تست ۵۹ : تابع  $y = \frac{x+1}{x^2 - 2x}$  چند نقطه اکسترمم نسبی دارد؟

(۴) ۳

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۶۰ : عرض نقطهٔ ماکزیمم نسبی تابع با ضابطهٔ  $y = \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3}$  کدام است؟

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱)  $\frac{1}{2}$ 

تست ۶۱ : حاصل ضرب مقادیر اکسترمم‌های تابع  $y = \frac{x}{1+x^2}$  کدام است؟

- $\frac{1}{2}$  ۴)- $\frac{1}{4}$  ۳)- $2\sqrt{2}$  ۲)

-۲ ۱)

تست ۶۲ : ماکزیمم نسبی تابع  $y = \frac{x^2 + x + 1}{x}$  در کدام ناحیهٔ دستگاه مختصات قرار دارد؟

۴) چهارم

۳) سوم

۲) دوم

۱) اول

تست ۶۳ : دربارهٔ اکسترمم نسبی تابع  $y = x - \sqrt{2x-1}$  کدام گزینهٔ درست است؟

۲) مینیمم نسبی به عرض صفر دارد.

۱) ماکزیمم نسبی به عرض صفر دارد.

۴) مینیمم نسبی به عرض ۱ دارد.

۳) ماکزیمم نسبی به عرض ۱ دارد.

تست ۶۴ : تابع  $y = x^3 + ax + b$  در نقطهٔ (۲, ۳) دارای مینیمم نسبی است.  $a + b$  کدام است؟

۵) ۴

۴) ۳

۶) ۲

۷) ۱

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۶۵ : اگر نقطه  $(-3, 2)$  اکسترمم نسبی تابع  $f(x) = mx^4 + nx^2 + bx$  باشد، مجموع ریشه های  $f$  کدام است؟

(۴) -۴

(۳) ۴

(۲) -۲

(۱) ۲

تست ۶۶ : دو نقطه به طول های  $3$  و  $5$ - نقاطی از تابع با ضابطه  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$  هستند که مشتق در انها برابر صفر است. مقدار مینیمم نسبی این تابع، کدام است؟

(۴) -۷۵

(۳) -۵۷

(۲) -۸۱

(۱) -۸۴

تست ۶۷ : به ازای چند مقدار صحیح  $a$ ، تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x + a}$  اکسترمم نسبی ندارد؟


(۴) ۳

(۳) ۲


(۲) ۱

(۱) صفر

تست ۶۸ : شکل مقابل، نمودار مشتق تابع پیوسته  $f$  را نشان می دهد. تابع  $f$  در کدام بازه اکیداً نزولی است؟


(۲)  $(-\infty, 2)$ (۱)  $(-\infty, 0)$ (۴)  $(0, 2)$ (۳)  $(2, 4)$ 

تست ۶۹ : اگر نمودار مشتق تابع  $f$  به صورت مقابل باشد، نمودار تابع  $f$  در ..... دارای ..... است.

(۳)  $x = 1$ ، مکزیمم نسبی(۱)  $x = 1$ ، مینیمم نسبی(۴)  $x = 0$ ، مکزیمم نسبی(۲)  $x = -2$ ، مکزیمم نسبی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول: یکنواخت و اکسترمم ها



تست ۷۰: شکل روبرو نمودار تابع  $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+1}$  کدام است؟

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| $\frac{3}{2}$ (۲) | ۱ (۱)             |
| $\frac{3}{4}$ (۴) | $\frac{5}{4}$ (۳) |

### ۳ نقطه بحرانی

سوال ۱۶: نقاط بحرانی تابع  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 60$  را بیابید.

سوال ۱۷: تعداد نقاط بحرانی هر کدام از توابع زیر را بیابید.

$$f(x) = \frac{x^4}{4} - x^3, \quad g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x > 1 \\ 3x - 1 & x \leq 1 \end{cases}, \quad h(x) = |x^2 - 2x|, \quad k(x) = \sqrt[3]{|x|}$$

سوال ۱۸: تابع  $|x - 1| + |x| = y$  چند نقطه بحرانی دارد؟

سول: در تابع  $f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$  نقاط بحرانی را بیابید.

سوال ۱۹: نقاط بحرانی تابع  $y = |\sin x|$  را در فاصله  $[\pi, 2\pi]$  مشخص کنید.

دبیر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

**درس اول : یکنواخت و اکترهم ها**

**سوال ۲۰ :** نقاط بحرانی تابع  $|x| - y = 0$  را در دامنه آن مشخص کنید.

**سوال ۲۱ :** نقاط بحرانی تابع  $|x^2 - y| = 0$  را در دامنه آن مشخص کنید.

**تست ۷۱ :** چندتا از توابع مقابل نقطه بحرانی دارند؟

$$f_1(x) = x^2, \quad f_2(x) = \frac{1}{x}, \quad f_3(x) = \log x, \quad f_4(x) = x^3 + x$$

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

۰ (۱)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & x < -1 \\ bx + 2 & x \geq -1 \end{cases}$$

**تست ۷۲ :** تابع با ضابطه

-۱۲ (۴)

-۶ (۳)

-۳ (۲)

-۲ (۱)

نکته: در توابعی که مشتق آنها به صورت کسری است، ریشه های صورت و مخرج را بررسی کنید.

**تست ۷۳ :** طول دو نقطه بحرانی تابع با ضابطه  $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x}$ ، چه قدر اختلاف دارند؟

$\frac{2}{3}$  (۴)

$\frac{1}{3}$  (۳)

$\frac{1}{4}$  (۲)

۱ (۱)

**دبیر ریاضی : عادل آخوندی**

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

**درس اول : یکنواخت و اکترهم ها**

تست ۷۴ : مجموع طول نقاط بحرانی تابع با ضابطه  $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 3x + 1}$  کدام است؟

(۴) ۴ / ۵

(۳) ۳ / ۵

(۲) ۲ / ۵

(۱) ۱ / ۵

تست ۷۵ : سه نقطه بحرانی در تابع  $f(x) = |x^2 + 4x - 1|$  رئوس یک مثلث‌اند. مساحت این مثلث کدام است؟

(۴)  $4\sqrt{5}$ (۳)  $5\sqrt{5}$ (۲)  $2\sqrt{5}$ (۱)  $10\sqrt{5}$ 

\*سوال ۲۲ : نقاط بحرانی تابع  $y = x^{\frac{6}{5}} - 12x^{\frac{1}{5}}$  روی بازه  $[1, 1]$  کدام است؟ (در صورت داشتن وقت کافی بررسی شود).

تست ۷۶ : در تابع  $f(x) = (x - 2)x^{\frac{2}{3}}$ ، مجموعه طول نقاط بحرانی  $\{\alpha, \beta\}$  است. حاصل  $\alpha^2 + \beta^2$  کدام است؟

(۴)  $0 / 36$ (۳)  $0 / 64$ (۲)  $\frac{4}{9}$ 

(۱) ۴


تست ۷۷ : تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + a}}$  نقطه بحرانی دارد. حدود  $a$  کدام است؟

(۴)  $[1, +\infty)$ (۳)  $(1, +\infty)$ (۲)  $\{1\}$ (۱)  $\mathbb{R}$

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۷۸: با توجه به نمودار مقابل، تابع  $f$  ..... نقطه بحرانی و ..... اکسترمم نسبی دارد.



ب) سه - سه

الف) شش - سه

د) سه - چهار

ج) شش - چهار

تست ۷۹: نقاط بحرانی تابع  $y = x^3(x - 2)^2$  راس های یک مثلث اند. نوع این مثلث کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۵)

ب) فقط قائم الزاویه

الف) متساوی الاضلاع

د) قائم الزاویه و متساوی الساقین

ج) فقط متساوی الساقین

تست ۸۰: تعداد نقاط بحرانی تابع  $f(x) = \sqrt{4 - x^3}$  کدام است؟

د) صفر

ج) ۳

ب) ۲

الف) ۱

\*تست ۸۱: مجموع طول های نقطه بحرانی تابع  $y = (x^3 - 3x^2 + 4)^{\frac{1}{2}}$  کدام است؟

د) صفر

ج) ۲

ب) ۱

الف) ۰

تست ۸۲: اگر تابع  $|y| = |x^3 + ax + 1|$  ، سه نقطه بحرانی داشته باشد. حدود  $a$  کدام است؟

د) هیچ مقدار

ج)  $a \in R$

ب)  $|a| < 2$

الف)  $|a| > 2$



دیبر ریاضی : عادل آخوندی


## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس اول: یکنواخت و اکترهم ها

تست ۸۳ : تعداد نقاط بحرانی تابع  $| \sin x | = y$  بر بازه  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۲)

- الف) ۲      ب) ۳      ج) ۴      د) ۵

تست ۸۴ : با توجه به نمودار  $f$ ، تعداد نقاط بحرانی نمودار  $|f(x)|$  کدام است؟



- الف) ۱      ب) ۲      ج) ۳      د) بیشمار

\* تست ۸۵ : به ازای کدام مقدار  $k$ ، منحنی تابع  $f(x) = (x - k) |x - 1|$  فقط یک نقطه بحرانی دارد؟

- الف)  $\mathbb{R}$  (۱)      ب)  $\{1\}$  (۲)      ج)  $(1, +\infty)$  (۳)      د)  $[1, +\infty)$  (۴)

\* تست ۸۶ : نمودار تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} x^3 - 6x & x \geq 1 \\ -5x & x < 1 \end{cases}$  چند نقطه بحرانی دارد؟

- الف) ۲      ب) ۳      ج) ۱      د) صفر

مرکز مشاوره تحصیلی

\* تست ۸۷ : تعداد نقاط بحرانی تابع  $y = x|x^2 - 2|$  روی بازه  $[-2, 2]$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۷)


- الف) ۳      ب) ۴      ج) ۵      د) ۶

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

**درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها**

\* تست ۸۸ : تعداد نقاط بحرانی تابع  $|x^3 - x|$  روی بازه  $[1, 2]$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۹۰)

- الف) ۳      ب) ۴      ج) ۵      د) ۶



تست ۸۹ : در نمودار مقابل چند نقطه بحرانی وجود دارد؟

- ۷ (۴)      ۶ (۳)      ۵ (۲)      ۴ (۱)

تست ۹۰ : تابع  $f(x) = x^4 + 2x^2 - x + 1$  چند نقطه بحرانی دارد؟

- ۳ (۴)      ۲ (۳)      ۱ (۲)      ۰ (۱) صفر

تست ۹۱ : تابع  $f(x) = -x + \sqrt{x}$  در بازه  $[-1, 8]$  چند نقطه بحرانی دارد؟

- ۳ (۴)      ۲ (۳)      ۱ (۲)      ۰ (۱) صفر

تست ۹۲ : تابع  $f(x) = 4x^3 - 12x$  در بازه  $[0, 4]$  چند نقطه بحرانی دارد؟

- ۳ (۴)      ۲ (۳)      ۱ (۲)      ۰ (۱) صفر

تست ۹۳ : تابع  $f(x) = \begin{cases} x - 1 & x < 0 \\ 2x^2 - x & x \geq 0 \end{cases}$  چند نقطه بحرانی دارد؟

- ۴ (۴)      ۳ (۳)      ۲ (۲)      ۰ (۱) صفر

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس اول : یکنواخت و اکترهم ها

تست ۹۴ : منحنی نمایش تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x & x \geq 1 \\ x^3 + x - 5 & x < 1 \end{cases}$  چند نقطه بحرانی دارد؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۲) صفر

۱ (۱)

تست ۹۵ : مجموعه طول نقاط بحرانی تابع  $f(x) = x(x - 4)^3$  کدام است؟

{1, 4} (۴)

{0, 1, 4} (۳)

{0, 1} (۲)

{0, 4} (۱)

تست ۹۶ : تابع  $y = |x^2 - 1|$  چند نقطه بحرانی دارد؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

تست ۹۷ : مجموعه طول نقاط بحرانی  $f(x) = |x^2 - 4x|$  کدام است؟

{0, 2, 4} (۴)

{2, 4} (۳)

{2} (۲)

{0, 4} (۱)

تست ۹۸ : تابع  $f(x) = ||x| - 2|$  چند نقطه بحرانی دارد؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

دبیر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

**درس اول : یکنواخت و اکترهم ها**

تست ۹۹ : تابع  $f(x) = |x|(x - 4)$  چند نقطه بحرانی دارد؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

تست ۱۰۰ : مجموعه طول های نقاط بحرانی تابع با ضابطه  $f(x) = |x - 2|\sqrt[3]{x}$  کدام است؟

$\left\{ \frac{1}{3}, 2 \right\}$  (۴)

$\{0, 1\}$  (۳)

$\{0, \frac{2}{3}, 2\}$  (۲)

$\{0, \frac{1}{2}, 2\}$  (۱)

تست ۱۰۱ : مساحت مثلثی که رأس های آن نقاط بحرانی تابع  $f(x) = |x^2 - x|$  است، چند است؟

$\frac{1}{16}$  (۴)

$\frac{1}{8}$  (۳)

$\frac{1}{4}$  (۲)

$\frac{1}{2}$  (۱)

تست ۱۰۲ : طول نقاط بحرانی تابع  $f(x) = x^{\frac{4}{3}} - x^{\frac{2}{3}}$  در بازه  $(-1, 1)$  کدام است؟

$-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}$  (۴)

$-\frac{\sqrt{2}}{4}, 0, \frac{\sqrt{2}}{4}$  (۳)

$-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}$  (۲)

$-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}$  (۱)

تست ۱۰۳ : مجموعه طول نقاط بحرانی تابع با ضابطه  $f(x) = (x^2 - 28)\sqrt[3]{x}$  کدام است؟

$\{-7, 0, 1\}$  (۴)

$\{-2, 0, 2\}$  (۳)

$\{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\}$  (۲)

$\{-2, 2\}$  (۱)

**دیپر ریاضی : عادل آخوندی**

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

**درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها**

تست ۱۰۴ : مجموع طول های نقاط بحرانی تابع  $y = \sqrt[3]{x^3 - 2x^2}$  کدام است؟

$\frac{13}{3}$  (۴)

$\frac{10}{3}$  (۳)

$\frac{7}{3}$  (۲)

$\frac{4}{3}$  (۱)

تست ۱۰۵ : فاصله بین دو نقطه بحرانی تابع  $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$  بر بازه  $(-2, 2)$  چند برابر  $\sqrt{6}$  است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

$\sqrt{2}$  (۲)

۲ (۱)

### ۱.۳ اکسترمم های مطلق

تست ۱۰۶ : با توجه به نمودار، کدام تابع ماکزیمم مطلق دارد؟

A)  $y = x - [x]$

B)  $y = x^4$

C)  $y = -4^x$

D)  $y = -\log x$

۴) هیچ کدام

C (۳)

D (۲)

A (۱)

تست ۱۰۷ : تابع  $f(x) = x^4 - x$  روی کدام بازه ماکزیمم مطلق ندارد؟

(۰, ۲) (۴)

[-۱, ۲) (۳)

(-۲, ۰) (۲)

[-۱, ۱] (۱)

دبیر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

**سوال ۲۳:** با رسم نمودار تابع  $f(x) = |x^3 - 3x|$  در بازه  $[-3, 2]$  اکسترمم های نسبی و مطلق و نقاط بحرانی آن را مشخص کنید.

**سوال ۲۴:** آیا نمودار تابع  $f(x) = x^3$  در بازه  $(-1, 2)$  دارای اکسترمم مطلق است؟

### ۱.۱.۳ تعیین اکسترمم های مطلق $f$ بر بازه $[a, b]$

**سوال ۲۵ :** مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق توابع زیر را بیابید.

$$y = x^4 - 8x^2 + 16 \quad \text{و} \quad [-1, 4]$$

$$y = x^3 - 3x^2 \quad \text{و} \quad [1, 4]$$

تست ۱۰۸ : بیشترین مقدار تابع  $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$  در بازه  $[-2, 2]$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۹۲)

۱۷

۱۲

۱۰

۹

الف ) ب ) ج ) د )

تست ۱۰۹ : مقدار ماکزیمم و مینیمم تابع با ضابطه  $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 15x - 36$  در بازه  $[-4, 3]$  کدام است؟ (تجربی ۹۵)

۳۶, -۲۷

-۳۶, ۲۷

-۴۵, ۲۷

-۱۸, ۲۴

الف ) ب ) ج ) د )

دیپر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

**درس اول : یکنواخت و اکترهم ها**

**سوال ۲۸ :** به ازای کدام مقدار  $k$  مینیمم تابع  $f(x) = 2x^3 - kx + 5$  برابر ۴ است؟

تست ۱۱۰ : هرگاه در تابع  $f(x) = x^3 - 3x + k$  مقدار ماکزیمم مطلق تابع در  $[0, 2]$  دو برابر مقدار مینیمم مطلق تابع باشد، مقدار  $k$  کدام است؟

- الف ) ۲      ب ) -۲      ج ) ۶      د ) -۶

تست ۱۱۱ : به ازای کدام مقدار  $k$  بیشترین مقدار و کمترین مقدار تابع  $f(x) = x^3 - 3x^2 + k$  در بازه  $[1, 3]$  قرینه یکدیگرند؟ (سراسری ریاضی ۸۴)

- الف ) ۱      ب ) ۲      ج ) ۳      د ) ۴

تست ۱۱۲ : اختلاف ماکسیمم مطلق و مینیمم مطلق تابع  $f(x) = -2x^3 + 3x^2 - 2x$  روی بازه  $[-\frac{1}{2}, 2]$  چقدر است؟

- الف ) ۴      ب ) ۵      ج ) ۶      د ) ۷

تست ۱۱۳ : تابع  $|x^2 - 1|$  بر بازه  $[-2, 2]$  ...

- الف ) مشتق پذیر است و می نیم مطلق دارد .  
 ب ) مشتق پذیر است ولی مینیمم مطلق ندارد .  
 د ) مشتق پذیر نیست و مینیمم مطلق دارد .  
 ج ) مشتق پذیر نیست ولی مینیمم مطلق دارد .

**دیبر ریاضی : عادل آخوندی**

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۱۱۴ : در تابع  $|x - 1| + |x + 1| - |2x - 1|$  مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق کدام‌اند؟

۰, ۲) ۴

۰, ۱) ۳

-۱, ۲) ۲

-۱, ۱) ۱

### ۲.۱.۳ جمع‌بندی درس اول

سوال ۲۷: درستی یا نادرستی هر کدام از جملات زیر را مشخص کنید.

الف) هر نقطه اکسترمم نسبی، بحرانی است؟

ب) هر نقطه بحرانی لزوماً اکسترمم نسبی نیست؟

پ) هر نقطه اکسترمم مطلق در بازه  $[a, b]$  اکسترمم نسبی است؟

ت) هر نقطه اکسترمم مطلق در بازه  $[a, b]$  که دارای همسایگی باشد، اکسترمم نسبی است؟

ث) هر نقطه اکسترمم نسبی، اکسترمم مطلق است؟

ج) تابع  $f$  در بازه  $[a, b]$  حتماً اکسترمم مطلق دارد؟

چ) تابع پیوسته  $f$  در بازه  $(a, b)$  حتماً اکسترمم مطلق دارد؟

دیبر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

ح) تابع پیوسته  $f$  در بازه  $[a, b]$  حتماً اکسترمم مطلق دارد؟

خ) تمام نقاط تابع ثابت در کل دامنه، بحرانی، اکسترمم نسبی و اکسترمم مطلق اند.

د) هر نقطه اکسترمم مطلق یا اکسترمم نسبی، بحرانی است؟

ذ) هر تابع اکیداً یکنوا با دامنه  $\mathbb{R}$  فاقد نقطه بحرانی است؟

ر) هر تابع اکیداً یکنوا با دامنه  $\mathbb{R}$  فاقد نقطه بحرانی است؟

نکته: معمولاً در توابع ناپیوسته اگر بتوان نمودار تابع را رسم کرد می توان ماکزیمم و یا مینیمم مطلق تابع را بدست آورد.

تست ۱۱۵: ماکزیمم مطلق تابع  $|x| = -x$  در بازه  $[-1, 1]$  کدام است؟

- الف) ۱      ب) ۲      ج) ۳      د) ۴

تست ۱۱۶: مقدار مینیمم مطلق تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & -1 \leq x < 0 \\ \sqrt{x} & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$  برابر است با :

- الف) ۱      ب) -۱      ج) صفر      د) ۲

تست ۱۱۷: برای تابع  $f(x) = |x^2 - 1|$  نقطه به طول  $x = 0$  چه نقطه‌ای است؟

- الف) ماکزیمم مطلق      ب) ماکزیمم نسبی      ج) ریشه      د) مینیمم نسبی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۱۱۸: اگر  $C$  طول نقطه اکسترمم مطلق تابع  $f$  روی دامنه آن باشد و تابع در همسایگی آن نقطه تعریف شده باشد الزاماً تابع  $f$  در  $C$  کدام وضعیت را دارد؟ (سراسری ریاضی ۸۸)

- الف) پیوسته      ب) مشتق پذیر      ج) خط مماس افقی      د) اکسترمم نسبی

تست ۱۱۹: اگر  $1$   $f(x) = x^2 + 4x + 1$  و  $g(x) = 2x - 3$ ، کمترین مقدار تابع  $fog$  کدام است؟

- ۲ (۴)      -۳ (۳)      ۵ (۲)      ۴ (۱)

تست ۱۲۰: بهازی کدام مقدار  $k$ ، بیشترین و کمترین مقدار تابع  $f(x) = x^3 - 3x^2 + k$  در بازه  $[1, 3]$  قرینه یکدیگرند؟

- ۴ (۴)      ۳ (۳)      ۲ (۲)      ۱ (۱)

تست ۱۲۱: بیشترین مقدار تابع  $y = x + \frac{9}{x}$  بهازی مقادیر منفی  $x$  کدام است؟

- ۸ (۴)      -۴ (۳)      -۶ (۲)      -۲ (۱)

تست ۱۲۲: بیشترین مقدار تابع  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 3} - 3x$  در بازه  $[0, 4]$  کدام است؟

- ۴) صفر       $\frac{4}{19}$  (۳)       $\frac{1}{2}$  (۲)      ۱ (۱)

تست ۱۲۳: بیشترین مقدار تابع  $y = x - 2\sqrt{x}$  در فاصله  $[0, 3]$  کدام است؟

- ۲ (۴)      -۱ (۳)      ۳ (۲)      ۱) صفر

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس اول : یکنواخت و اکسترمه م

تست ۱۲۴: کمترین مقدار تابع با ضابطه  $f(x) = \sqrt[3]{x} - (2x - 1)$  در فاصله  $[1, 1]$  کدام است؟

- $\frac{8}{3}$  (۴)

- $\frac{4}{3}$  (۳)

- $\frac{3}{8}$  (۲)

- $\frac{3}{4}$  (۱)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 1 \\ -x + 2 & 0 < x < 1 \\ x^2 & x \leq 0 \end{cases}$$

تست ۱۲۵: تابع  $f(x)$

(۲) مینیمم نسبی دارد اما مطلق ندارد.

(۱) ماکزیمم نسبی دارد.

(۴) مینیمم نسبی و مطلق دارد.

(۳) ماکزیمم نسبی و مطلق ندارد.

تست ۱۲۶: ماکزیمم مطلق تابع با ضابطه  $y = -x |x|$  بر  $[-2, 1]$  کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

تست ۱۲۷: اختلاف مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع  $f(x) = |x^2 - 4|$  در بازه  $[-4, 2]$  کدام است؟

۱۵ (۴)

۱۲ (۳)

۹ (۲)

۷ (۱)

تست ۱۲۸: بیشترین مقدار تابع  $f(x) = |x|(x+1)$  در فاصله  $[-2, 1]$  کدام است؟

۴ (۴)

$\frac{1}{4}$  (۳)

۲ (۲)

$\frac{1}{2}$  (۱)

دیبر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس اول: یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۱۲۹: بیشترین مقدار تابع  $y = \left| (x-1)^2 - 8 \right|$  در فاصله  $[-2, 2]$  کدام است؟

۸ (۴)

۶ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

$$f(x) = \begin{cases} |x| - 1 & 0 \leq x \leq 2 \\ -2 \sin \pi x & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

تست ۱۳۰: بیشترین مقدار تابع  $f(x) = \begin{cases} |x| - 1 & 0 \leq x \leq 2 \\ -2 \sin \pi x & 2 < x \leq 3 \end{cases}$  کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

تست ۱۳۱: اگر تابع  $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{x+a}$  دارای اکسترمم نسبی باشد مقادیر  $a$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۵)

- الف)  $0 < a < 2$       ب)  $-2 < a < 0$       ج)  $a > 2$       د)  $a < -2$       یا  $a > 0$

تست ۱۳۲: به ازای چه مقادیری از  $a$  تابع  $y = \frac{x^3 - 3x + a}{x+1}$  فاقد اکسترمم نسبی است؟

- الف)  $a \leq -4$       ب)  $a \geq -4$       ج)  $a > -4$       د)  $a < -4$

تست ۱۳۳: ماکسیمم مطلق تابع  $f(x) = \frac{1}{x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 5}$  کدام است؟ (سراسری تجربی ۸۵)

- الف)  $\frac{1}{6}$       ب)  $\frac{1}{2}$       ج)  $\frac{1}{3}$       د)  $\frac{1}{5}$

دبیر ریاضی: عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

### درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

تست ۱۳۴ : کدام بیان برای تابع  $|x|^x - 3 - f(x) = x|x^x|$  در بازه  $[1, 1]$  نادرست است؟ (سراسری ریاضی ۸۷)

الف) مینیمم مطلق دارد    ب) ماکسیمم مطلق دارد    ج) دو نقطه اکسترمم نسبی دارد    د) فاقد اکسترمم نسبی است

تست ۱۳۵ : تابع  $f(x) = bx^4 + \frac{a}{x}$  در  $(-2, 1)$  دارای اکسترمم نسبی است،  $a$  و نوع اکسترمم کدام است؟ (ریاضی ۸۹)

الف)  $\frac{4}{3}$ - و مینیمم    ب)  $\frac{4}{3}$ - و ماکسیمم    ج)  $\frac{4}{3}$ - و مینیمم    د)  $\frac{4}{3}$ - و ماکسیمم

تست ۱۳۶ : تابع  $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x$  از نظر اکسترمم نسبی کدام وضع را دارد؟ (سراسری ریاضی ۹۰)

الف) مینیمم نسبی	ب) ماکسیمم نسبی
ج) مینیمم نسبی و ماکسیمم نسبی	د) فاقد اکسترمم نسبی

تست ۱۳۷ : اگر تابع  $f(x) = ax^2 + bx + c$  در  $x=1$  دارای مقدار ماکزیمم نسبی ۷ باشد و نمودار تابع از نقطه  $(-2, -2)$  بگذرد، حاصل  $a+b-c$  کدام است؟

الف) ۷    ب) ۱۱    ج) ۱۳    د) ۹۵


تست ۱۳۸ : کمترین مقدار تابع  $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 - 2x^2$  کدام است؟ (تجربی خارج ۹۲)

الف) -۳۶    ب) -۳۲    ج) -۲۴    د) -۱۸

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق


**درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها**

تست ۱۳۹: شکل مقابل نمودار تابع  $y = ax^3 + bx^2 - 16$  است  $a$  کدام است؟ (سراسری تجربی خارج ۸۴)



- الف) -۱      ب)  $\frac{1}{2}$       ج)  $-\frac{1}{2}$       د)  $-\frac{2}{3}$

تست: شکل مقابل نمودار تابع  $y = x^4 + ax^3 + bx^2$  با تعیین مقادیر  $a$  و  $b$  می نیمم تابع کدام است؟




- الف) -۳۶      ب) -۳۲      ج) -۲۷      د) -۲۴

تست ۱۴۰: ماکریم نسبی نمودار  $f$  با ضابطه  $y = -8x + 1$  روی خط ۱ قرار دارد.

مقدار  $a$  کدام است؟

- الف) -۱۵      ب) ۱۱      ج) -۷      د) -۵

تست ۱۴۱: نمودار تابع  $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$  حول مبدأ به کدام صورت است؟ (سراسری تجربی ۹۱)



\*تست ۱۴۲: ماکسیمم تابع  $f(x) = -|x| \cos x$  در بازه  $[-1, 1]$  کدام است؟ (سراسری ریاضی ۸۶)

- الف) صفر      ب)  $\cos 1$       ج) ۱      د)  $\frac{1}{2}$

دیر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

**درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها**

\* تست ۱۴۳ : اگر  $M(2, -1)$  اکسترمم نسبی  $y = \frac{ax+b}{(x-1)(x-4)}$  باشد  $a - b$  کدام است ؟

- الف) ۱ - ب) صفر      ج) ۱ - ۲ ) ۵

\* تست ۱۴۴ : به ازای چه مقدار  $m$  اکسترمم تابع  $y = \frac{x^2 - 4x + m}{x-1}$  روی محور  $x$  ها است ؟

- الف) ۴ - ب) ۳ - ج) ۲ - ۴ ) ۵

\* تست ۱۴۵ : در تابع  $f(x) = ax^2 - b|x|$  اگر تابع در  $x = 1$  دارای  $\min$  برابر ۱ باشد  $a + b$  کدام است ؟

- الف) ۴ - ب) ۳ - ج) ۲ - ۵ ) ۱

\* تست ۱۴۶ : تابع با ضابطه  $y = [2x] - 2x$  :



- الف) ماکزیمم نسبی ندارد و می نیمم نسبی دارد .      ب) ماکزیمم نسبی و می نیمم نسبی دارد .  
 ج) می نیمم نسبی ندارد و ماکزیمم نسبی دارد .      د) ماکزیمم و می نیمم نسبی ندارد .

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق



درس اول : یکنواخت و اکسترمم ها

### ۲.۳ تابع درجه ۳

معادله  $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  تابع درجه سوم نام دارد.



۱- دامنه و برد  $\mathbb{R}$  و مجانب ندارد و در دامنه اش اکسترمم مطلق ندارد.



۲- با توجه به دلتای مشتق ، و علامت  $a$  نمودار یکی از سه حالت رو به رو را دارد :

سوال ۲۹ : نمودار توابع  $f(x) = x^3 - 3x$  ،  $g(x) = x^3 + 2x^2 + 5x$  را رسم کنید.

مرکز مشاوره تحصیلی  
علیرضا افشار

دبیر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس دوم : بهینه سازی



بهینه سازی


درس دوم

### ۴ بهینه سازی


**سوال ۳۱:** اگر قطر یک مستطیل  $2$  باشد، ما کزیم محيط این مستطیل را به دست آورید.

**سوال ۳۲:** دو عدد حقیقی بیابید که تفاضل آنها  $10$  باشد و حاصل ضربشان کمترین مقدار ممکن گردد.

**سوال ۳۳:** ورق فلزی مربع شکلی به طول ضلع  $30\text{ cm}$  را درنظر بگیرید. مطابق شکل می خواهیم از چهارگوشه آن مربع



های کوچکی به ضلع  $x$  برش بزنیم و آنها را کنار بگذاریم. سپس با تا کردن ورق در امتداد خط چین های مشخص شده در شکل، یک جعبه در باز بسازیم. مقدار  $x$  چقدر باشد تا حجم قوطی، حداقل مقدار ممکن گردد؟




دبیر ریاضی : عادل آخوندی

۳۸


## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس دهم : بحث‌های سازی

**سوال ۳۴:** در استوانه‌ای جمع شعاع قاعده و ارتفاع ۶ است. بیشترین حجم این استوانه کدام است؟



**سوال ۳۵:** می خواهیم یک قوطی فلزی استوانه‌ای شکل و در باز بسازیم که گنجایش آن دقیقاً یک لیتر باشد. ابعاد قوطی چقدر باشد تا مقدار فلز به کار رفته در تولید آن مینیمم شود.



**سوال ۳۶:** کشاورزی می خواهد دور یک مزرعه مستطیل شکل به مساحت ثابت ۱۰۰۰۰ متر مربع را دیوارکشی کند. هزینه هر متر دیوارهای شمالی و جنوبی ۲ میلیون تومان و هزینه هر متر دیوارهای شرقی و غربی ۸ میلیون تومان است.

الف) هزینه مورد نیاز برای انجام این کار را به صورت یک تابع بنویسید.


ب) ابعاد مزرعه چقدر باشد تا هزینه دیوارکشی به حداقل مقدار ممکن برسد؟

دبیر ریاضی : عادل آخکندي

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق


### درس دهم : بحثه سازی

**سوال ۳۷:** می خواهیم کنار رودخانه یک محوطه به شکل مثلث متساوی الساقین را نرده کشی کنیم به طوری که قاعده مثلث منطبق بر رودخانه باشد. اگر تنها هزینه ۱۰۰ متر نرده را در اختیار داشته باشیم، در این صورت بیشترین مساحت ممکن برای این مثلث چقدر خواهد بود؟



**سوال ۳۸:** ابعاد مستطیلی با بیشترین مساحت را تعیین کنید که دو راس آن روی محور  $x$  ها و دو راس دیگرش بالای محور  $x$  ها و روی سهمی  $y = 12 - x^2$  باشد.

**سوال ۳۹:** آروین می خواهد به ایستگاه اتوبوسی برود که در ۲۰۰ متری غرب و ۶۰ متری شمال موقعیت فعلی او بعد از پارک قرار دارد. او می تواند با سرعت ۳ متر بر ثانیه از پیاده رو کنار پارک به سمت غرب برود. همچنین، می تواند از درون پارک و تنها با سرعت ۲ متر بر ثانیه، عبور کند. با توجه به شکل، مقدار  $x$  را طوری تعیین کنید که او در کمترین زمان ممکن به ایستگاه ایستگاه اتوبوس برسد.



## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس دهم : بحثه سازی

**سوال ۴۰:** هر صفحه مستطیل شکل از یک کتاب جیبی، شامل یک متن با مساحت ثابت  $32\text{cm}^2$  خواهد بود. هنگام طراحی قطع این کتاب، لازم است حاشیه های بالا و پایینی هر صفحه  $2\text{cm}$  و حاشیه های کناری هر کدام یک سانتی متر در نظر گرفته شوند. ابعاد صفحه را طوری تعیین کنید که مساحت هر صفحه از کتاب کمترین مقدار ممکن باشد.

تست ۱۴۷: اگر  $2x + y = 16$  باشد، بیشترین مقدار  $xy$  کدام است؟

- ۴۲ (۴)                  ۳۲ (۳)                  ۲۸ (۲)                  ۲۴ (۱)

تست ۱۴۸: غلظت یک داروی شیمیایی در جریان خون،  $t$  ساعت پس از تزریق در ماهیچه از رابطه  $C(t) = \frac{3t}{t^3 + 27}$

به دست می آید. اگر  $t$  ساعت پس از تزریق این دارو، غلظت آن در خون، بیشترین مقدار ممکن شود.  $t^3$  کدام است؟


- ۱۴/۵ (۴)                  ۱۴ (۳)                  ۱۳/۵ (۲)                  ۱۳ (۱)

تست ۱۴۹: کمترین فاصله نقطه  $(4, 0)$  از نقاط منحنی به معادله  $y = \sqrt{2x + 9}$  کدام است؟

- ۴ (۴)                  ۳ (۳)                   $2\sqrt{2}$  (۲)                   $\sqrt{5}$  (۱)

تست ۱۵۰: در شکل زیر نقطه  $M(x, y)$  بر روی خط  $y = -\frac{3}{4}x + 6$  متغیر است. از  $M$  عمودهایی بر محورهای مختصات

رسم می کنیم تا یک مستطیل به وجود آید. بیشترین مساحت این مستطیل کدام است؟



- ۱۰ (۴)                  ۸ (۳)                  ۱۴ (۲)                  ۱۲ (۱)

دبیر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس دهم: بحث‌هایی درباره

## ۱.۴ تست‌های جمع‌بندی

تست ۱۵۱: تابع با ضابطه  $y = x^5 - \frac{5}{3}x^3$  در بازه  $(a, b)$  با بزرگترین طول، نزولی است،  $a + b$  کدام است؟

۳ (۴)

۳ صفر

۲ (۲)

۱ (۱)

تست ۱۵۲: اگر  $f(x) = x^3$  و  $g(x) = x^4$ ، آنگاه کدام تابع زیر در  $R$  اکیداً یکنواست؟


gof (۴)

fog (۳)

f - g (۲)

f × g (۱)

تست ۱۵۳: در شکل زیر نمودار تابع  $y = f(x)$  رسم شده است. نمودار  $y = \frac{f(x)}{x^3}$  در این بازه چگونه است؟




۲) همواره نزولی

۱) همواره صعودی

۴) ابتدا نزولی و سپس صعودی

۳) ابتدا صعودی و سپس نزولی

تست ۱۵۴: اگر نمودار تابع  $f$  به صورت زیر باشد، تابع به ترتیب از راست به چپ پند می‌نیمم نسبی و چند ماکزیمم نسبی دارد؟



۱ ، ۱ (۱)

۱ ، ۲ (۲)

۲ ، ۱ (۳)

۲ ، ۲ (۴)

دیبر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس دهم: بحثه سازی


تست ۱۵۵: برای تابع با ضابطه‌ی  $f(x) = \begin{cases} x^3 & , \quad x \neq 0 \\ \frac{1}{x} & , \quad x = 0 \end{cases}$  طول چه نقطه‌ای است؟

۴) مشتق‌پذیری

۳) پیوستگی

۲) ماکزیمم نسبی

۱) مینیمم نسبی



تست ۱۵۶: با توجه به شکل زیر، تابع  $f$  چند نقطه‌ی بحرانی دارد؟

۲) صفر

۱) ۰

۴) بی‌شمار

۱) ۳

تست ۱۵۷: جدول تعیین علامت مشتق تابع پیوسته‌ی  $f$  به صورت زیر است. اگر صفرهای تابع  $f$ ، صفر و ۲ باشند، آنگاه کدام گزینه حتماً نادرست است؟

$x$	$-\infty$	+	۱	$+\infty$
$f'$	-	0	+	0

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$f(-5) = 3 \quad (1)$$

$$f(4) = -2 \quad (4)$$

$$f(3) = 1 \quad (3)$$

تست ۱۵۸: طول نقطه‌ی ماکسیمم نسبی تابع با ضابطه‌ی  $f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$  کدام است؟

۱) ۴

۳) صفر

-۱) ۲

-۲) ۱

تست ۱۵۹: طول نقطه‌ی مینیمم نسبی تابع  $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \dots + (x-21)^2$  کدام است؟

۴) مینیمم نسبی ندارد

۲۱) ۳

۱۱) ۲

۱۰) ۱

دییر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس دهم : بحث‌های زی

تست ۱۶۰: تابع با ضابطه‌ی  $f(x) = x^4 - 8x^2 + 8x$  از نظر اکسترمم نسبی کدام وضع را دارد؟

- (۱) مینیمم نسبی دارد.
- (۲) ماکسیمم نسبی دارد.
- (۳) مینیمم نسبی و ماکسیمم نسبی دارد.
- (۴) فاقد اکسترمم نسبی است.

تست ۱۶۱: اگر  $c$  طول نقطه‌ی اکسترمم مطلق تابع  $f$  روی دامنه‌ی آن باشد و تابع در همسایگی آن نقطه تعريف شهد باشد، الزاماً تابع  $f$  در نقطه‌ی  $c$ ، کدام وضعیت را دارد؟

- (۱) پیوسته
- (۲) مشتق پذیر
- (۳) خط مماس افقی
- (۴) اکسترمم نسبی

تست ۱۶۲: برای تابع با ضابطه‌ی  $f(x) = 3x + |4x - 1|$  وقتی  $x \in (0, 1)$  باشد کدام گزینه درست است؟

- (۱) ماکزیمم مطلق دارد ولی مینیمم مطلق ندارد.
- (۲) مینیمم مطلق دارد ولی ماکزیمم مطلق ندارد.
- (۳) ماکزیمم و مینیمم مطلق ندارد.
- (۴) ماکزیمم و مینیمم مطلق دارد.

مرکز مشاوره تحصیلی

علیرضا افشار

تست ۱۶۳: کدام عدد بین ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع با ضابطه‌ی  $f(x) = \frac{2x}{x+2}$  در بازه‌ی  $[1, 2]$  قرار ندارد؟

- (۱) صفر
- (۲)  $-1$
- (۳)  $-\frac{3}{2}$
- (۴)  $\frac{3}{2}$

دبیر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس دوم: بحث‌هایی درباره

تست ۱۶۴: مینیمم مطلق تابع با ضابطه‌ی  $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2$  روی بازه‌ی  $[1, 3]$  کدام است؟

(۴)  $-\frac{7}{3}$

(۳)  $-\frac{8}{3}$

(۲)  $-\frac{10}{3}$

(۱)  $-\frac{11}{3}$

تست ۱۶۵: کمترین مقدار تابع  $y = \frac{1}{4}x^4 - x^3 - 2x^2$  کدام است؟

(۴)  $-18$

(۳)  $-24$

(۲)  $-32$

(۱)  $-36$

تست ۱۶۶: ماکسیمم مطلق تابع با ضابطه‌ی  $f(x) = \frac{1}{x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 5}$  کدام است؟

(۴)  $\frac{1}{2}$

(۳)  $\frac{1}{3}$

(۲)  $\frac{1}{5}$

(۱)  $\frac{1}{6}$

تست ۱۶۷: از نقطه‌ی  $M$  واقع بر خط  $3x + 6y = 18$  واقع در ناحیه‌ی اول، دو عمود بر محورهای مختصات رسم کرده‌ایم. ماکزیمم مساحت مستطیل پدید آمده با محورهای مختصات کدام است؟

(۴)  $\frac{9}{4}$

(۳)  $\frac{9}{2}$

(۲)  $9$

(۱)  $18$

دبیر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس دهم: بحث‌هایی درباره مشتق

تست ۱۶۸: کوتاه‌ترین فاصله‌ی بین نقاط منحنی به معادله‌ی  $y = \frac{1}{2}x^2 - 2$  و نقطه‌ی ثابت  $(11, 0)$  کدام است؟

(۴) ۶

(۳)  $2\sqrt{2}$ 

(۲) ۵

(۱) ۴

تست ۱۶۹: در کدام نقطه واقع بر منحنی  $y = \frac{1}{1+x^2}$ ، خط مماس، بیش‌ترین شیب را دارد؟

(۴)  $(-\frac{1}{2}, -1)$ (۳)  $(-\frac{4}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3})$ (۲)  $(0, 1)$ (۱)  $(\frac{1}{2}, 1)$ 


تست ۱۷۰: مطابق شکل، جزیره‌ای در ۴ کیلومتری یک ساحل مستقیم قرار دارد. در ساحل و در ۵ کیلومتری نقطه‌ای  $H$ ، دکه‌ای وجود دارد. یک ساکن جزیره به طور منظم به دکه سر می‌زند و در این راه از یک قایق پارویی استفاده می‌کند و بقیه‌ی راه را پیاده می‌رود. سرعت راه رفتن این شخص ۵ کیلومتر در ساعت است و با سرعت متوسط ۳ کیلومتر در ساعت پارو می‌زند.

این شخص در ساحل و در فاصله‌ی چند کیلومتری از نقطه‌ای  $H$  از قایق پیاده

(۱) ۲

(۲)  $\frac{2}{5}$ 

(۳) ۳

(۴)  $\frac{1}{5}$ 

تست ۱۷۱: در تابع با ضابطه  $f(x) = x | x - 4$ ، فاصله دو نقطه ماکسیمم نسبی و می‌نیمم نسبی آن، کدام است؟ (ت ۹۸)

(۴)  $2\sqrt{5}$ (۳)  $2\sqrt{2}$ (۲)  $2\sqrt{2}$ (۱)  $\sqrt{5}$ 

دییر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی کاربرد مشتق

درس دهم: بحث‌هایی درباره

تسهیت ۱۷۲: بیشترین مساحت مستطیلی که دو ضلع بر روی محورهای مختصات و راس چهارم آن، بر روی منحنی به معادله

$$y = \sqrt{12 - x}$$

۱۸ (۴)

۱۶ (۳)

۸۷۳ (۲)

۸۷۲ (۱)

تسهیت ۱۷۳: در تابع با ضابطه  $f(x) = x | x | - 2x$ ، فاصله دو نقطهٔ ماکسیمم نسبی و می نیم نسبی آن، کدام است؟

(ت خ ۹۸)

۴ (۴)

۳۷۲ (۳)

۳ (۲)

۲۷۲ (۱)

تسهیت ۱۷۴: بیشترین مساحت مستطیلی که یک ضلع آن بر قطر نیم دایره به شعاع ۶ واحد و دو راس دیگر آن روی این نیم

دایره باشد، کدام است؟ (ت خ ۹۸)

۳۶ (۴)

۲۷ (۳)

۲۴ (۲)

۱۸ (۱)

مرکز مشاوره تحصیلی

علیرضا افشار

دبیر ریاضی: عادل آخوندی





عنوان

## جزوه آموزشی هندسه تحلیلی

نگارش

عادل آخکندي

مرکز مشاوره تحصیلی

علیرضا افشار

دیبر ریاضی : عادل آخکندي



صفحه

فهرست

- ۱ ..... تفکر تجسمی، دوران و برش
- ۲ ..... بیضی و دایره

# مرکز مشاوره تحصیلی

# علیرضا افشار

دیبر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی هندسه تحلیلی

درس اول : تفکر تجسمی، دوران و برش



تفکر تجسمی

درس اول

## ۱ تفکر تجسمی، دوران و برش

سوال ۱: اگر صفحه‌ای یک کره را قطع کند، سطح مقطع یک ..... خواهد بود.

سوال ۲: مساحت مثلث متساوی الاضلاع به طول ضلع  $a$  برابر با ..... است. تست ۱: بزرگترین مقطع یک صفحه و مخروط، مثلث متساوی الاضلاع به ضلع  $4\sqrt{3}$  است. حجم مخروط کدام است؟

۳۶π (۴)

۲۴π (۳)

۱۸π (۲)

۱۲π (۱)

تست ۲: در استوانه‌ای شعاع قاعده و ارتفاع به ترتیب ۲ و ۵ است. این استوانه را با صفحه‌ای موازی محور و به فاصله یک واحد از آن قطع می‌کند. مساحت سطح مقطع حاصل کدام است؟

۱۵√۳ (۴)

۲۰√۳ (۳)

۱۰√۳ (۲)

۵√۳ (۱)

تست ۳: کره‌ای به شعاع ۶ را با صفحه‌ای به فاصله ۳ از مرکز برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع حاصل کدام است؟

۳۶π (۴)

۲۷π (۳)

۱۸π (۲)

۹π (۱)

 تست ۴: در مثلث قائم الزاویه‌ای طول وتر ۴ واحد و یک زاویه حاده آن  $30^\circ$  است. حجم حاصل از دوران این مثلث حول وتر آن کدام است؟ $\frac{3}{2}\pi$  (۴)

۳π (۳)

۴π (۲)

۶π (۱)

دیپر ریاضی : عادل آخوندی

1

## جزوه آموزشی هندسه تحلیلی

### درس اول : تَعْلِمَ تَجْمُعَ، دُورَانَ وَبَرْسَ

تست ۵: پاره خط  $AB$  که در نقطه  $A$  بر خط  $l$  عمود است، حول  $l$  دوران کرده و شکلی به مساحت  $12\pi$  به وجود آورده است. طول  $AB$  کدام است؟

(۴)  $4\sqrt{3}$

(۳)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(۲)  $2\sqrt{3}$

(۱)  $\sqrt{3}$

تست ۶: مستطیلی به ابعاد ۴ و  $x$  داریم. از دوران آن حول یک ضلع استوانه ای با حجم  $36\pi$  ایجاد شده است. مساحت مستطیل کدام است؟

(۴) ۲۴ یا  $36$

(۳) ۶ یا ۹

(۲) ۱۲ یا ۹

(۱) ۳ یا ۶

تست ۷: حجم حاصل از دوران مثلث قائم الزاویه ای حول اضلاع قائم آن به ترتیب  $6\pi$  و  $4\pi$  است. اگر آن را حول وتر دوران دهیم، حجم حاصل کدام است؟

(۴)  $\frac{6\sqrt{13}}{13}\pi$

(۳)  $\frac{12\sqrt{13}}{13}\pi$

(۲)  $\sqrt{24}\pi$

(۱)  $2\sqrt{13}\pi$

تست ۸: از درون استوانه ای به قطر قاعده و ارتفاع ۶، بزرگترین مخروط ممکن را برمیداریم. جسم حاصل را با صفحه ای به فاصله ۲ واحد از قاعده مخروط قطع می دهیم. سطح مقطع حاصل کدام است؟

(۴)  $7\pi$


(۳)  $5\pi$

(۲)  $6\pi$

(۱)  $4\pi$

## جزوه آموزشی هندسه تحلیلی

### درس اول : نکات جمیع، دوران و برنش



تست ۹: پاره خط  $AB$  به طول  $\sqrt{3}l$  حول  $l$  دوران می کند. حجم شکل حاصل کدام است؟

$$\frac{9\pi}{4} \quad (4)$$

$$\frac{9\pi}{8} \quad (3)$$

$$\frac{3\pi}{4} \quad (2)$$

$$\frac{3\pi}{8} \quad (1)$$

تست ۱۰: طول قطر مستطیلی  $\sqrt{10}$  و از دوران این مستطیل حول ضلع بزرگتر، استوانه ای ساخته می شود که مساحت جانبی آن  $12\pi$  است. محیط مستطیل کدام است؟

$$\sqrt{88} \quad (4)$$

$$\sqrt{32} \quad (3)$$

$$\sqrt{22} \quad (2)$$

$$\sqrt{11} \quad (1)$$

تست ۱۱: در مثلث قائم الزاویه ای طول وتر  $4$  و یک زاویه حاده  $30^\circ$  است. حجم حاصل از دوران این مثلث حول وتر آن کدام است؟

$$\frac{3}{2}\pi \quad (4)$$

$$3\pi \quad (3)$$

$$4\pi \quad (2)$$

$$6\pi \quad (1)$$

تست ۱۲: مثلثی به اضلاع  $4$  و  $5$  و  $7$  را حول ضلع بزرگتر دوران می دهیم. حجم جسم حاصل کدام است؟

$$\frac{108\pi}{7} \quad (4)$$

$$\frac{96\pi}{7} \quad (3)$$


$$\frac{64\pi}{7} \quad (2)$$

$$\frac{128\pi}{7} \quad (1)$$

## جزوه آموزشی هندسه تحلیلی

### درس اول : نکات بجمی، دوران و برنش

تست ۱۳: پاره خط  $AB$  به طول  $2\sqrt{6}$  مقابله خط  $l$  طوری قرار دارد که فاصله  $A$  تا  $l$  برابر با یک و فاصله  $B$  تا خط  $l$  هم می باشد. حجم شکل حاصل از دوران  $AB$  حول  $l$  کدام است؟



(۴)  $20\sqrt{6}\pi$

(۳)  $\frac{26\sqrt{6}\pi}{3}$

(۲)  $26\sqrt{6}\pi$

(۱)  $\frac{20\sqrt{6}\pi}{3}$

تست ۱۴: محیط دایره ای برابر  $\pi$  است. اگر این دایره را حول قطرش دوران دهیم. حجم شکل حاصل چقدر خواهد بود؟


(۴)  $\frac{\pi}{2}$

(۳)  $\frac{\pi}{3}$

(۲)  $\frac{\pi}{6}$

(۱)  $\frac{\pi}{8}$

تست ۱۵: مستطیل شکل مقابله حول خط  $l$  دوران می کند. اگر مساحت مستطیل ۳۶ باشد. حجم شکل حاصل چقدر است؟



(۴)  $18\sqrt{6}\pi$

(۳)  $108\sqrt{6}\pi$

(۲)  $36\sqrt{6}\pi$

(۱)  $9\sqrt{6}\pi$

تست ۱۶: مربعی را حول قطرش دوران داده ایم. حجم شکل حاصل برابر  $\frac{2\pi}{3}$  بوده است. مساحت مربع کدام است؟

(۴) ۴

(۳)  $\frac{1}{2}$

(۲) ۲

(۱) ۱

## جزوه آموزشی هندسه تحلیلی

### درس اول : تَعَلِّمَ تَجْمُعَ، دُورَانَ وَبَرْشَ

تست ۱۷: در شکل روبه رو مربع را حول خط  $\ell$  دوران داده ایم. حجم شکل حاصل چقدر است؟

(۲)  $20\pi$ (۳)  $15\pi$ (۴)  $10\pi$ (۵)  $5\pi$ 

تست ۱۸: دو استوانه هم محور به شعاع های ۱ و ۳ روی هم قرار گرفته اند و ارتفاع هر دو استوانه ۲ است. اگر حجم حاصل را با یک صفحه موازی با محور استوانه ها برش دهیم، بیشترین مساحت سطح مقطع حاصل چقدر است؟


(۱) ۱۸

(۲) ۱۶

(۳) ۸

(۴) ۱۲

تست ۱۹: مکعب مستطیل شکل رو به رو با صفحه ای به صورت مشخص شده، به دو قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. مساحت سطح مقطع حاصل کدام است؟



(۱) ۴

(۲)  $2\sqrt{2}$ 

(۳) ۲

(۴) ۱


تست ۲۰: مستطیلی به ابعاد ۳ و ۴ را حول عرض آن دوران داده ایم. مساحت سطح مقطع حاصل از برخورد یک صفحه افقی با شکل ایجاد شده کدام است؟

(۱)  $9\pi$ (۲)  $16\pi$ (۳)  $8\pi$ (۴)  $25\pi$

## جزوه آموزشی هندسه تحلیلی

### درس اول : نکات بجمی، دوران و برنش

تست ۲۱: مطابق شکل، ذوزنقه ای قائم الزاویه را حول خط  $d$  دوران داده ایم. حجم شکل ایجاد شده کدام است؟

(۴)  $126\pi$ (۳)  $63\pi$ (۲)  $42\pi$ (۱)  $21\pi$ 

تست ۲۲: حجم حاصل از دوران یک لوزی با طول قطرهای ۶ و ۴ واحد، حول قطر بزرگتر آن کدام است؟

(۴)  $64\pi$ (۳)  $8\pi$ (۲)  $12\pi$ (۱)  $32\pi$ 

مرکز مشاوره تحصیلی  
علیرضا افشار

دبیر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

درس دوم: بیضی و دایره



بیضی و دایره

درس دوم

## ۲ بیضی و دایره

**سوال ۳:** قطر بزرگ یک بیضی ۱۰ و قطر کوچک آن ۸ است. دایره‌ای به مرکز  $(-2, 1)$  و شعاعی که نصف فاصله کانونی بیضی باشد، رسم کرده ایم. معادله دایره را بنویسید.

**سوال ۴:** معادله دایره‌ای که مرکز آن نقطه  $(-1, 1)$  بوده و از نقطه  $A(2, 0)$  بگذرد را بنویسید.

**سوال ۵:** محیط دایره  $(x - 1)^2 + y^2 = \frac{1+m}{2}$  برابر با  $4\pi$  است. مقدار  $m$  را بیابید.

**سوال ۶:** شعاع دایره به معادله  $\frac{1}{2}x + 2 + \frac{1}{4}(y - 1)^2 = 1$  را بیابید.

**سوال ۷:** اگر نقطه  $O(1, 2)$  مرکز دایره  $x^2 + y^2 - ax + 2by = 0$  باشد مقدار  $ab$  را بیابید.

دبیر ریاضی : عادل آخوندی

۷

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

### درس دهم : بیضی و دایره

**سوال ۸:** به ازای چند مقدار  $a$  معادله  $2x^2 + (a^2 - 4)y^2 + 4y + a = 0$  مربوط به یک دایره است؟

**سوال ۹:** خط  $1: 3x + 4y = 1$  روی دایره ای به مرکز  $(5, 4)$  وتری به طول ۱۶ ایجاد کرده است. معادله این دایره را بنویسید.

**سوال ۱۰:** نقطه  $A(1, -2)$  نسبت به دایره ای به معادله  $5(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$  چه وضعی دارد؟

**سوال ۱۱:** نقطه برخورد دایره ای به معادله  $x^2 + y^2 + 4x + y - 2 = 0$  با محورهای مختصات را بیابید؟

**سوال ۱۲:** دو دایره به معادله های  $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$  و  $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 81 = 0$  نسبت به هم چه وضعی دارند؟

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

### درس دهم: بیضی و دایره

تست ۲۳: با یک تکه نخ به طول ۱۴ و با کمک دو میخ ثابت به فاصله ۴ از همدیگر یک بیضی کشیده ایم. خروج از مرکز بیضی کدام است؟

$$\frac{2}{3}(4)$$

$$\frac{2}{7}(3)$$

$$\frac{1}{7}(2)$$

$$\frac{2}{5}(1)$$

تست ۲۴: در بیضی با کانون های  $(1, 3)$  و  $(-5, 1)$ ، مختصات مرکز بیضی کدام است؟

$$(1, 0)(4)$$

$$(0, -1)(3)$$

$$(1, -1)(2)$$

$$(1, 1)(1)$$

تست ۲۵: در بیضی به مرکز  $(-3, 2)$  که قطر بزرگ موازی محور طول هاست، محورهای تقارن بیضی را رسم کرده ایم. مساحت شکلی که این خط ها با محورهای مختصات تشکیل می دهند کدام است؟

$$8(4)$$

$$6(3)$$

$$5(2)$$

$$4(1)$$

تست ۲۶: در یک بیضی به کانون های  $(-2, 7)$  و  $(2, 7)$ ، اندازه قطر کوچک ۶ واحد است. خروج از مرکز این بیضی کدام است؟

$$0/8(4)$$

$$0/75(3)$$

$$0/64(2)$$

$$0/6(1)$$

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

### درس دهم: بیضی و دایره

تست ۲۷: اگر خط  $x - y + 5 = 0$  یکی از محورهای تقارن بیضی با مرکز  $(-1, 3)$  باشد، در این صورت محور تقارن دیگر بیضی محور عرض ها را در نقطه ای با کدام عرض قطع می کند؟

(۴)  $\frac{2}{5}$ (۳)  $-5$ (۲)  $5$ (۱)  $-2/5$ 

تست ۲۸: محورهای تقارن یک بیضی عبارت اند از  $y = 3x + 5$  و  $y = 3x - 5$ ، فاصله مرکز بیضی تا مبدا مختصات کدام است؟

(۴)  $4$ (۳)  $\sqrt{5}$ (۲)  $2$ (۱)  $2\sqrt{2}$ 

تست ۲۹: در یک بیضی با خروج از مرکز  $\frac{1}{2}$  که قطر کوچک آن برابر ۲ است، فاصله کانونی کدام است؟

(۴)  $\frac{1}{4}$ (۳)  $\sqrt{3}$ (۲)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۱)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 

تست ۳۰: یک بیضی به مرکز  $O$  و قطر کوچک  $2b$  در نظر بگیرید. به مرکز  $O$  و شعاع  $b$  دایره ای می زنیم. اگر این دایره از کانون ها بگذرد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

(۴)  $\frac{1}{3}$ (۳)  $\frac{1}{2}$ (۲)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

درس دهم: بیضی و دایره

تست ۳۱: خروج از مرکز یک بیضی برابر  $\frac{2}{3}$  است. نسبت قطر کوچک به قطر بزرگ بیضی کدام است؟

(۴)  $\frac{\sqrt{5}}{6}$

(۳)  $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

(۲)  $\frac{\sqrt{5}}{3}$

(۱)  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

تست ۳۲: در بیضی با قطر بزرگ ۲ و فاصله کانونی  $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ، اندازه وتری که در کانون بر قطر بزرگ عمود می شود، کدام است؟

(۴)  $0 / 6$

(۳)  $0 / 4$

(۲)  $0 / 3$

(۱)  $0 / 2$

تست ۳۳: در بیضی به مرکز  $(-2, -3)$  فاصله کانون تا نزدیک ترین راس، ۲ و خروج از مرکز هم  $8 / 0$  است. مختصات نزدیک ترین نقطه روی بیضی به مرکز کدام می تواند باشد؟

(۴)  $(3, 2)$

(۳)  $(-2, -8)$

(۲)  $(-9, -2)$

(۱)  $(-3, 3)$

تست ۳۴:  $A(3, 2)$  یک راس کانونی و  $B(-1, 0)$  یک راس ناکانونی بیضی است. اگر خروج از مرکز بیضی  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  باشد، فاصله کانونی بیضی کدام است؟

(۴) ۶

(۳) ۴

(۲) ۲

(۱) ۱

دبیر ریاضی : عادل آخوندی

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

### درس دهم: بیضی و دایره

تست ۳۵: در یک بیضی با مرکز  $O(-1, 0)$ ، نقاط  $A(-1, 3)$  و  $F(-1, 7)$  به ترتیب راس کانونی و کانون این بیضی هستند.

نقطه  $M(2, 4)$  نسبت به این بیضی چگونه است؟

- (۱) روی بیضی      (۲) درون بیضی      (۳) بیرون بیضی      (۴) روی راس ناکانونی بیضی


تست ۳۶: مختصات دو سر قطر کوچک یک بیضی  $(-1, 1)$  و  $(-1, 3)$  است. این بیضی از نقطه  $(-4, 2)$  می‌گذرد. خروج از مرکز آن کدام است؟

- (۱)  $\frac{\sqrt{2}}{3}$       (۲)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       (۳)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       (۴)  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

تست ۳۷: اگر فاصله یکی از کانون‌های بیضی تا دورترین راس برابر ۵ و فاصله همین کانون تا نزدیکترین راس برابر ۳ باشد، خروج از مرکز این بیضی کدام است؟

- (۱)  $\frac{3}{4}$       (۲)  $\frac{1}{4}$       (۳)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       (۴)  $\frac{1}{2}$

تست ۳۸: در بیضی شکل زیر اگر محیط مثلث  $MFF'$  برابر ۳۶ باشد، اندازه قطر کوچک این بیضی چقدر است؟



- (۱)  $6\sqrt{2}$       (۲)  $12\sqrt{2}$       (۳)  $6\sqrt{3}$       (۴)  $12\sqrt{3}$

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

### درس ۴۰م: بیضی و دایره

تست ۳۹: نقاط  $O(4,1)$  و  $A(-2,4)$  به ترتیب مرکز و یکی از رئوس کانونی یک بیضی هستند. یکی از کانون های این بیضی روی خط  $x + 4y = 13$  قرار دارد. خروج از مرکز این بیضی کدام است؟

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3)$$

$$\frac{2}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

تست ۴۰: خطوط  $x = -5$  و  $y = 2$  و  $y = 6$  بر یک بیضی مماس اند. خروج از مرکز این بیضی کدام است؟


$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{5}}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

تست ۴۱: دسته خطوط به معادله  $(m+2)y + (m+1)x + 1 = 0$  قطرهای یک دایره اند. اگر این دایره از نقطه  $M(5,2)$  بگذرد، شعاع آن چقدر است؟



تست ۴۲: فاصله مرکز دایره  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 4$  تا مرکز دایره  $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 3$  کدام است؟

$$2\sqrt{7} \quad (4)$$

$$2\sqrt{3} \quad (3)$$

$$\sqrt{26} \quad (2)$$

$$5 \quad (1)$$

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

### درس دهم: بیضو و دایره

تست ۴۳: شعاع دایره  $x^2 + y^2 + 2x + 4y = k$  برابر ۲ است. در این صورت فاصله مرکز دایره ای به معادله

$$x^2 + y^2 - 2kx + 4ky = 0 \quad \text{تا مبدا مختصات کدام است؟}$$

(۴) ۴

۲ (۳)

-۲ (۲)

(۱) صفر

تست ۴۴: شعاع دایره  $x^2 + y^2 + 2x + 4y = k$  برابر ۲ است. در این صورت فاصله مرکز دایره ای به معادله

$$x^2 + y^2 - 2kx + 4ky = 0 \quad \text{تا مبدا مختصات کدام است؟}$$

(۴) ۴

۲ (۳)

-۲ (۲)

(۱) صفر

تست ۴۵: نقطه  $O(a, 2a)$  مرکز دایره ای است که از نقطه های  $A(2, 1)$  و  $B(-2, 3)$  می گذرد. معادله این دایره کدام است؟

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0 \quad (۲)$$

$$x^2 + y^2 + 4x + 8y + 11 = 0 \quad (۱)$$

$$x^2 + y^2 - 4x - 8y + 11 = 0 \quad (۳)$$

مرکز مشاوره تحصیلی

تست ۴۶: دایره ای که مختصات دو سر قطری از آن  $A(4, 1)$  و  $B(-2, 3)$  باشد، از کدام نقطه زیر نمی گذرد؟

(۰, -۱) (۴)

(۰, 1) (۳)

(۴, 1) (۲)

(۲, 5) (۱)

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

### درس نهم: بیضو و دایره

تسهت ۴۷: دایره‌ای به مرکز  $(-1, -2)$  و مماس بر خطی به معادله  $x - y = 1$  محور  $x$  را در نقطه‌ای با کدام طول قطع می‌کند؟ (ت ۹۵)

(۱)  $1, \sqrt{3}$ (۲)  $2, \sqrt{3}$ (۳)  $1, \sqrt{2}$ (۴)  $1, 2$ 

تسهت ۴۸: مرکز دایره‌ای بر روی نیمساز ناحیه اول است. اگر این دایره از نقطه  $A(6, 3)$  گذشته و بر خط  $y = 2x$  مماس شود، شعاع آن کدام است؟ (ت ۹۲)

(۱)  $\sqrt{10}$ (۲)  $2\sqrt{2}$ (۳)  $\sqrt{6}$ (۴)  $\sqrt{5}$ 

تسهت ۴۹: دایره گذرا بر مبدا مختصات بر دو خط به معادله‌های  $y = 2x + 10$  و  $y = 2x$  مماس است. مختصات مرکز این دایره کدام است؟ (ت خ ۹۵)

(۱)  $(-3, 2)$ (۲)  $(-3, 1)$ (۳)  $(-2, 1)$ (۴)  $(-1, 2)$ 

تسهت ۵۰: شعاع دایره گذرا بر سه نقطه  $(0, 0)$  و  $(1, -2)$  و  $(2, 1)$  کدام است؟ (ت ۹۳)

(۱)  $\frac{\sqrt{13}}{2}$ (۲)  $\sqrt{5}$ (۳)  $\sqrt{3}$ (۴)  $\frac{\sqrt{10}}{2}$

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

## درس دهم: بیضی و دایره

تست ۵۱: از نقطه  $A(1, -3)$  هیچ مماسی بر دایره‌ای به معادله  $(x + m)^2 + (y + 5)^2 = 6m + 2$  نمی‌توان رسم کرد.

برای  $m$  چند جواب طبیعی وجود دارد؟

(۴) سه

(۳) دو

(۲) یک

(۱) صفر

تست ۵۲: دایره‌ای به معادله  $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$  از کدام ناحیه دستگاه مختصات نمی‌گذرد؟

(۴) سوم و چهارم

(۳) دوم و سوم

(۲) فقط سوم

(۱) فقط دوم

تست ۵۳: به ازای کدام مقادیر  $m$ ، خط  $x^2 + y^2 - 2x = 3$  مماس است؟ (ت خ

(۹۱)

 $\frac{2}{3}, 1$  (۴) $\frac{-2}{3}, 1$  (۳) $\frac{4}{3}, 0$  (۲) $\frac{-4}{3}, 0$  (۱)

تست ۵۴: خط به معادله  $x - y = 3$  دایره‌ای به معادله  $5x^2 + 5y^2 - 17x - 3y - 14 = 0$  را در نقطه  $A$  در ناحیه

چهارم قطع می‌کند. فاصله  $A$  تا مبدأ مختصات کدام است؟

 $\sqrt{19}$  (۴) $\sqrt{5}$  (۳) $\sqrt{17}$  (۲) $\sqrt{11}$  (۱)

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

درس دهم: بینصی و دایره

 تست ۵۵: طول وتری که دایره  $x^2 + y^2 - 2x - 8y = 8$  از خط  $5x + 12y = 14$  جدا می کند، چقدر است؟

۱۰) ۴

۹) ۳

۸) ۲

۷) ۱

 تست ۵۶: طول قطعه مماسی که از نقطه  $A(1, 2)$  بر دایره ای به معادله  $(x - 1)^2 + y^2 = 1$  رسم می شود چقدر است؟ $\sqrt{3}$ ) ۴

۳) ۳

 $\sqrt{2}$ ) ۲ $2\sqrt{2}$ ) ۱ تست ۵۷: معادله خط مماس از نقطه  $A(2, 7)$  واقع بر دایره  $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$  کدام است؟ $3x + 4y + 34 = 0$ ) ۴ $4y - 3x = 34$ ) ۳ $3x - 4y = 34$ ) ۲ $3x + 4y = 34$ ) ۱ تست ۵۸: دو دایره گذرا بر نقطه  $(2, -9)$  بر هر دو محور مختصات مماس است. شعاع دایره بزرگتر کدام است؟ (ت ۹۵)

۱۹) ۴

۱۷) ۳

۱۵) ۲

۱۴) ۱

مرکز مشاوره تحصیلی

 تست ۵۹: به ازای کدام مقدار  $k$  دو دایره به معادلات  $x^2 + y^2 + 2x - 2y = 0$  و  $x^2 + y^2 - 4y + k = 0$  بر هم

مماس داصل اند؟

-۲) ۴

-۳) ۳

-۴) ۲

-۵) ۱

دیبر ریاضی : عادل آخوندی

۱۷

## جزوه آموزشی هندسی تحلیلی

### درس نهم: بینصو و دایره

تسنیع: دایره‌ای از دو نقطه  $(0,1)$  و  $(3,0)$  گذشته و معادله یک قطر آن به صورت  $x - y = 2$  است. شعاع این دایره کدام است؟

۳ (۴)

 $\sqrt{5}$  (۳)

۲ (۲)

 $\sqrt{2}$  (۱)

تسنیع: به ازای کدام مقدار  $a$  دو دایره به معادلات  $x^2 + y^2 + 4x = 0$  و  $x^2 + y^2 + 4y + a = 0$  مماس خارج یکدیگرند؟ (ت ۹۰)

۸ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

۵ (۱)

تسنیع: فاصله نقطه  $M(x, y)$  از نقطه  $A(3, 6)$ ، دو برابر فاصله آن از مبدأ مختصات است. بزرگترین وتر از مکان نقاط کدام است؟ (ت ۹۷)  $M$

 $4\sqrt{5}$  (۴) $4\sqrt{3}$  (۳) $2\sqrt{5}$  (۲) $2\sqrt{3}$  (۱)

# مرکز مشاوره تحصیلی

# علیرضا افشار

دبیر ریاضی: عادل آخوندی

۱۸



عنوان

## جزوه آموزشی احتمال

نگارش

عادل آخکندي

مرکز مشاوره تحصیلی

علیرضا افشار

دبیر ریاضی : عادل آخکندي



# مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار

دیبر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی احتمال


درس اول: احتمال کل

## ۱ قانون کل احتمال (احتمال شاخه ای)

این شاخه از احتمال دارای فرمول است اما بپردازید آن را بدون فرمول بررسی کنیم و در نهایت فرمول را معرفی می کنیم.

به عنوان مثال اگر احتمال انتقال نوعی بیماری خاص به نوزاد پسر  $0.08$  و نوزاد دختر  $0.03$  باشد و خانواده ای قصد بچه دار

شدن داشته باشد، به چه احتمالی نوزاد آنها به بیماری مذکور مبتلا خواهد شد؟



**سوال ۱:** در یک جامعه  $40$  درصد مرد و مابقی زن هستند بطوریکه  $25$  درصد مردان و  $20$  درصد زنان صاحب خانه شخصی

هستند، حال اگر نفری ازین جامعه انتخاب کنیم با کدام احتمال دارای منزل شخصی نیست؟

**سوال ۲:** فرض کنید جمعیت یک کشور متنشکل از  $20$  درصد کودک و نوجوان،  $50$  درصد میانسال و  $30$  درصد سالمند باشند و شیوع یک بیماری خاص در این دسته ها به ترتیب  $3$  درصد،  $5$  درصد و  $1$  درصد باشد. اگر فردی به تصادف از این جامعه انتخاب شود، با چه احتمالی به بیماری مورد نظر مبتلا است؟

**تسویی ۱:** بهروز جهت مشارکت در یک مسابقه، از بین پرسش های  $5$  بسته ریاضی،  $7$  بسته تجربی و  $6$  بسته علوم انسانی به تصادف یک بسته اختیار کرده است. احتمال برنده شدن در هر بسته این دروس به ترتیب  $7/0$  و  $8/0$  و  $9/0$  است. با کدام احتمال، بهروز برنده می شود؟ (تجربی خارج ۹۸)

$$\frac{31}{36} \text{ د}$$

$$\frac{30}{36} \text{ ج}$$

$$\frac{29}{36} \text{ ب}$$

$$\frac{25}{36} \text{ الف}$$

دبیر ریاضی : عادل آخوندی



## جزوه آموزشی احتمال

### درس اول: احتمال کل

**سوال ۳:** دو جعبه داریم. درون یکی از آنها ۱۲ لامپ قرار دارد که ۶ تا از آنها معیوب است و درون جعبه دیگر ۹۶ لامپ قرار دارد که ۴ تا از آنها معیوبند. به تصادف جعبه‌ای انتخاب کرد، یک لامپ از آن بیرون می‌آوریم. چقدر احتمال دارد لامپ مورد نظر معیوب باشد؟

**سوال ۴:** در ظرفی دو مهره‌ی آبی و سه مهره‌ی قرمز و در ظرف دوم، پنج مهره‌ی آبی و چهار مهره‌ی قرمز وجود دارد، یکی از ظروف را به تصادف انتخاب و دو مهره از آن خارج می‌کنیم، با کدام احتمال مهره‌ها همنگ نیستند؟

**سوال ۵:** ۴ ظرف یکسان داریم. در اولین ظرف ۱۴ مهره قرار دارد که ۴ تای آنها قرمز است. در ظرف دوم همه مهره‌ها قرمزنده‌اند. در ظرف سوم ۸ مهره قرار دارد که ۶ تای آنها قرمزنده و در ظرف چهارم هیچ مهره قرمزی وجود ندارد. با چشم بسته یکی از ظرف‌ها را انتخاب کرده و از آن یک مهره بیرون می‌آوریم. احتمال اینکه مهره انتخابی قرمز باشد چقدر است؟

**تست ۲:** ظرف  $A$  دارای ۴ مهره سفید و ۵ مهره سیاه است و هریک از ظروف  $B$  و  $C$  دارای ۶ مهره سفید و ۳ مهره سیاه است. به تصادف یکی از سه ظرف را انتخاب کرده و ۴ مهره را خارج می‌کنیم. با کدام احتمال دو مهره‌های خارج شده، سفید است؟ (تجربی ۹۳)

الف)  $\frac{25}{63}$

ب)  $\frac{26}{63}$

ج)  $\frac{10}{21}$

د)  $\frac{11}{21}$

**تست ۳:** دو کیسه داریم. در اولی ۵ سفید و ۱ سیاه و در دومی ۶ سفید و ۳ سیاه وجود دارد. از یک کیسه به تصادف مهره‌ای برداشته شود. با کدام احتمال سفید است؟

الف)  $\frac{5}{8}$

ب)  $\frac{3}{4}$

ج)  $\frac{11}{12}$

د)  $\frac{8}{9}$

## جزوه آموزشی احتمال

### درس اول: احتمال کل

تسنیم ۴: فرض کنید احتمال انتقال نوعی بیماری ارثی از والدین به فرزند پسر  $12/0$  و به فرزند دختر  $0/9$  باشد. والدینی که حامل این نوع بیماری هستند با چه احتمالی فرزندی سالم خواهد داشت؟

الف)  $895/0$       ب)  $88/0$       ج)  $91/0$       د)  $95/0$

تسنیم ۵: ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاهی دخترند. نصف دخترها و یک هشتم پسرها خوابگاهی‌اند. یک دانشجو با کدام احتمال خوابگاهی است؟

الف)  $35/0$       ب)  $45/0$       ج)  $4/0$       د)  $48/0$

تسنیم ۶: تاس سالمی را پرتاب می‌کنیم. اگر زوج ظاهر شد، دو تاس دیگر و اگر فرد ظاهر شد، یک تاس دیگر پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه مجموع تاس‌های پرتاب شده برابر ۷ باشد چقدر است؟

الف)  $9/216$       ب)  $22/216$       ج)  $24/216$       د)  $26/216$

اگر فضای نمونه‌ای  $S$  به  $n$  پیشامد دو به دو ناسازگار  $B_1$  و  $B_2$  ... و  $B_n$  افزایش شده باشد و  $A$  پیشامد از  $S$  باشد، رابطه برقرار است:

$$P(A) = P(B_1) \times P(A|B_1) + P(B_2) \times P(A|B_2) + \dots + P(B_n) \times P(A|B_n)$$

**نکته:** بهتر است مسائل احتمال کل را به کمک نمودار درختی حل کرد.

**نکته:** معمولاً وقتی از فرمول احتمال کل استفاده می‌کنیم که حکم مسئله به چند حالت متناهی افزایش شده باشد.

## جزوه آموزشی احتمال

### درس اول: احتمال کل

**سوال ۶:** یک سکه را پرتاب می کنیم و اگر پشت بیاید ۳ سکه دیگر را با هم پرتاب می کنیم. در این آزمایش احتمال اینکه دقیقاً یک سکه رو ظاهر شود چقدر است؟

**سوال ۷:** مینا در انتخاب رشته خود برای تحصیل در دبیرستان بین سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی مردد است. اگر او رشته ریاضی را انتخاب کند به احتمال  $\frac{45}{100}$ ، اگر تجربی را انتخاب کند به احتمال  $\frac{1}{10}$  و اگر انسانی را انتخاب کند به احتمال  $\frac{3}{10}$  در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته خواهد شد. اگر احتمال اینکه او رشته ریاضی را انتخاب کند  $\frac{1}{10}$ ، احتمال اینکه رشته تجربی را انتخاب کند  $\frac{6}{10}$  و احتمال اینکه رشته انسانی را انتخاب کند  $\frac{3}{10}$  باشد. با چه احتمالی در دانشگاه پذیرفته خواهد شد؟

**تست ۷:** یک فرزند از خانواده‌ای که چهار فرزند دارد انتخاب می کنیم. احتمال اینکه این فرزند خواهری بزرگتر از خود داشته باشد چند است؟

$$\text{د) } \frac{17}{32}$$

$$\text{ج) } \frac{3}{8}$$

$$\text{ب) } \frac{1}{4}$$

$$\text{الف) } \frac{5}{12}$$

**تست ۸:** در پرتاب سه سکه، اگر حداقل یک سکه رو بیابید یک تاس و در غیر این صورت دو تاس می اندازیم. با کدام احتمال رقم ۴ دست کم یک بار ظاهر می شود؟

$$\text{د) } \frac{59}{288}$$

$$\text{ج) } \frac{55}{288}$$

$$\text{ب) } \frac{53}{288}$$

$$\text{الف) } \frac{51}{288}$$


## جزوه آموزشی احتمال

### درس اول: احتمال کل

**سوال ۸:** سامان در یک مسابقه شرکت کرده است. سه بسته سؤال های ادبیات، یکی ریاضی و یکی اطلاعات عمومی است، وجود دارد. اگر بسته سؤال های ادبیات را به او بدهند، به احتمال ۹۰ درصد برنده خواهد شد. اگر بسته سؤال های ریاضی را به او بدهند، به احتمال ۶۰ درصد و اگر بسته سؤال های اطلاعات عمومی را به او بدهند، به احتمال ۸۵ درصد برنده خواهد شد. در صورتی که با چرخاندن عقربه چرخان در شکل مقابل نوع سؤال هایی که به او داده می شود مشخص شود تعیین کنید او به چه احتمالی برنده خواهد شد؟



**سوال ۹:** دو ظرف یکسان داریم. ظرف اول شامل ۶ مهره سبز و ۴ مهره آبی و ظرف دوم شامل ۵ مهره سبز و ۷ مهره آبی است. از ظرف اول به تصادف یک مهره انتخاب کرده، در ظرف دوم قرار می دهیم. سپس یک مهره از ظرف دوم انتخاب می کنیم. به چه احتمالی این مهره سبز است؟



**تست ۹ :** در ظرف  $A$  دو مهره سفید و ۳ مهره سیاه و در ظرف  $B$  چهار مهره سفید و سه مهره سیاه داریم. مهره ای از  $A$  انتخاب کرده و آن را به همراه دو مهره از رنگ دیگر در  $B$  می اندازیم. حالا مهره ای از  $B$  بیرون می آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟

- الف ) ۰/۵۲      ب ) ۰/۵۴      ج ) ۰/۵۸      د ) ۰/۵۶

**تست ۱۰ :** دو کیسه داریم. در اولی ۵ سفید و ۱ سیاه و در دومی ۶ سفید و ۳ سیاه وجود دارد. از یک کیسه به تصادف مهره ای بر می داریم. با کدام احتمال سفید است؟

- الف )  $\frac{5}{8}$       ب )  $\frac{3}{4}$       ج )  $\frac{11}{12}$       د )  $\frac{8}{9}$

## جزوه آموزشی احتمال

### درس اول: احتمال کل

تست ۱۱ : در دو ظرف به ترتیب ۲۴ و ۱۸ مهره یکسان موجود است. در ظرف اول ۶ مهره سفید و در ظرف دوم ۳ مهره سفید است. از اولی ۷ مهره و از دومی ۵ مهره به تصادف برداشته و ظرف دیگری می‌ریزیم. سپس از ظرف سوم یک مهره بیرون می‌آوریم با کدام احتمال این مهره سفید است؟

$$\text{د) } \frac{31}{144}$$

$$\text{ج) } \frac{15}{72}$$

$$\text{ب) } \frac{7}{36}$$

$$\text{الف) } \frac{13}{72}$$

تست ۱۲ : در اولین ظرف از سه ظرف همانند، ۳ مهره سفید و ۹ مهره سیاه و دومین ظرف ۵ مهره سفید و ۳ مهره سیاه و در ظرف سوم فقط مهره سیاه داریم. با چشم بسته از یکی از ظرف‌ها یک مهره بیرون می‌آوریم. احتمال اینکه این مهره سیاه باشد کدام است؟

$$\text{ج) } \frac{7}{12}$$

$$\text{د) } \frac{5}{12}$$

$$\text{ب) } \frac{17}{24}$$

$$\text{الف) } \frac{5}{16}$$

تست ۱۳ : احتمال انتقال بیماری مسری به افرادی که واکسن زده اند  $0.25/0$  و احتمال انتقال به افراد دیگر  $0.2/0$  است.  $\frac{2}{5}$  کارگران یک کارگاه واکسن زده اند. اگر فرد حامل این بیماری به تصادف با یکی از کارگران ملاقات کند، با کدام احتمال این بیماری منتقل می‌شود؟ (سراسری تجربی ۸۹)

$$\text{د) } \frac{16}{100}$$

$$\text{ج) } \frac{15}{100}$$

$$\text{ب) } \frac{14}{100}$$

$$\text{الف) } \frac{13}{100}$$

تست ۱۴ : ۵۵ درصد دانشجویان سال اول، دختر و بقیه پسر هستند. ۶۰ درصد دختران و ۶۴ درصد پسران، تمام واحد‌های درسی خود را گذرانده اند. چند درصد کل دانشجویان، تمام واحد‌های درسی را گذرانده اند؟ (سراسری تجربی خارج کشور ۸۸)

$$\text{د) } 62/8$$

$$\text{ج) } 62/4$$

$$\text{ب) } 61/8$$

$$\text{الف) } 61/4$$

**دیبر ریاضی : عادل آخوندی**



## جزوه آموزشی احتمال

### درس اول: احتمال کل

تسنیت ۱۵: در یک روستا ۵۴ درصد جمعیت را مردان و ۴۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. اگر ۶۰ درصد مردان و ۷۵ درصد زنان دفترچه سلامت داشته باشند، با کدام احتمال یک فرد انتخابی به تصادف از بین آنها، دفترچه سلامت دارد؟ (سراسری تجربی خارج کشور) (۹۰)

- الف)  $\frac{1}{658}$       ب)  $\frac{1}{669}$       ج)  $\frac{1}{685}$       د)  $\frac{1}{696}$

تسنیت ۱۶: دو ظرف همانند، اولی دارای ۶ مهره‌ی سفید و ۴ مهره‌ی سیاه، دومی دارای ۶ مهره‌ی سفید و ۸ مهره‌ی سیاه است. با چشم بسته یکی از این دو ظرف را اختیار کرده، مهره‌ای از آن بیرون می‌آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟ (سراسری ریاضی) (۸۱)

- الف)  $\frac{17}{35}$       ب)  $\frac{18}{35}$       ج)  $\frac{37}{70}$       د)  $\frac{39}{70}$

تسنیت ۱۷: در دو جعبه به ترتیب ۲۴ و ۱۵ عدد لامپ یکسان موجود است. در جعبه اول ۴ عدد و در جعبه دوم ۳ عدد لامپ معیوب‌اند. از اولی ۸ و از دومی ۶ لامپ به تصادف برداشته و در جعبه قرار می‌دهیم. با کدام احتمال یک لامپ انتخابی از جعبه جدید معیوب است؟

- الف)  $\frac{17}{105}$       ب)  $\frac{19}{105}$       ج)  $\frac{6}{35}$       د)  $\frac{8}{35}$

تسنیت ۱۸: سکه‌ای را پرتاب می‌کنیم. اگر «رو» باید تاس را می‌ریزیم. اگر «پشت» باید سه سکه دیگر را باهم می‌ریزیم. در این آزمایش احتمال اینکه دقیقاً یک سکه رو ظاهر شود کدام است؟

- الف)  $\frac{1}{2}$       ب)  $\frac{9}{16}$       ج)  $\frac{5}{8}$       د)  $\frac{11}{16}$

## جزوه آموزشی احتمال

### درس اول: احتمال کل

تست ۱۹ : در یک آزمون از دو کلاس  $A$  و  $B$  ۴۰ درصد دانش آموزان کلاس  $A$  و ۶۰ درصد دانش آموزان کلاس  $B$  قبول شده اند. اگر تعداد دوطلبین در کلاس  $A$  دو برابر کلاس  $B$  باشد و فردی به تصادف از بین قبول شدگان انتخاب شود، با کدام احتمال این فرد از کلاس  $A$  است ؟

د)  $\frac{5}{8}$

ج)  $\frac{4}{7}$

ب)  $\frac{3}{7}$

الف)  $\frac{3}{8}$

تست ۲۰ : در مدرسه ای دو کلاس  $A$  و  $B$  به ترتیب ۲۰ و ۲۴ نفر دانش آموز دارند. احتمال قبولی در این کلاس ها به ترتیب  $72/0$  و  $63/0$  است. سه دانش آموز از کلاس  $A$  به کلاس  $B$  می روند و سپس دانش آموزی از کلاس  $B$  برای آزمون انتخاب می شود. با کدام احتمال قبول خواهد شد ؟

د)  $64/0$

ج)  $65/0$

ب)  $66/0$

الف)  $67/0$

تست ۲۱ : در جعبه ای ۶ مهره سفید و ۹ مهره سیاه موجود است. دو مهره متولایا و بدون جاگذاری از آن بیرون می آوریم . با کدام احتمال بدون توجه به رنگ مهره اول دومین مهره خارج شده سفید است ؟ (تجربی ۹۲)

د)  $\frac{3}{5}$

ج)  $\frac{2}{5}$

ب)  $\frac{3}{7}$

الف)  $\frac{5}{14}$

تست ۲۲ : در جعبه ای اول ۴ مهره سفید و ۳ مهره سیاه و در جعبه ای دوم ۳ مهره سفید و ۶ مهره سیاه موجود است. به تصادف یکی از جعبه ها را انتخاب کرده و دو مهره با هم از آن بیرون می آوریم. با کدام احتمال هر دو مهره سفید است ؟ (تجربی خارج کشور ۹۲)

د)  $\frac{13}{56}$

ج)  $\frac{17}{84}$

ب)  $\frac{11}{56}$

الف)  $\frac{31}{168}$

جزوه آموزشی احتمال

درس اول: احتمال کل

تست ۲۳: در ظرفی ۲ مهره سفید و ۳ مهره قرمز وجود دارد، چهار مرتبه مهره ای از ظرف خارج کرده و پس از مشاهده رنگ آن مجدداً به ظرف برمی‌گردانیم، با چه احتمالی تعداد مهره های سفید و قرمز خارج شده از ظرف با هم برابرند؟

۱۴

٣٢٤  
٦٢٥ (ج)

٢١٦

٦٢٥

**نکته:** عدم اطلاع ما درباره مهره خارج شده از یک کیسه، **تاشیری روی احتمال رنگ** مهره دوم ندارد. نکته بالا برای تعداد بیشتری از مهره های انتخابی درست است. یعنی اگر چند مهره ای که با چشم بسته انتخاب کرده ایم، دور بریزیم (کنار بگذاریم) تاشیری در احتمال رنگ مهره بعدی ندارد. یعنی انگار اصلاً مهره ای از کیسه خارج نشده است.

تسنیت ۲۴: در جعبه‌ای ۵ مهره سفید و ۶ مهره سیاه است. ابتدا یک مهره را بدون رویت خارج می‌کنیم. سپس از بین بقیه مهره‌ها، ۲ مهره بیرون می‌کشیم. با کدام احتمال هر دو مهره اخیر سفید است؟ (ت ۹۸)

5

٤

٢  
ب)

الف )

تسنیت ۲۵ : دو ظرف داریم ، در اولی ۵ مهره سفید و ۴ مهره سیاه و دومی ۷ مهره سفید و ۱۰ مهره سیاه است . از ظرف اول یک مهره برداشته و بدون رویت در ظرف دوم قرار می دهیم . آنگاه از ظرف دوم یک مهره بیرون می آوریم . با کدام احتمال این مهره سفید است ؟ (سراسری ریاضی، ۸۴)

41






٣٤

۱۱

الف)  $\frac{8}{27}$

دبر راضی : عادل آخوندی

## بررسی محیط و مساحت شکل های دو بعدی

شکل	نام	محیط	مساحت
	مربع	$p = 4a$	$s = a^2$
	مستطیل	$p = 2(a + b)$	$s = ab$
	مثلث	$p = a + b + c$	$s = \frac{a \cdot h}{2}$
	متوازی الاضلاع	$p = 2(a + b)$	$s = a \cdot h$
	ذوزنقه	$p = a + b + c + d$	$s = \frac{(a + d) \cdot h}{2}$
	لوزی	$p = 4c$	$s = \frac{a \cdot b}{2}$
	دایره	$p = 2\pi r$	$s = \pi r^2$
	بیضی		$s = \pi a b$

دیدیریاضی : عادل آخوندی

## بررسی مساحت و حجم شکل های سه بعدی


شکل	نام	مساحت جانبی	مساحت کل	حجم
	مکعب	$s_1 = 4a^2$	$s_2 = 6a^2$	$v = a^3$
	مکعب مستطیل	$s_1 = 2(bc + ac)$	$s_2 = 2(bc + ac + ab)$	$v = abc$
	استوانه	$s_1 = 2\pi rh$	$s_2 = 2\pi rh + 2\pi r^2$	$v = \pi r^2 h$
	مخروط	$s_1 = \pi rl$	$s_2 = \pi rl + \pi r^2$	$v = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
	هرم	$s_1 = \frac{1}{2} p_b \cdot l$	$s_2 = \frac{1}{2} p_b \cdot l + s_b$	$v = \frac{1}{3} s_b h$
	کره		$s_2 = 4\pi r^2$	$v = \frac{4}{3}\pi r^3$

- ۱۲۶- حاصل عبارت  $\frac{\sqrt{8} + \sqrt{27}}{5 - \sqrt{6}} - 2(\sqrt[4]{9} - 1)^{-1}$  کدام است؟  
 ۱)  $1 + \sqrt{3}$       ۲)  $-1 + \sqrt{2}$       ۳)  $1 - \sqrt{2}$       ۴)  $\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$
- ۱۲۷- اعداد طبیعی متولی را به طریقی دسته‌بندی می‌کنیم، که آخرین عدد هر گروه مربع کامل باشد، یعنی ...، ۲، ۳، ۴، ۱}. در دسته‌های نهم، واسطه حسابی بین دو عدد اول و آخر آن، کدام است؟  
 ۱) ۷۱ (۴)      ۲) ۷۲ (۳)      ۳) ۷۳ (۲)      ۴) ۷۴ (۱)
- ۱۲۸- فرض کنید چندجمله‌ای  $p(x) = p(1-x) + p(1-x)(1-x) = Q(x)$ . آنگاه حاصل تقسیم  $Q(x)$  بر  $x-2$  کدام است؟  
 ۱)  $-1$  (۱)      ۲) صفر (۲)      ۳)  $1$  (۳)      ۴)  $2$  (۴)
- ۱۲۹- معادله درجه دوم  $3x^3 + 2m - m = 0$  دارای دو ریشه حقیقی است. اگر مجموع ریشه‌ها با معکوس حاصل ضرب آن دو ریشه برابر باشد، مقدار  $m$  کدام است?  
 ۱)  $\frac{7}{2}$  (۱)      ۲)  $-1$  (۳)      ۳)  $2$  (۲)      ۴)  $-\frac{5}{2}$  (۴)
- ۱۳۰- مجموعه جواب نامعادله  $\frac{x+1}{2x-1} < 3$  کدام است?  
 ۱)  $(0, \infty)$  (۱)      ۲)  $(0, \frac{1}{2})$  (۲)      ۳)  $(\frac{1}{2}, \infty)$  (۳)      ۴)  $(0, \frac{1}{2})$  (۴)
- ۱۳۱- فرض کنید نقاط  $(-2, 5)$ ،  $(0, 5)$  و  $(1, 1)$ ، بر سه‌می  $y = ax^2 + bx + c$  واقع باشند. این سه‌می، از کدام یک از نقاط زیر می‌گذرد؟  
 ۱)  $(-1, 3)$  (۱)      ۲)  $(2, 9)$  (۳)      ۳)  $(-1, 4)$  (۲)      ۴)  $(2, 15)$  (۴)
- ۱۳۲- نمودار تابع با ضابطه  $f(x) = \sqrt{x}$  را در امتداد محور  $x$ ‌ها، ۱۲ واحد در جهت مثبت و سپس در امتداد محور  $y$ ‌ها، ۲ واحد در جهت مثبت، انتقال می‌دهیم. فاصله نقطه برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع  $f$  از مبدأ مختصات، کدام است?  
 ۱)  $4\sqrt{15}$  (۱)      ۲)  $6\sqrt{7}$  (۲)      ۳)  $4\sqrt{17}$  (۳)      ۴)  $6\sqrt{10}$  (۴)
- ۱۳۳- در بازه  $(a, b)$ ، نمودار تابع با ضابطه  $|y - 2x^2 - 4| = 2x$  در زیر خط  $y = 2x$  واقع است. بیشترین مقدار  $a - b$  کدام است?  
 ۱)  $1$  (۱)      ۲)  $2$  (۲)      ۳)  $3$  (۳)      ۴)  $4$  (۴)
- ۱۳۴- اگر  $g(x) = -x^2 + 4x$  و  $f(x) = 2x - |2x|$  باشند، بُرد تابع  $gof$  کدام است?  
 ۱)  $[0, 2)$  (۱)      ۲)  $[0, 4)$  (۲)      ۳)  $[1, 4)$  (۳)      ۴)  $[1, 2)$  (۴)
- ۱۳۵- اگر  $g(x)$  وارون تابع  $f(x) = x + \sqrt{x}$  باشد، مقدار  $g(f(12))$  کدام است?  
 ۱)  $10$  (۱)      ۲)  $11$  (۲)      ۳)  $13$  (۳)      ۴)  $14$  (۴)
- ۱۳۶- تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = x - \frac{2}{x}$  در دامنه  $(-\infty, 0)$  را در نظر بگیرید. نمودار تابع  $f^{-1}$  نیمساز ناحیه چهارم را با کدام طول، قطع می‌کند؟  
 ۱)  $\frac{3}{4}$  (۱)      ۲)  $\frac{3}{2}$  (۲)      ۳)  $\frac{1}{2}$  (۳)      ۴)  $\frac{1}{4}$  (۴)
- ۱۳۷- اگر  $\log_6 3 = \alpha$  باشد، مقدار  $\log_{12} 9$  کدام است?  
 ۱)  $\frac{13}{18}$  (۱)      ۲)  $\frac{8}{11}$  (۲)      ۳)  $\frac{3}{4}$  (۳)      ۴)  $\frac{7}{9}$  (۴)

محل انجام محاسبات

221-A

صفحه ۶



- ۱۳۸- شکل زیر، نمودار تابع با ضابطه  $f(x) = -c + 2^{ax+b}$  است.  $f(x) = -\frac{5}{3}$  کدام است؟

۵۴ (۱)  
۶۰ (۲)  
۴۸ (۳)  
۲۸ (۴)


- ۱۳۹- فرض کنید در دامنه  $[0, +\infty)$ ، تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{2^x + (\frac{1}{2})^x}{2}$ ، مفروض باشد.  $f^{-1}(2)$  کدام است؟

$\log_2(2 + \sqrt{2})$  (۴)     $\log_2(1 + \sqrt{2})$  (۳)     $\log_2(\sqrt{2} - 1)$  (۲)     $\log_2(2 - \sqrt{2})$  (۱)

- ۱۴۰- حاصل عبارت  $(\tan(30^\circ)\cos(210^\circ) + \tan(48^\circ)\sin(840^\circ))$  کدام است؟ (اعداد داده شده بر حسب درجه هستند.)


۲ (۴)    ۱ (۳)    ۰ (۲) صفر     $-\frac{1}{2}$  (۱)

- ۱۴۱- شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع با ضابطه  $y = a + b\sin(\frac{\pi}{3} + x)$  است. مقدار  $b$  کدام است؟



۲ (۱)  
۱ (۲)  
-۱ (۳)  
-۲ (۴)

- ۱۴۲- شکل زیر، نمودار تابع  $y = a\sin(bx) + c$  را در یک بازه تنایوب، نشان می‌دهد. نسبت  $\frac{a}{b}$  کدام است؟



-۲ (۱)  
-۳ (۲)  
-۴ (۳)  
-۶ (۴)

- ۱۴۳- جواب‌های معادله مثلثاتی  $\sin(2x - \frac{\pi}{4}) = \cos(x + \frac{\pi}{4})$  با شرط  $x \neq k\pi$ ، که در آن  $k$  یک عدد صحیح است، کدام است؟

$\frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$  (۴)     $\frac{2k\pi}{3} - \frac{\pi}{6}$  (۳)     $\frac{2k\pi}{3}$  (۲)     $\frac{k\pi}{3}$  (۱)

- ۱۴۴- حاصل  $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{[x]+2}{x+2}$  کدام است؟

-۱ (۲)     $-\infty$  (۱)

- ۱۴۵- تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{ax - \sqrt[n]{x^n - 1}}{4x^n - 12}$  را در نظر بگیرید. اگر  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{6}$  باشد، آنگاه  $a$  کدام است؟

$\frac{a}{36}$  (۴)     $\frac{1}{12}$  (۳)     $\frac{1}{18}$  (۲)     $\frac{1}{24}$  (۱)

محل انجام محاسبات

221-۸

صفحه ۷

ریاضی

- ۱۴۶- تابع با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\Delta - 2x} & ; x \leq -2 \\ -\frac{1}{2}x^2 + bx + c & ; x > -2 \end{cases}$  در  $x = -2$ ، مشتق پذیر است. مقدار  $c$  کدام است؟

 $\frac{2}{3}$  (۴) $\frac{1}{3}$  (۳) $-\frac{1}{3}$  (۲) $-\frac{2}{3}$  (۱)

- ۱۴۷- مشتق تابع با ضابطه  $f(x) = \left( \frac{\sqrt[3]{x^2 + 2x}}{x^2 - x} \right)^3$  در نقطه  $x = 2$ ، کدام است؟

 $-\frac{15}{4}$  (۴) $-\frac{5}{2}$  (۳) $-\frac{5}{4}$  (۲) $-\frac{3}{4}$  (۱)

- ۱۴۸- فاصله نقطه ماکسیمم نسبی تابع با ضابطه  $f(x) = x + \sqrt{4x - x^2}$ ، از نیمساز ناحیه اول کدام است؟

 $2\sqrt{2}$  (۴) $2$  (۳) $\sqrt{2}$  (۲)

(۱)

- ۱۴۹- از بین مثلث‌های قائم‌الزاویه با اندازه وتر ۱۵ واحد، دو ضلع قائم با کدام نسبت انتخاب شود تا حجم حاصل از دوران این مثلث حول ضلع قائم، بیشترین باشد؟

 $\frac{\sqrt{2}}{1}$  (۴) $\frac{3}{2}$  (۳) $\frac{\sqrt{3}}{1}$  (۲) $\frac{2}{1}$  (۱)

- ۱۵۰- به چند طریق می‌توان ۵ نفر از ۹ دوست صمیمی خود را به مهمانی دعوت کرد، به توری که دو نفر آنان، نخواهند با هم در مهمانی شرکت کنند؟

۹۵ (۴)

۹۱ (۳)

۸۷ (۲)

۸۴ (۱)

- ۱۵۱- پنج کتاب زبان فارسی و ۳ کتاب زبان انگلیسی، به تصادف در یک قفسه کنار هم چیده شده‌اند. با کدام احتمال کتاب‌های هم زبان، کنار هم قرار می‌گیرند؟

 $\frac{1}{56}$  (۴) $\frac{1}{28}$  (۳) $\frac{1}{21}$  (۲) $\frac{1}{14}$  (۱)

- ۱۵۲- ضریب تغییرات داده‌های آماری به صورت جدول زیر، کدام است؟

داده	۱۰ , ۱۰ , ۱۰ , ۱۰ , ۱۰ , ۱۱ , ۱۱ , ۱۱ , ۱۱ , ۱۴ , ۱۴ , ۱۴ , ۱۴ , ۱۴
------	---

۰/۱۸ (۴)

۰/۱۷ (۳)

۰/۱۵ (۲)

۰/۱۲ (۱)

- ۱۵۳- مثلثی با رأس‌های  $A(5, 0), B(7, 3)$  و  $C(-2, 2)$ ، مفروض است. اندازه ارتفاع  $AH$  در مثلث  $ABC$ ، کدام است؟


 $4\sqrt{2}$  (۴)

۵ (۳)

 $3\sqrt{2}$  (۲)

۴ (۱)

- ۱۵۴- اندازه اضلاع متوازی‌الاضلاع  $ABCD$  مطابق شکل زیر داده شده است. محیط مثلث  $MAB$ ، کدام است؟




۱۳/۲ (۱)

۱۳/۶ (۲)

۱۴/۴ (۳)

۱۴/۸ (۴)

- ۱۵۵- در مثلث قائم‌الزاویه  $ABC$ ، طول اضلاع قائم  $AC = \sqrt{3}$  و  $AB = 2$  است. نسبت مساحت‌های دو مثلث قائم‌الزاویه  $ABD$  و  $HCD$ ، کدام است؟

 $\frac{4}{7}$  (۲) $\frac{8}{9}$  (۳) $\frac{3}{7}$  (۱) $\frac{16}{21}$  (۲)

محل انجام محاسبات



مرکز مشاوره تحصیلی  
علیرضا افشار



## راههای ارتباطی مرکز مشاوره

تلگرام



AlirezaAfsharOfficial

اینستاگرام



AlirezaAfsharOriginal

وبسایت



[www.AlirezaAfshar.org](http://www.AlirezaAfshar.org)

## رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه  
به شماره ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتس‌اپ پیام دهید

Afshar.xyz

آدرس تمام رسانه‌ها :

