

درس: ریاضی ۳	وزارت آموزش و پرورش	راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ
تعداد صفحه: ۳	اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان	درس ریاضی: ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	امتحان پایان نیم سال اول	پایه: دوازدهم
مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲	رشته: تجربی
نمره:		ساعت: ۸



### راهنمای تصحیح

شماره	درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.	بارم
۱	<p>الف) تابع <math>f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 2x + 1</math> یک چند جمله‌ای از درجه ۳ است.</p> <p>ب) تابع <math>y = x^3</math> در دامنه‌اش نزولی است.</p> <p>ج) برد تابع <math>y = kf(x)</math> با برد تابع <math>y = f(x)</math> یکسان می‌باشد.</p> <p>د) تابع تانژانت در دامنه‌اش صعودی است.</p> <p><b>پاسخ:</b></p> <p>الف) درست    ب: نادرست    ج) نادرست    د) درست    هر مورد ۰/۲۵ صفحات: ۱، ۷، ۱۵ و ۴۱</p>	
۲	<p>در جاهای خالی عبارت ریاضی مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>الف) نمودار تابع <math>g(x) = x^2</math> در بازه <math>(1, 0)</math>، ..... از نمودار تابع <math>f(x) = x^3</math> قرار دارد.(پایین تر-بالاتر)</p> <p>ب) دامنه تابع <math>f(x) = x^3</math> برابر..... است. <math>((0, +\infty), R)</math></p> <p>ج) اگر <math>\{(x, y), (y, z)\} = f</math> باشد، حاصل <math>f^{-1}(z) = \{(x, y)\}</math> است. <math>(8, 5)</math></p> <p>د) باقی مانده تقسیم عبارت <math>x^3 - 5x^2 - 2x + 6</math> بر <math>x - 3</math> برابر ..... است. <math>(0, 0)</math></p> <p><b>پاسخ:</b></p> <p>الف) بالاتر    ب: <math>R</math>    ج) ۵    د) ۰    هر مورد ۰/۲۵ صفحات: ۴، ۲۴ و ۵۰</p>	۱

۰/۵

به کمک نمودار تابع  $f(x) = x^3$ , ضابطه هر تابع را به نمودار آن نظیر کنید.

ب)  $f(x) = -x^3$



پاسخ:

الف) (۱)

ب) (۲)

هر مورد ۰/۲۵ صفحه: ۵

۱/۵

اگر تابع  $g(x) = x^3 - 1$  و  $f(x) = x^3$ , دامنه و ضابطه تابع  $gof$  را به دست آورید.

پاسخ:

دامنه:  $R$

ضابطه:  $(x-1)^3 - 1$

هر مورد ۰/۷۵ صفحه: ۱۴

۱/۵



تابع  $f(x) = x^3 - 2x + 2$  یک به یک نیست. با محدود کردن دامنه آن تابعی یک به یک بسازید و ضابطه وارون آن را به دست آورید.

پاسخ:

بازه  $(1, +\infty]$ , ضابطه وارون  $k(x) = \sqrt{x-1} + 1$  هر مورد ۰/۷۵ صفحه: ۲۷

۰

هر کدام از تابع‌های زیر در چه بازه‌هایی اکیداً صعودی و در چه بازه‌هایی اکیداً نزولی هستند؟



پاسخ:


(۱): در فاصله‌های  $(-\infty, 0)$  و  $(0, +\infty)$  نزولی است. ۰/۵

(۲): در فاصله‌های  $[-\pi, -\frac{\pi}{2}]$  و  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$  نزولی است و در فاصله  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  صعودی است ۰/۵ صفحه: ۸

نمودار تابع  $|x| - 1 = f(x)$  را رسم کنید و بازه‌هایی که این تابع در آنها یک به یک و نزولی است را مشخص کنید.


پاسخ:

رسم: ۰/۵، در بازه‌های  $[-1, 0)$  و  $[0, 1]$  نزولی و یک به یک است. ۰/۵ صفحه: ۱۷



نمودار تابع  $y = f(2x)$  با دامنه  $[-4, 4]$  به صورت زیر داده شده است، با استفاده از آن نمودار تابع  $f(x)$  را رسم کنید.

پاسخ:



صفحه: ۲۰

رسم کامل: ۱/۵

دور تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع  $f(x) = 3\sin(2x) - 2$  را مشخص کنید.

پاسخ:

$$T = \frac{\pi}{b} = \frac{\pi}{2} = \pi$$

$$\text{ماکزیمم: } 1 = |3| - 2$$


$$\text{مینیمم: } -5 = -|3| - 2$$

۱/۵


۹

هر یک از توابع داده شده را به نمودارهای زیر نظری کنید.

$$f(x) = 1 - \cos 2x \quad (\text{ب})$$



$$f(x) = 2 - \cos \frac{1}{2}x \quad (\text{الف})$$



۰/۵

۱۰

پاسخ:

$$\text{الف: (2) هر مورد ۰/۲۵ صفحه ۴۰ ب: (1) هر مورد ۰/۲۵ صفحه ۴۰}$$

۱/۵

۱۱

مقدار  $\sin 15^\circ$  را بایابید.

پاسخ:

$$\cos 30^\circ = \frac{1 - 2\sin^2 15^\circ}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1 - 2\sin^2 15^\circ}{2} \Rightarrow \sin^2 15^\circ = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin 15^\circ = \pm \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$$

$$\Rightarrow \sin 15^\circ = \pm \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \Rightarrow \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$$

صفحه ۴۳

۱/۵

۱۲

معادله  $\sqrt{2} = 2\sin 3x - \sqrt{3}$  را حل کنید.

پاسخ:

$$2\sin 3x = \sqrt{2} \Rightarrow \sin 3x = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow 3x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{12}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow 3x = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{3} - \frac{\pi}{12}, k \in \mathbb{Z}$$

صفحه ۴۷

فرض کنید  $\frac{5}{13}$  و  $\alpha$  زاویه ای حاده باشد، مقدار  $\sin 2\alpha$  را به دست آورید.

پاسخ:

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144}{169} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{12}{13}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \times \frac{12}{13} \times \frac{5}{13} = \frac{120}{169}$$

صفحه ۴۸

حدود زیر را در صورت وجود حساب کنید.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[x]}{|3x + 1|} \quad (د)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^2 + x - 2} \quad (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad (\text{الف})$$

پاسخ:

$$(\text{الف}) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{5(2)}{\sqrt{2^2 + 1}} = \frac{10}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$

$$(ب) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} = \frac{0}{0} \quad \text{مهم}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x(x + 3)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 3)}{x} = \frac{(-3 - 3)}{-3} = 3$$

$$(ج) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^2 + x - 2} = \frac{1 - \sqrt{1}}{2 - 2} = \frac{0}{0} \quad \text{مهم}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - \sqrt{x})(x + \sqrt{x})}{(x^2 + x - 2)(x + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - x)}{(x + 2)(x - 1)(x + \sqrt{x})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x - 1)}{(x + 2)(x - 1)(x + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{(x + 2)(x + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1 + 2)(1 + \sqrt{1})} = \frac{1}{6}$$

د) مخرج در نزدیکی  $\frac{1}{3}$  با مقادیر مثبت به صفر میل می کند و حد صورت هم در  $\frac{1}{3}$  برابر ۱ است (۰/۵) بنابراین:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[x]}{|3x + 1|} = -\infty$$

صفحه ۵۳

۱۳

۱۴

حدود زیر را محاسبه کنید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{x^2}$

پاسخ:

۱/۵

(الف)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{x^2} = \frac{-2}{+\infty} = 0$

۱۵

(ب)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x^3+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(2+\frac{1}{x})}{x^3(1+\frac{2}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2} = 0$


۰/۵

با توجه به نمودار تابع  $g(x)$  طرف دوم تساوی‌های داده شده زیر را بنویسید.

الف)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \dots$

ب)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \dots$

۱۶



پاسخ:

الف)  $+\infty$

ب) ۲ صفحه ۶۲ ۰/۲۵

۲۰

در نهایت، نظر همکاران محترم صائب است.